



Infermieri Pyetja: 1

Ajo degë e filozofisë që merret me standardet e sjelljes dhe të gjykimit moral quhet:

- A) Deontologji
- B) Vlerë
- C) Detyrë
- D) Etikë

Infermieri Pyetja: 2

Nëse një infermier përdor uniformën e tij jashtë mjediseve spitalore, ka thyer:

- A) Të drejtat e pacientit
- B) Kodin etik
- C) Ligjin
- D) Parimet



Infermieri Pyetja: 3

Në konceptet kryesore të teorisë infermierore bën pjesë ?

- A) Besnikëria
- B) Bamirësia
- C) Autonomia
- D) Infermieristika

Infermieri Pyetja: 4

Në zhvillimin e kujdesjeve dhe shtrirjen e roleve infermierore bën pjesë ?

- A) Infermieri anesteziist
- B) Infermieri si avokat
- C) Infermieri si vendimarrës
- D) Infermieri si edukues





Infermieri Pyetje: 5

Homeostaza psikologjike nënkupton një ekulibër të sistemit:

- A) Respirator
- B) Urinar
- C) Gastro-intestinal
- D) Mendor

Infermieri Pyetje: 6

Në nevojat fiziologjike të pacientit bën pjesë :

- A) nevoja për siguri
- B) nevoja për dashuri
- C) nevoja për ujë
- D) nevoja për mbrojtje

Infermieri Pyetje: 7

Ndër parimet e normave etike të kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Vërtetësia
- B) Autonomia
- C) Besnikëria
- D) Besueshmëria

Infermieri Pyetje: 8

Cila nga këto nevojat fiziologjike është më e rëndësishme ndër të tjerat?

- A) Nevoja për oksigjen
- B) Nevoja për ujë
- C) Nevoja për ushqim
- D) Nevoja për gjumë





Infermieri Pyetje: 9

Aftësia për të influencuar tek të tjerët, për tu përpjekur për një vizion, qëllim ose për të ndryshuar quhet:

- A) Menaxhim
- B) Organizim
- C) Planifikim
- D) Lidërsip

Infermieri Pyetje: 10

Në parimet e ruajtjes së shëndetit bën pjesë?

- A) Gjendja emocionale
- B) Parandalimi i drogës dhe duhanit
- C) Biografia kulturore
- D) Faktorët socialë

Infermieri Pyetje: 11

Në qendër të të gjitha roleve infermierore është roli i infermieres si:

- A) Edukuese
- B) Menaxhuese
- C) Vendim marrëse
- D) Komunikuese

Infermieri Pyetje: 12

Në menaxhimin infermieror nuk bën pjesë:

- A) Planifikimi
- B) Organizimi
- C) Kontrolli
- D) Modifikimi





Infermieri Pyetje: 13

Nuk është pjesë e poliklinikës një nga ambientet e mëposhtme:

- A) Laboratori Biokimik
- B) Dhoma e injeksioneve
- C) Konsultat e Fëmijëve
- D) Salla Operatore

Infermieri Pyetje: 14

Kur një pacient ndodhet në ambulancën e pranimit mund të marrë disa drejtime për trajtimin e tij. Cili prej këtyre më poshtë nuk është i saktë?

- A) Në Terapinë Intensive
- B) Në Sallën Operatore
- C) Në Pavion
- D) Në Laborator



Infermieri Pyetje: 15

Një pacient pasi del nga salla e operacionit mund të transportohet në:

- A) Dhomë injeksionesh
- B) Terapinë intensive
- C) Laborator
- D) Mikrokirurgji

Infermieri Pyetje: 16

Sëmundjet kronike janë sëmundje të cilat kanë një kohëzgjatje:

- A) 1 muaj
- B) 2 muaj
- C) 3 muaj
- D) Mbi 3 muaj



Infermieri Pyetje: 17

Të dhënat historike janë informacione:

- A) Aktuale të gjendjes shëndetësore
- B) Mbi ecurinë e mëparshme të gjendjes shëndetësore
- C) Mbi përshkrimin individual të situatës shëndetësore
- D) Mbi situatën që do të pasojë gjendjen shëndetësore

Infermieri Pyetje: 18

Ndërhyrja në parandalimin tretësor synon?

- A) Edukimin shëndetësor
- B) Diagnostimin e sëmundjes
- C) Trajtimin e sëmundjes
- D) Parandalimin e komplikacioneve

Infermieri Pyetje: 19

Cila është ngjyra që përdoret për të lyer muret në sallat e operacionit?

- A) E bardhë
- B) E kuqe
- C) E verdhë
- D) Jeshile

Infermieri Pyetje: 20

Mledhja e të dhënave nga komunikimi me familjarët dhe klientin është etapa:

- A) E parë e kujdesit infermieror
- B) E dytë e kujdesit infermieror
- C) E tretë e kujdesit infermieror
- D) E katërt e kujdesit infermieror

Infermieri Pyetje: 21

Në mbledhjen e të dhënave për përcaktimin e diagnozës infermierore nuk bën pjesë një nga elementët e mëposhtëm:

- A) Observimi
- B) Kartela e mjekut
- C) Biseda me klientin
- D) Planifikimi

Infermieri Pyetje: 22

Hemoragjia nga hundet quhet:

- A) Epistaksis
- B) Petekje
- C) Eritema
- D) Hipoksi

Infermieri Pyetje: 23

Ekzaminimi i një regjoni me anë të goditjes quhet:

- A) Palpacion
- B) Perkusion
- C) Askultacion
- D) Vibracion

Infermieri Pyetje: 24

Të dhënat subjektive janë të dhëna që sigurohen nga:

- A) Testet diagnostikuese
- B) Testet laboratorike
- C) Pacienti dhe familjarët
- D) Observimi



Infermieri Pyetje: 25

Komunikimi intrapersonal është komunikimi që ndodh brenda:

- A) Një individ
- B) Dy individëve
- C) Një grup individësh
- D) Publik

Infermieri Pyetje: 26

Kufiri i një termometri varjon nga:

- A) 37-45 gradë Celsius
- B) 34-42.2 gradë Celsius
- C) 30-41.2 gradë Celsius
- D) 26-40 gradë Celsius



Infermieri Pyetje: 27

Rritja e temperaturës trupore mbi normalen quhet:

- A) Hipotension
- B) Hypertension
- C) Hipotermi
- D) Hipertermi

Infermieri Pyetje: 28

Matja e pulsit apikalo-radial realizohet nga:

- A) 1 infermiere
- B) 2 infermiere
- C) 3 infermiere
- D) Vet pacienti



Infermieri Pyetje: 29

Administrimi topikal i medikamenteve realizohet në rrugë:

- A) Orale
- B) Parenterale
- C) Traktit respirator
- D) Lëkura & mukozat

Infermieri Pyetje: 30

Cila nga mënyrat e mëposhtme të administrimit të medikamenteve nuk bën pjesë në administrimin parenteral?

- A) Intra/muskular
- B) Intra/venoz
- C) Sub/kutan
- D) Transdermal

Infermieri Pyetje: 31

Kur një medikament duhet të qëndrojë në stomak për efekt lokal pacienti pozicionohet?

- A) Dekubitus lateral dexter
- B) Dekubitus lateral sinister
- C) Pozicioni Fowler
- D) Pozicioni semi-fowler

Infermieri Pyetje: 32

Kur indi subkutan është i hollë ose kemi një agje të gjatë injeksionet sub-kutane realizohen në kënd:

- A) 75 gradë
- B) 65 gradë
- C) 55 gradë
- D) 45 gradë

Infermieri Pyetje: 33

Injeksionet intra/muskulare nuk realizohen në muskulin:

- A) Gluteal
- B) Femoral
- C) Vastus-lateral
- D) Facial

Infermieri Pyetje: 34

Teknika zikzak e injektimit të medikamenteve realizohet në injeksionet:

- A) Intra/venoze
- B) Intra/muskulare
- C) Intra/dermale
- D) Sub/kutane

Infermieri Pyetje: 35

Metoda e administrimit të oksigjenit realizohet me anë të :

- A) Sondës nazo-gastrike
- B) Kateterit urinar
- C) Vigonit
- D) Kateterit nazal

Infermieri Pyetje: 36

Shtimi i masës qarkulluese në organizëm quhet:

- A) Hiperkalemi
- B) Hipokalemi
- C) Hipovolemi
- D) Hipervolemi



Infermieri Pyetje: 37

Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë sasia totale e ujit në organizëm?

- A) 55-85%
- B) 45-75%
- C) 35-65%
- D) 25-55%

Infermieri Pyetje: 38

Cili nga këta elementë kimikë ka një rol të rëndësishëm në formimin e skeletit të trupit?

- A) Natriumi
- B) Kaliumi
- C) Kalciumi
- D) Magnezi



Infermieri Pyetje: 39

Cili nga këta përbërës kimikë dhe elementë kimikë ka një rol të rëndësishëm në acidozën dhe alkalozën metabolike?

- A) HPO_4
- B) Cl
- C) Mg
- D) $(\text{HCO}_3)^-$

Infermieri Pyetje: 40

Cili nga këto element nuk bën pjesë në makroelementët ushqimor?

- A) Uji
- B) Karboidratet
- C) Vitaminat
- D) Yndyrnat





Infermieri Pyetje: 41

Ulja e oreksit ose e dëshirës për të ngrënë quhet:

- A) Nauze
- B) Anoreksi
- C) Vomitus
- D) Flatulencë

Infermieri Pyetje: 42

Gjatë periudhës së dimrit proceset metabolike:

- A) Ulen
- B) Rriten
- C) Ndikohen nga gjinia
- D) Nuk ndryshojnë



Infermieri Pyetje: 43

Hapja kirurgjikale që bëhet në stomak nëpërmjet murit abdominal dhe shërben për ushqyerjen e pacienti quhet:

- A) Tonsilectomi
- B) Laringostomi
- C) Gastrostomi
- D) Faringostomi

Infermieri Pyetje: 44

Procesi i zbrazjes së vezikës urinare quhet:

- A) Meatus
- B) Uretër
- C) Miksion
- D) Sfinkter





Infermieri Pyetje: 45

Zbrazja e vezikës urinare tek adultët ndodh kur në veshkë janë grumbulluar:

- A) 50-150 ml/urinë
- B) 100-200 ml/urinë
- C) 150-250 ml/urinë
- D) 200-300 ml/urinë

Infermieri Pyetje: 46

Sasia e urinës që mbetet në vezikë pas urinimit quhet:

- A) Poliuri
- B) Anuri
- C) Oliguri
- D) Urinë reziduale



Infermieri Pyetje: 47

Prania e pusit në urinë quhet:

- A) Glukozuri
- B) Piuri
- C) Hematuri
- D) Dizuri

Infermieri Pyetje: 48

Urinimi i shpeshtë gjatë natës, veçanërisht kur nuk janë marrë sasi të mëdha lëngjesh quhet:

- A) Inkontinencë urinare
- B) Polakiuri
- C) Nikturi
- D) Piuri





Infermieri Pyetje: 49

Sa është sasia e solucionit që shërben për të fryrë balonin e kateterit foley gjatë procesit të kateterizimit urinar?

- A) 5 ml
- B) 10 ml
- C) 15 ml
- D) 20 ml

Infermieri Pyetje: 50

Hemokultura është një analizë gjaku:

- A) Biokimike
- B) Klinike
- C) Bakteriologjike
- D) Parazitologjike

Infermieri Pyetje: 51

Ekzaminimi bakteriologjik i feçeve quhet:

- A) Hemokulturë
- B) Koprokulturë
- C) Urokulturë
- D) Parazitologjike

Infermieri Pyetje: 52

Në pozicionet e qëndrimit shtrirë në planin horizontal të pacientit nuk bën pjesë:

- A) Dekubitus dorsal
- B) Dekubitus ventral
- C) Dekubitus lateral
- D) Pozicioni ortopne





Infermieri Pyetje: 53

Gjatë vendosjes së pacientit në pozicion semi-Fowler shpina formon me shtratin një kënd:

- A) 90 gradë
- B) 60 gradë
- C) 45 gradë
- D) 25 gradë

Infermieri Pyetje: 54

Plagët që krijohen nga qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë ose nga presioni quhen;

- A) Ulçera sipërfaqësore
- B) Ulçera të thella
- C) Dekubitus
- D) Imobilitet



Infermieri Pyetje: 55

Cili ndër këta faktor ka më tepër ndikim në formimin e dekubitusëve?

- A) Anemia
- B) Lageshtia
- C) Vit. C
- D) Temperatura

Infermieri Pyetje: 56

Paftësia për të bërë një gjumë cilësor quhet:

- A) Narkolepsi
- B) Insomnia
- C) Apnea e gjumit
- D) Somnambulizëm



Infermieri Pyetje: 57

Paftësia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe gazrave nga anusi quhet:

- A) Diarre
- B) Koprolite
- C) Konstipacion
- D) Inkontinencë fekale

Infermieri Pyetje: 58

Egzaminimi i një organi ose i një regjoni me anë të prekjes quhet:

- A) Askultacion
- B) Perkusion
- C) Palpacion
- D) Vibracion

Infermieri Pyetje: 59

Matja e temperaturës orale nuk është e sigurtë:

- A) Te pacientët me diarre
- B) Te pacientët e djersitur
- C) Te pacientët me episode krizash
- D) Te pacientët me konstipacion

Infermieri Pyetje: 60

Rritja e shpejtësisë së pulsit mbi 100 rrahje në minutë quhet:

- A) Takipne
- B) Takikardi
- C) Bradipne
- D) Bradikardi



Infermieri Pyetje: 61

Natriumi është një element i cili merr pjesë në :

- A) Tkurrijen muskulare
- B) Metabolizmin e karbohidrateve
- C) Ruajtjen e ekulibrit acido-bazik
- D) Balancën hidrike

Infermieri Pyetje: 62

Cila është sasia e oksigjenit që jepet me anë të kanjules nazale?

- A) 1l/min
- B) 2-4l/min
- C) 5-7 l/min
- D) 6-8 l/min



Infermieri Pyetje: 63

Nga mëngjesi në darkë temperatura e trupit ndryshon?

- A) me 0.2 gradë Celsius
- B) me 0.4 gradë Celsius
- C) me 0.6 gradë Celsius
- D) me 1 gradë Celsius

Infermieri Pyetje: 64

Ulja e frekuencës së pulsit nën 60 rrah/min quhet:

- A) Takipne
- B) Takikardi
- C) Bradipne
- D) Bradikardi



Infermieri Pyetje: 65

Cili nga këta muskuj është më i përdorshmi për bërjen e injeksioneve intramuskular?

- A) Gluteal
- B) Vastus lateral
- C) Deltoid
- D) Femoral

Infermieri Pyetje: 66

Në rregullat e kujdesit shëndetësor bën pjesë:

- A) Drejtësia
- B) Vërtetësia
- C) Jokeqdashje
- D) Bamirësia

Infermieri Pyetje: 67

Parandalimi dytësor konsiston:

- A) Programet e edukimit shëndetësor
- B) Imunizimin e efekteve të sëmundjes
- C) Trajtimin dhe izolimin e sëmundjes
- D) Diagnostikimin e sëmundjes

Infermieri Pyetje: 68

Cila është temperatura që duhet të ruhet në ambientet spitalore?

- A) 21-26 gradë celcius
- B) 22-27 gradë celcius
- C) 26-28 gradë celcius
- D) 20-22 gradë celcius



Infermieri Pyetja: 69

Diagnoza mjekësore:

- A) Është e drejtuar nga patologjia dhe zgjat aq kohë sa zgjat sëmundja
- B) Përshkruan përgjigjen e personave për sëmundjen
- C) Trajton të sëmurin
- D) Identifikon një simptomë të caktuar

Infermieri Pyetja: 70

Matja e temperaturës rektale nuk është e sigurtë te:

- A) Pacientët me episode krizash
- B) Pacientët që kanë bërë ndërhyrje në zonën rektale
- C) Pacientët me të vjella
- D) Pacientët me konstipacion



Infermieri Pyetja: 71

Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë lengu intersticial?

- A) 5 %
- B) 10 %
- C) 15 %
- D) 20 %

Infermieri Pyetja: 72

Sa përqind të oksigjenit në gjak transporton Hb?

- A) 90 %
- B) 93 %
- C) 97 %
- D) 99 %





Infermieri Pyetje: 73

Ne qofte se një infermiere përvetëson sendet personale të një pacienti ajo ka thyer:

- A) Kodin etik
- B) Ligjin
- C) Deontologjinë
- D) Vlerat

Infermieri Pyetje: 74

Pasi jepen medikamentet me anë të tubit nazogastrik pacienti vendoset në pozicion:

- A) Shtrirë nga e majta
- B) Shtrirë nga e djathta
- C) Semi-Fowler
- D) Fowler



Infermieri Pyetje: 75

Jonet e kalciumit kryejnë këtë funksion në sinaps:

- A) Transmetimin e impulseve nervore
- B) Transmetimin e impulseve elektrike
- C) Nxiti aktivitetin e enzimave
- D) Nxiti aktivitetin e karbohidrateve

Infermieri Pyetje: 76

Orificiumi i jashtëm i uretrës quhet:

- A) Meatus
- B) Miksion
- C) Polakiuri
- D) Poliuri





Infermieri Pyetja: 77

Paaftësia për të kontrolluar shkarkimin e urinës nga vezika urinare quhet:

- A) Oliguri
- B) Retesion urinar
- C) Inkontinencë urinare
- D) Anuri

Infermieri Pyetja: 78

Pamundësia për të qëndruar në gjumë për shkak të zgjimeve të shpeshta quhet insomni:

- A) fillestare
- B) Sekondare
- C) Terminale
- D) Intermitente



Infermieri Pyetja: 79

Një vale e papritur mbingarkese me gjumë që ndodh gjatë ditës quhet:

- A) hipersomni
- B) narkolepsi
- C) parasomni
- D) Insomni

Infermieri Pyetja: 80

Infeksionet urinare që ndodhin nga vendosja e kateterit të vezikës urinare mund të shkaktohen nga :

- A) Mos respektimin i teknikës aseptike
- B) Mos futja siç duhet e kateterit
- C) Mos larja e duarve të pacientit
- D) Mos funksionimi siç duhet i uretrës





Infermieri Pyetje: 81

Rritja e hematokritit mund të jetë tregues i:

- A) Anemisë
- B) Infeksionit
- C) Hemorragjisë
- D) Dehidrimit

Infermieri Pyetje: 82

Ecja në gjumë quhet:

- A) Insomni
- B) Hipersomni
- C) Parasomni
- D) Somnambulizëm



Infermieri Pyetje: 83

Cili është raporti antikoagulant /gjak që duhet për marrjen e një analize?

- A) 0.3ml/5ml
- B) 0.5ml/3ml
- C) 0.5-0.3ml
- D) 0.5ml/5ml

Infermieri Pyetje: 84

Metodat për kontrollimin e tubit nazogastrik:

- A) Tubi futet me anë të gastrostomisë
- B) Tubi futet me anë të një incizioni
- C) Fut me anë të shiringës pak ajër në fund të tubit
- D) Fut me anë të shiringës pak gjak në fund të tubit





Infermieri Pyetje: 85

Sa zbrit përqindja metabolike gjatë gjumit?

- A) 5-9 %
- B) 10-15 %
- C) 16-20 %
- D) 21-25 %

Infermieri Pyetje: 86

Ulçerat që fillojnë në shtresat subkutane mbi një dalje kockore dhe më pas zgjerohen dhe në sipërfaqe quhen:

- A) Ulçera sipërfaqësore
- B) Ulçera të thella
- C) Nekrozë sipërfaqësore
- D) Nekrozë që depërton në thellësi



Infermieri Pyetje: 87

Cili nga këto pozicione nuk bën pjesë në vendosjen e pacientit në plan horizontal?

- A) Dekubitus lateral
- B) Dekubitus dorsal
- C) Dekubitus ventral
- D) Fowler

Infermieri Pyetje: 88

Ulja e dendesisë së urinës nën vlerën 1010-1030 haset në semundje të:

- A) Heparit
- B) Diabetit
- C) Veshkave
- D) Stomakut





Infermieri Pyetja: 89

Testi widal është një metodë që mund të përdoret për diagnozë në:

- A) Sëmundjet infektive
- B) Tifo abdominale
- C) Sëmundjet pulmonare
- D) Cirrozë hepatike

Infermieri Pyetja: 90

"Ca" është një kation i cili merr pjesë në këto funksione:

- A) Transmetimin e impulseve nervore
- B) Transmetimin e impulseve elektrike
- C) Krijimin e impulseve nervore
- D) Krijimin e impulseve elektrike



Infermieri Pyetja: 91

Hipertension quhet kur presioni arterial i matur i gjakut është:

- A) Nën vlerat 140/90 mmHg
- B) Në vlerat 140/90 mmHg
- C) Mbi vlerat 140/90 mmHg
- D) Mbi vlerat 160/100 mmHg

Infermieri Pyetja: 92

Cili nga vëndet e matjes së temperaturës është më pak i sakti?

- A) Rektale
- B) Orale
- C) Aksilare
- D) Temporale





Infermieri Pyetje: 93

Në administrimin e injeksioneve s/c bëhet:

- A) Tërheqje e lëkurës
- B) Mbledhje e lëkurës
- C) Shtypje e lëkurës
- D) Tendosje e lëkurës

Infermieri Pyetje: 94

Në administrimin e injeksioneve intramuskulare bëhet:

- A) Tërheqje e lëkurës
- B) Mbledhje e lëkurës
- C) Shtypje e lëkurës
- D) Tendosje e lëkurës



Infermieri Pyetje: 95

Për të shtuar lagështirën e mjedisit në dhomën e pacientit përdoret:

- A) Ventilator
- B) Vaporizator
- C) Kondicioner
- D) Oksigjen i lagështuar

Infermieri Pyetje: 96

Diagnoza infermierore:

- A) është e drejtuar nga patologjia
- B) zgjat aq kohë sa vazhdon sëmundja e personit
- C) trajton sëmundjen
- D) trajton të sëmurin





Infermieri Pyetje: 97

Injeksionet jepen në rrugë :

- A) Orale
- B) Paranterale
- C) Endogjene
- D) Egzogjene

Infermieri Pyetje: 98

Deontologjia është:

- A) Një sistem i parimeve fiziologjike
- B) Teoria e obligimit moral
- C) Kodi udhëheqës
- D) Vlerë individuale



Infermieri Pyetje: 99

Metakomunikimi është:

- A) Shkëmbimi i mesazhit pa përdorur fjalët
- B) Mesazhet që kërkojnë përdorimin e teknikave efektive të komunikimit
- C) Mesazhi që transporton qëndrimin e dërguesit ndaj vetes dhe mesazhit
- D) Proçes mësimi dhe interpretimi

Infermieri Pyetje: 100

Matja direkte (monitorim invaziv) e presionit të gjakut përfshin :

- A) Metodën auskultative
- B) Metodën palpuese
- C) Futjen e një kateteri në arterien radiale ose femorale
- D) Asnjëra





Infermieri Pyetje: 101

Sistola është periudha kur ventrikujt e zemrës janë:

- A) Të relaksuar
- B) Të kontraktuar
- C) Gjysëm të kontraktuar
- D) Gjysëm të relaksuar

Infermieri Pyetje: 102

Është identifikuar dhe quajtur si pionerja dhe themeluesja e infermieristikës moderne dhe botërore, si dhe një reformatore e spitaleve:

- A) Patricia Benner
- B) V. Henderson
- C) Florence Nightingale
- D) D.E.Johnson



Infermieri Pyetje: 103

Dita Ndërkombëtare e Infermierit është vënë në nder të ditëlindjes së Florence Nightingale, dhe është më :

- A) 12 Mars
- B) 12 Prill
- C) 12 Maj
- D) 12 Qershor

Infermieri Pyetje: 104

Njihet si Infermiera dhe Themeluesja e Infermieristikës Shqiptare:

- A) Safka Kushi
- B) Esma Pojani
- C) Zonjusha Austriake
- D) Asnjëra





Infermieri Pyetje: 105

Respiracioni i shpejtë shoqëron temperaturën e organizmit:

- A) Më të lartë se normale
- B) Më të ulët se normale
- C) Të pandryshueshme
- D) Relativisht e barabartë

Infermieri Pyetje: 106

Bradipnea është frekuenca respiratore:

- A) Nën 18 respiracione/minutë
- B) Mbi 20 respiracione/minutë
- C) Mbi 30 respiracione/minutë
- D) Nën 12 respiracione/minutë



Infermieri Pyetje: 107

Plotësimi i nevojave themelore të qenieve njerëzore janë një element i domosdoshëm për të ruajtur :

- A) Homeostazën fiziologjike
- B) Homeostazën psikologjike
- C) Homeostazën fiziologjike dhe psikologjike
- D) Asnjërën

Infermieri Pyetje: 108

Lidershipi, i cili përfshin ndjekësit e tij në zgjidhjen e problemeve, në marrjen e vendimeve dhe pjesëmarrjen e lirë në diskutime quhet:

- A) Lidershipi drejtues ose autoritar
- B) Lidershipi pjesëmarrës ose demokratik
- C) Lidershipi drejtues dhe pjesëmarrës
- D) Asnjërën





Infermieri Pyetje: 109

Kur indet subkutane është i trashë, injeksionet subkutane bëhen me kënd:

- A) 45 gradë
- B) 70 gradë
- C) 80 gradë
- D) 90 gradë

Infermieri Pyetje: 110

Sasia maksimale e dhënies së medikamenteve në injeksione intra-muskulare në mililitra është:

- A) 1 mililitra
- B) 3 mililitra
- C) 5 mililitra
- D) 7 mililitra



Infermieri Pyetje: 111

Në Parimet e ruajtjes së shëndetit nuk bën pjesë:

- A) Ushqyerja
- B) Praktikant familjare
- C) Ushtrimet
- D) Mos përdorimi i drogës dhe duhanit

Infermieri Pyetje: 112

Sëmundja Adison karakterizohet nga funksionimi jo i plotë i gjëndrës:

- A) Adrenale
- B) Hipofizës
- C) Tiroides
- D) Paratiroide





Infermieri Pyetje: 113

Parandalimi i vërtetë realizohet tek pacientët, të cilët konsiderohen fizikisht dhe emocionalisht të shëndetshëm. Ai ndryshe quhet:

- A) Parandalimi parësor
- B) Parandalimi dytësor
- C) Parandalimi tretësor
- D) Parandalimi parësor, dytësor dhe tretësor

Infermieri Pyetje: 114

Përthithja më e shpejtë e medikamenteve bëhet në rrugë:

- A) Orale
- B) Venoze
- C) Subkutane
- D) Intradermale



Infermieri Pyetje: 115

Një ndërprerje e përkohshme frymëmarrjes (shpesh duke fjetur) që zgjat të paktën 10 sekonda quhet:

- A) Takipne
- B) Bradipne
- C) Apne
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 116

Prania e qelizave epiteliale në urinë duhet të jetë:

- A) Negativ
- B) E rrallë
- C) E shpeshtë
- D) Mesatare





Infermieri Pyetja: 117

Gjatë retensionit urinar vezika urinare:

- A) Është e boshatisur
- B) Është gjysëm e mbushur
- C) Ka pak urinë reziduale
- D) Fryhet deri sa arrin umbelikusin

Infermieri Pyetja: 118

Dizuria është:

- A) Urinim i pakët
- B) Urinim i tepërt
- C) Vështirësi në urinim
- D) Paaftësi për të urinuar



Infermieri Pyetja: 119

Procesi i observimit është mbledhja e të dhënave duke:

- A) përdorur shqisat
- B) përdorur informacionin nga pacienti
- C) përdorur informacionin nga kartela e mjekut
- D) shqyrtuar rezultatet laboratorike

Infermieri Pyetja: 120

Observimi me anë të dëgjimit quhet:

- A) Perkusion
- B) Askultacion
- C) Palpacion
- D) Asnjëra





Infermieri Pyetja: 121

Informacioni që dërgohet ose shprehet nga dërguesi gjatë një procesi komunikimi quhet:

- A) Referent
- B) Mesazh
- C) Marrës
- D) Mjedis

Infermieri Pyetja: 122

Pikëpamjet personale rreth ngjarjeve që ndodhin në një mjedis quhen:

- A) Perceptime
- B) Emocione
- C) Vlera
- D) Besime



Infermieri Pyetja: 123

Një individ mund të qëndrojë pa ujë:

- A) 2-3ditë
- B) 3-5ditë
- C) 5-7ditë
- D) 8-9ditë

Infermieri Pyetja: 124

Lidhja ndihmuese është lidhja:

- A) Infermier-infermier
- B) Infermier-Mjek
- C) Infermier-Pacient
- D) Pacient -Familja





Infermieri Pyetje: 125

Aftësia për të kuptuar, pranuar jetën e një personi tjetër dhe për të saktësuar ndjenjat perceptuese quhet:

- A) Kujdes
- B) Empati
- C) Besim
- D) Reciprocitet

Infermieri Pyetje: 126

Pulsi qendror është pulsi i cili matet:

- A) në arterien temporale
- B) në arterien brakiale
- C) në arterien carotis
- D) në arterien radiale



Infermieri Pyetje: 127

Pakësimi i masës muskulare si quhet:

- A) atrofi
- B) atoni
- C) plogështi
- D) kontrakturë

Infermieri Pyetje: 128

Në karakteristikat e një lidhje ndihmuese nuk bën pjesë:

- A) besimi
- B) empatia
- C) kujdesi
- D) testimi





Infermieri Pyetje: 129

Analiza e cila shërben për të matur çrregullimet acido-bazike në gjak quhet:

- A) Niveli i protrombinës
- B) Koha howell
- C) Hemokultura
- D) Gazanaliza e gjakut

Infermieri Pyetje: 130

Kur diagnoza nuk është e saktë dhe nuk është vendosur që pacienti të shtrohet ai dërgohet në:

- A) në sallën e operacionit
- B) në terapinë intensive
- C) në pavion ose në klinikë
- D) dhomën e observimit

Infermieri Pyetje: 131

Ulja e nivelit të dioksidit të karbonit në gjak quhet:

- A) Hiperventilim
- B) Hipoventilim
- C) Hiperkapni
- D) Hipokapni

Infermieri Pyetje: 132

Një respiracion i shpejtë dhe shumë i thellë quhet:

- A) Hiperventilim
- B) Hipoventilim
- C) Respiracion i thellë
- D) Respiracion i cekët





Infermieri Pyetje: 133

Cili nga këta elementë nuk bën pjesë në faktorët e jashtëm të mjedisit që ndikojnë në shëndetin e pacientit:

- A) kontrolli i ndriçimit
- B) përdorimi i ngjyrave
- C) kontrolli i lagështirës
- D) nevoja për dashuri dhe ngrohtësi

Infermieri Pyetje: 134

Hipoventilimi është:

- A) shtim i frekuencës respiratore
- B) pakësim i frekuencës respiratore
- C) ventilim i ulët dhe i papërshtatshëm
- D) rritje e kapacitetit vital

Infermieri Pyetje: 135

Hipoksemi quhet:

- A) rritja e nivelit të dioksidit të karbonit në gjak
- B) reduktimi i nivelit të dioksidit të karbonit në gjak
- C) rritja e nivelit të oksigjenit në gjak
- D) reduktimi i nivelit të oksigjenit në gjak

Infermieri Pyetje: 136

Vala e gjakut e krijuar nga tkurrja e ventrikulit të majtë të zemrës quhet:

- A) Presion arterial
- B) Puls
- C) Takikardi
- D) Bradikardi



Infermieri Pyetje: 137

Presioni i ulët i gjakut që ndodh kur personi ngrihet nga pozicioni ulur apo shtrirë në këmbë quhet:

- A) Hipertension
- B) Hipotension Ortostatik
- C) Hipotension
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 138

Ekzaminimi bakterologjik i feçeve quhet:

- A) Koprokulturë
- B) Urokulturë
- C) Hemokulturë
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 139

Injektimi i një substance medikamentoze nën lëkurë quhet :

- A) Injeksion i/m
- B) Injeksion s/c
- C) Injeksion i/d
- D) Injeksion i/v

Infermieri Pyetje: 140

Cila nga rrugët e mëposhtme nuk është një rrugë ushqyerjeje për pacientin:

- A) Gastrostomia
- B) Sonda nazo-gastrike
- C) Rruga intavenoze
- D) Kanjula nazale

Infermieri Pyetje: 141

Sasia e urinës që mbetet në vezikën urinare pas aktit të urinimit quhet:

- A) Retension urinar
- B) Oliguri
- C) Inkontinencë urinare
- D) Urina reziduale

Infermieri Pyetje: 142

Urinimi i shpeshtë gjatë natës quhet:

- A) Narkolepsi
- B) Hematuri
- C) Dizuri
- D) Nikturi

Infermieri Pyetje: 143

Masa fekale e forcuar e grumbulluar dhe e ngecur në rektum dhe në raste të rënda gjendet në sigmoide, e cila është e pamundur për tu nxjerrë jashtë quhet:

- A) Konstipacion
- B) Koprolite
- C) Tenezma
- D) Dhimje rektale

Infermieri Pyetje: 144

Presioni diastolik është kur ventrikuli i majtë është:

- A) i kontraktuar
- B) gjysëm i kontraktuar
- C) i relaksuar
- D) gjysëm i relaksuar



Infermieri Pyetje: 145

Paafëtesia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe të gazrave nga anusi quhet:

- A) Inkontinenca fekale
- B) Inkontinenca urinare
- C) Diarrea
- D) Konstipacion

Infermieri Pyetje: 146

Shtimi i numrit të defekimit në ditë dhe nxjerrja e feçeve të paformuara dhe të lëngshme quhet:

- A) Diarre
- B) Laksativ
- C) Koprolite
- D) Infeksione intestinale



Infermieri Pyetje: 147

Përdorimi i laksativëve ose i klizmave pastruese bëhet në rast se ndodh:

- A) Diarre
- B) Konstipacion
- C) Inkontinenca fekale
- D) Inkontinenca urinare

Infermieri Pyetje: 148

Dhimbja që shkaktohet si rrjedhojë e dëmtimeve të mbaresave nervore periferike ose nga dëmtimi i sistemit nervor qendror quhet:

- A) Dhimbje neuropatike
- B) Dhimbje viscerale
- C) Dhimbje somatike
- D) Dhimbje akute





Infermieri Pyetje: 149

Ruajtja e ekuilibrit hidrik është një pjesë e sistemit të brëndshëm hemostatik dhe çrregullohet nëse:

- A) çrregullohet ekuilibri elektrolitik
- B) çrregullohet presioni osmotik
- C) çrregullohet ngrohja trupore
- D) çrregullohet ekuilibri acido-bazik

Infermieri Pyetje: 150

Cila nga elementët e mëposhtëm është mikroelementë?

- A) Uji
- B) Proteinat
- C) Yndyrnat
- D) Vitaminat



Infermieri Pyetje: 151

Burimet ditore të ujit me anë të oksidimit metabolik janë:

- A) 150-200
- B) 200-300
- C) 200-400
- D) 300-400

Infermieri Pyetje: 152

Aparati i cili shërben për të matur Kapacitetin Total Pulmonar quhet:

- A) Oksimetër
- B) Monitor
- C) Spirometër
- D) Aspirator





Infermieri Pyetje: 153

Grumbullimi i gjakut në kavitetin pleural quhet:

- A) Pneumotoraks
- B) Hemotoraks
- C) Hidrim
- D) Lagështim

Infermieri Pyetje: 154

Jonet Fosfat (HPO_4)³⁻ janë:

- A) katione
- B) anione
- C) minerale
- D) elektrolite



Infermieri Pyetje: 155

Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët me probleme respiratore është pozicioni fowler i cili përdoret për të ndihmuar:

- A) Menaxhimin e stresit
- B) Riaktivizimin e aparatit kardiopulmonar
- C) Zgjerimin e mushëkrive
- D) Teknikat relaksuese

Infermieri Pyetje: 156

Drenimi i hapësirës pleurale për të nxjerrë ajrin nga kjo hapësirë realizohet në rast:

- A) Pneumoperitoneumi
- B) Hemotoraksi
- C) Pneumotoraksi
- D) Hemartroze





Infermieri Pyetje: 157

Sa është koha që duhet të përdorim, që të stimulojmë respiracionin dhe të parandalojmë apneë?

- A) 3-4 min
- B) 5-10min
- C) 10-15min
- D) 15-20min

Infermieri Pyetje: 158

Aspirimi i lëngut amniotik tek fëmija gjatë lindjes duhet të kryhet jo më shumë se?

- A) 5sek
- B) 10sek
- C) 10min
- D) 15min



Infermieri Pyetje: 159

Pas sa orësh normalizohet temperatura pas lindjes?

- A) 6 minuta
- B) 8 minuta
- C) 5 orë
- D) 8 orë

Infermieri Pyetje: 160

Kush është pozicioni që ushqehet fëmija me çrregullim të buzës të lepurit?

- A) shtrirë mbi bark
- B) shtrirë anash
- C) gjysëm vertikal
- D) shtrirë me kurriz





Infermieri Pyetje: 161

Aplikimi i vitaminës K tek i porsalinduri bëhet:

- A) në dozën 1 mg IM
- B) në dozën 0.5 mg IM
- C) në dozën 1 mg IV
- D) në dozën 0.5 mg IV

Infermieri Pyetje: 162

Me çfarë substancie trajtohet mukozja e gojës në fëmijët me stenozë të pilorit?

- A) Bikarbonat
- B) Nitrat
- C) Gencian violet
- D) Glukoz



Infermieri Pyetje: 163

Edema serosanguine shoqërohet me:

- A) Frakturë të kafkës
- B) Petekie ose ekimoza
- C) Shkollitje të lëkurës
- D) Deformim të gojës

Infermieri Pyetje: 164

Cefalofematoma është një hemorragji që ndodh në zonën ndërmjet:

- A) lëkurës dhe kockës
- B) kockës dhe periostit
- C) trurit dhe kockës
- D) periostit dhe trurit





Infermieri Pyetje: 165

Zhvillimi pamor i fëmijës së porsalindur është rreth një gjatësie:

- A) 20 cm
- B) 40 cm
- C) 50 cm
- D) 60 cm

Infermieri Pyetje: 166

Fëmija fillimisht kur lind aspirohet nga:

- A) hunda
- B) goja
- C) veshi
- D) syri



Infermieri Pyetje: 167

Në cefalohematomë vlerësohet si ndërlikim:

- A) shfaqja e ikterit
- B) humbja e kujtesës
- C) çrregullimi i temperaturës
- D) çrregullimi i frymëmarrjes

Infermieri Pyetje: 168

Gjatë fototerapisë tek i porsalinduri, duhet të mbulohet:

- A) koka
- B) sytë
- C) gjymtyrët
- D) asnjë pjesë e trupit





Infermieri Pyetje: 169

Cilat janë shenjat që fëmija paraqet në një frakturë të klavikulës?

- A) Asimetri në refleksin moro
- B) Paralizi të krahut
- C) Një hemoragji të krahut
- D) Demtime të trupit

Infermieri Pyetje: 170

Sa janë vlerat e bilirubinës kur ikteri fiziologjik ka filluar të shfaqet në anësit e poshtme?

- A) 10 mg/dl
- B) 15 mg/dl
- C) 20 mg/dl
- D) 25 mg/dl



Infermieri Pyetje: 171

Paraplegjia prek këto regjione:

- A) Vetëm 1 gjymtyrë
- B) Vetëm 1 pjesë të trupit
- C) Këmbët gjymtyrët dhe trupin
- D) 2 këmbët dhe trungun e trupit

Infermieri Pyetje: 172

Faza sensomotore kujt moshe i përket sipas Piazhes:

- A) lindje deri në 2 vjeç
- B) 3 deri në 4 vjeç
- C) 5 deri në 7 vjeç
- D) 8 deri në 10 vjeç



Infermieri Pyetje: 173

Shpirti i iniciativës kundrejt ndjenjës së fajit kujt moshe i perket?

- A) Lindje deri 2 vjeç
- B) 3-6vjeç
- C) 7-11 vjeç
- D) 13-15vjeç

Infermieri Pyetje: 174

Rrugët e infektimit të eritrodermes janë:

- A) Transplacentare
- B) Ushqyerja artificiale
- C) Frymëmarrja
- D) Veshjet

Infermieri Pyetje: 175

Presioni sistolik i gjakut tek infanti:

- A) 15- 20
- B) 30-40
- C) 50-60
- D) 70-90

Infermieri Pyetje: 176

Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e vegjël është:

- A) 15-20
- B) 30-40
- C) 50-70
- D) 80-100

Infermieri Pyetje: 177

Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e rritur:

- A) 15-20
- B) 20-40
- C) 50-70
- D) 90-110

Infermieri Pyetje: 178

Me çfarë shenjash shoqërohet atrezia biliare?

- A) Distension abdominal
- B) Dhimbje këmbë
- C) Dhimbje koke
- D) Nauze

Infermieri Pyetje: 179

Manifestimet klinike të sindromës hemoragjike janë:

- A) gjakosje të umbelikut
- B) dhimbje barku
- C) dhimbje këmbë
- D) nauze

Infermieri Pyetje: 180

Simptomat e tetanozit neonatal janë:

- A) spazma të muskulaturës së qafës dhe rigiditet
- B) të vjella
- C) diarre
- D) dhimbje barku

Infermieri Pyetje: 181

Shenja klinike e paralizës faciale është se nuk:

- A) mbyll plotësisht syrin
- B) merr dot frymë
- C) lëviz krahun
- D) lëviz trupin

Infermieri Pyetje: 182

Sipas Frojdit kujt moshe i përket stadi latent?

- A) 1-4 vjeç
- B) 6-12 vjeç
- C) 15-18 vjeç
- D) 20-25 vjeç

Infermieri Pyetje: 183

Apneja shoqërohet me:

- A) bradikardi
- B) dhimbje barku
- C) nauze
- D) diarre

Infermieri Pyetje: 184

Mund që çojnë në hernie umbilikale?

- A) shtrëngimi në momentin e jashtëqitjes
- B) dhimbje këmbë
- C) dhimbje barku
- D) dhimbje koke



Infermieri Pyetje: 185

Cili është faktori që ka lidhje me sindromin hemorragjik?

- A) Mungesa e vitaminës K nga nëna
- B) Mungesa e oreksit
- C) Nauzea
- D) Diarrea

Infermieri Pyetje: 186

Paraliza e nervit frenik shkakton paralize të:

- A) diafragmës
- B) krahut
- C) kembës
- D) barkut

Infermieri Pyetje: 187

Çfarë ndodh në organizëm në fazën e 5 të helmimit nga hekuri?

- A) Zhvillohet stenoza e pilorit
- B) Dëmtim të mëlçisë
- C) Dëmtim të veshkave
- D) Dëmtim të zemrës

Infermieri Pyetje: 188

Tek kriza vazo-okluzive e drepanocitozes simptomat më të mëdha janë:

- A) artralgji
- B) temperatura
- C) anemi
- D) marrje mendsh





Infermieri Pyetje: 189

Kur epistaksin e kemi nga arteria etmoide, ka lidhje më shumë me:

- A) traumat
- B) sëmundjet sistematike
- C) dëmtime të zemrës
- D) dëmtime të gojës

Infermieri Pyetje: 190

Në rast se trupi i huaj është i vogël dhe kalibri i bronkut i madh do kemi këto shenja:

- A) fishkëllim
- B) vështirësi të frymarrjes
- C) sekrecione
- D) dispne



Infermieri Pyetje: 191

Në rast se trupi i huaj ka bërë një bllokim të pjesshëm të lumenit do kemi:

- A) emfizem obstruktive
- B) atelektaze
- C) pneumotoraks
- D) bronkit

Infermieri Pyetje: 192

Kur kemi një infeksion të adenoidit kemi këto shenja kryesore:

- A) dhimbje veshi
- B) frymëmarrje me gojë
- C) gjakrrjedhje nga hunda
- D) gërrhitje





Infermieri Pyetje: 193

Respiracioni i pafrytshëm lidhet me:

- A) deficitin e volumit të lëngjeve
- B) rritjen e kërkesave metabolike
- C) rritjen e sekrecioneve
- D) inflamacionin e pemës trakeo-bronkiale



Infermieri Pyetje: 194

Glomerulonefriti akut futet në grupin e sëmundjeve të sistemit urinar, ku ato quhen:

- A) reaksion inflamator
- B) reaksion indor
- C) ulje të imuniteti
- D) sëmundje infektive

Infermieri Pyetje: 195

Në astmë, faktori endokrinologjik si tireotoksikoza:

- A) e përmirëson astmën
- B) e agravon gjëndjen
- C) nuk ndikon fare
- D) ka ndikim të papërfillshëm

Infermieri Pyetje: 196

Tek astma, cilat janë elemente që kanë veprim obstruktiv mbi bronke?

- A) makrofaget
- B) monocidet
- C) bikarbonati
- D) glukonate

Infermieri Pyetje: 197

Shenjat e intoksikimit nga digoxina janë:

- A) nauze
- B) lipotemi
- C) hipoglicemi
- D) anoreksi

Infermieri Pyetja: 545

Koliret midriatike indikohen në rastet me:

- A) Sklerit
- B) Iridociklit
- C) Glaukomë kronike me kënd të hapur
- D) Glaukomë me kënd të mbyllur

Infermieri Pyetja: 546

Cilët nga kolirët e mëposhtëm japin hipertoni okulare?

- A) Midriatikët
- B) Miotikët
- C) Antiseptikët
- D) Antibiotikët

Infermieri Pyetja: 547

Cili nga koliret e mëposhtëm favorizon rrjedhjen e lëngut uxor jashtë syrit:

- A) Pilocarpina
- B) Timololi
- C) Atropine
- D) Neosinefrina

Infermieri Pyetja: 548

Cili nga koliret e mëposhtëm redukton sekrecionin e lëngut uxor?

- A) Betablokuesit
- B) Kortikoidet
- C) Acetazolamidi
- D) Kolinergjikët

Infermieri Pyetje: 549

Cili nga propozimet e mëposhtme nuk shkakton katarakt?

- A) Hipokalçemia
- B) Diabeti
- C) Marrja e kortikoidëve
- D) Marrja e indometacinës

Infermieri Pyetje: 550

Cilët janë argumentët në favor të konjuktivitit?

- A) Cefalea e fortë
- B) Kornea transparente
- C) Ulja e pamjes
- D) Prekja unilaterale

Infermieri Pyetje: 551

Në cilin nga lezionet e mëposhtme nuk duhet të kërkohet prezenca e një trupi të huaj intra okular?

- A) Plagë e kornesë
- B) Opacitet i kristalinit
- C) Hemoragji sub-konjuktivale
- D) Zbardhje e papilës

Infermieri Pyetje: 552

Cili nga propozimet që i përkasin glaukomës me kënd të mbyllur nuk është i saktë?

- A) Trajtimi medical mbështetet në përdorimin e hipotonikëve me rrugë të përgjithshme
- B) Miotikët janë të kundraindikuar
- C) Trajtimi kirurgjikal sekondar është i nevojshëm
- D) Kriza e glaukomës akute përfaqëson mbylljen jo komplete të këndit irido-korneal

Infermieri Pyetje: 553

Për të kontrolluar rritjen e bakterieve në mungesë të infeksionit në pacientët me ulçerë dekubituese rekomandohen:

- A) Antibakterial lokalë
- B) Antiinflamatorë
- C) Analgjezikë
- D) Antimykotikë

Infermieri Pyetje: 554

Një dëmtim të aftësive të pacientit me ulçerë dekubituese për të rezistuar ndaj infeksionit e tregon:

- A) Një edemë e thellë subkutane
- B) Një prurit i rëndë
- C) Një sasi e shtuar eksudati dhe një shkatërrim progresiv i indeve
- D) Rritja e temperaturës së lëkurës

Infermieri Pyetje: 555

Cila prej shkaqeve të mëposhtme bën pjesë në shkaqet e brendshme të sëmundjeve të lëkurës:

- A) mykotike
- B) parazitare
- C) gjenetike
- D) kimike

Infermieri Pyetje: 556

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt antiseptik:

- A) acicloviri
- B) sol. Gencian violet
- C) sol. Benzilbenzoat
- D) hidrokortizoni

Infermieri Pyetje: 557

Shfaqja e lezioneve në Herpes Zoster ngjan me Herpesin Simplex, por veçoria kryesore është:

- A) Shfaqja e lezioneve vizaton trajektoren e nervave sensitive
- B) Shfaqja e papulave të rastësishme
- C) Telengioektazitë dhe pigmentimi
- D) Shfaqja e papulave me mure të forta rrethore

Infermieri Pyetje: 558

Shfaqja më e shpeshtë klinike e HSV-1 (Herpes Simplex Virus 1) është:

- A) Papula me mure të forta rrethore
- B) Telengioektazi dhe pigmentim
- C) Një grup me vezikula mbi një bazë eritematoze
- D) Makula të vogla me kruste të verdha të forta

Infermieri Pyetje: 559

Incidenca në patologjinë e Psoriasis zakonisht më e ulur është në:

- A) Racat e bardha
- B) Racat e zeza
- C) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të lartë të rruazave të kuqe të gjakut
- D) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të ulët të rruazave të kuqe të gjakut

Infermieri Pyetje: 560

Funksionin e saj sekretor, lëkura e realizon nëpërmjet :

- A) poreve të lëkurës
- B) hapësirave ndërçelimore
- C) folikujve të flokut
- D) gjendrave të yndyrës dhe djersës

Infermieri Pyetje: 561

Funksionin sensitiv lëkura e realizon nëpërmjet:

- A) pH të saj acid
- B) mbaresave nervore
- C) proceseve të shumta metabolike
- D) shtresës së shndritshme

Infermieri Pyetje: 562

Krusta është element morfologjik dytësor që formohet nga :

- A) disa qeliza të brirëzuara të shtresës korneale
- B) tharja e sekrecioneve të vezikulave, erozioneve apo ulçerave
- C) traumatizimi i lëkurës me anë të thonjve
- D) hollimi i sipërfaqes së të gjitha shtresave të lëkurës

Infermieri Pyetje: 563

Përdorimi i acidit salicilik, për cilën nga patologjitë e mëposhtme është karakteristike:

- A) Psoriazis vulgaris
- B) Variçela
- C) Erizipela
- D) Skabies

Infermieri Pyetje: 564

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt keratolitik:

- A) permanganati i kaliumit
- B) pomada me gentamicinë
- C) acidi salicilik
- D) kortizonikët lokalë

Infermieri Pyetje: 565

Adipocitet janë qeliza të pranishme në :

- A) epidermë
- B) shtresën bazale të lëkurës
- C) shtresën papilare të dermës
- D) hipodermë

Infermieri Pyetje: 566

Cilën nga funksionet e mëposhtme kryen melaninia:

- A) merr pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare
- B) mbron lëkurën nga veprimi i rrezeve ultraviolette
- C) siguron funksionin mbrojtës kimik
- D) siguron mbajtjen konstante të temperaturës

Infermieri Pyetje: 567

Cila nga karakteristikat e mëposhtme i përket shtresës korneale:

- A) është shtresa e parë e epidermës duke u nisur nga brendësia në sipërfaqe
- B) përbëhet nga qeliza të mëdha me bërthamë
- C) merr pjesë në rigjenerimin e shtresave të sipërme të epidermës
- D) përbëhet nga qeliza të vdekura pa bërthamë

Infermieri Pyetje: 568

Në pacientët me Urtikarie, reaksioni i lëkurës është shoqëruar me një çlirim të histaminës, medikamentet e zgjedhura janë:

- A) Antibiotikët
- B) Antimykotikët
- C) Antihistaminikët
- D) Antiviralët

Infermieri Pyetje: 569

Cilat nga qelizat e mëposhtme marrin pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare të organizmit:

- A) qelizat e Masonit
- B) melanocitet
- C) qelizat e Langerhansit
- D) adipocitet

Infermieri Pyetje: 570

Infeksionet bakteriale lokale zakonisht mjekohen me:

- A) Antiviral
- B) Antibiotikë topikal
- C) Nizoral
- D) Antihistaminikë

Infermieri Pyetje: 571

Cilat janë komplikacionet që takohen tek pacienti pas demtimit të sistemit nervor qendror?

- A) Paraliza
- B) Dhimbje kyçesh
- C) Dhimbje muskujsh
- D) Temperaturë e lartë

Infermieri Pyetje: 572

Sa % e foshnjave të lindura nga nëna me Miaseni gravis shfaqin simptoma të sëmundjes?

- A) 44% e foshnjave
- B) 34% e foshnjave
- C) 24% e foshnjave
- D) 14% e foshnjave

Infermieri Pyetja: 573

Parkinsoni prek më shpesh grup-moshat:

- A) 50-55 vjeç
- B) 60-65 vjeç
- C) 70-75 vjeç
- D) 80-85 vjeç

Infermieri Pyetja: 574

Zona Wernicke, e lokalizuar midis zonave paresore te degjimit dhe shikimit eshte shume e rendesishme per:

- A) Interpretimin e gjuhes
- B) Pergjegjese per gjenerimin e modeleve levizore
- C) Termoregulacionin
- D) Shikimin

Infermieri Pyetja: 575

Demtmet konjitive tek pacienti me skleroze multiple hasen ne:

- A) Fazen e hershme te semundjes
- B) Fazen e mevonshme
- C) Nuk takohen te tilla demtime
- D) Jane simptoma paralajmeruese

Infermieri Pyetja: 576

Vëzhgimi dhe vlerësimi neurologjik i pacientit me epilepsi , nga ana e infermierit, janë faktorë të rëndësishëm sepse:

- A) Përcaktojnë tipin e krizës epileptike
- B) Përcaktojnë llojin medikamentoz të trajtimit
- C) Vendosin diagnozën përfundimtare
- D) Nuk janë pjesë e kujdesit

Infermieri Pyetje: 577

Termi hiperemi aktive i referohet ngjyrës së lëkurës:

- A) pas djegies së saj
- B) normale
- C) pas mjekimit
- D) pas një traume

Infermieri Pyetje: 578

Hypotermia aksidentale është një gjendje ku personi ekspozohet:

- A) në temperatura shumë të ulta
- B) në temperatura të ulta
- C) në situata aksidentale
- D) në temperatura të larta

Infermieri Pyetje: 579

Hypotermia urbane është :

- A) ekspozimi ekstrem ndaj të ftohtit në mjedise urbane
- B) ulja e temperaturës trupore nga kontakti me ujë të ftohtë
- C) ulja e temperaturës trupore nga patologji të ndryshme
- D) ulja e temperaturës trupore nga të ftohtit

Infermieri Pyetje: 580

Hemoragjia, quhet e ndërmjetme kur shfaqet :

- A) gjatë operacionit
- B) pak orë pas operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtme

Infermieri Pyetje: 581

Hemoragjia, quhet primare kur shfaqet:

- A) pak orë pas operacionit
- B) gjatë operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

Infermieri Pyetje: 582

Ndihma e parë në raste hemoragjive është:

- A) vendosja shtrirë e pacientit
- B) vendosja e bandazhit
- C) vendosja e akullit
- D) terapi medikamentoze

Infermieri Pyetje: 583

Donatori lejohet të japë gjak pasi të kenë kaluar të paktën:

- A) 45 ditë nga dhurimi i fundit
- B) 56 ditë nga dhurimi i fundit
- C) 65 ditë nga dhurimi i fundit
- D) 75 ditë nga dhurimi i fundit

Infermieri Pyetje: 584

Sasia e gjakut që dhurohet është të paktën :

- A) 350ml
- B) 450 ml
- C) 550ml
- D) 650ml

Infermieri Pyetje: 585

Pesha minimale trupore për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 40 kg
- B) 50 kg
- C) 60 kg
- D) 70 kg

Infermieri Pyetje: 586

Mosha minimale për një donator gjaku është:

- A) 15 vjeç
- B) 17 vjeç
- C) 20 vjeç
- D) 25 vjeç

Infermieri Pyetje: 587

Mosha maksimale për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 45 vjeç
- B) 55 vjeç
- C) 65 vjeç
- D) 75 vjeç

Infermieri Pyetje: 588

Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët pas operacionit është :

- A) pozicioni semi - Fowler
- B) pozicioni Fowler
- C) tredelenburg
- D) gjinekologjik

Infermieri Pyetje: 589

Mjeku Reanimator është anëtar në grupin:

- A) steril
- B) jo steril
- C) vezhgues
- D) qarkullues

Infermieri Pyetje: 590

Numërimi i veglave kirurgjikale para dhe pas operacionit kryhet nga:

- A) infermiera qarkulluese
- B) infermiera instrumentare
- C) mjeku kirurg
- D) mjeku anestezi

Infermieri Pyetje: 591

Me termin asepsi nënkuptojmë:

- A) Eliminim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar
- B) Kufizim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar
- C) Pastrim
- D) Dezinfektim

Infermieri Pyetje: 592

Asepsia kirurgjikale përfshin të gjitha si më poshtë përveç:

- A) Përdorimin e dorezave sterile gjatë vendosjes së kateterit urinar
- B) Përdorimin e pajisjeve sterile në ndryshimin e garzave të plagës
- C) Larjen e duarve para dhe pas kryerjes së manipulimeve
- D) Sterilizimin e instrumentave kirurgjikal

Infermieri Pyetje: 593

Asepsia mjekësore përfshin :

- A) Larjen e duarve para dhe pas servirjes së ushqimit
- B) Larjen e duarve pas zbrazjes së uturakut
- C) Përdorimin e dorezave sterile gjatë mjekimit të plagës
- D) Larjen e duarve para, pas servirjes së ushqimit dhe pas zbrazjes së uturakut

Infermieri Pyetje: 594

Flebotomia konsiston në :

- A) venipunkturën dhe thithjen e gjakut
- B) dëmtimin e enës së gjakut
- C) venipunkturën dhe dhënien e gjakut
- D) aplikimin e infuzioneve

Infermieri Pyetje: 595

Vlerësimet fizike të pacientit në periudhën preoperative përfshijnë të gjitha si më poshtë, përveç :

- A) Vlerësimin e bilancit hidrik dhe elektrolytik
- B) Vlerësimin e statusit ushqimor
- C) Vlerësimin e funksionit kardiovaskular
- D) Vlerësimin e ankthit

Infermieri Pyetje: 596

Bën pjesë në anëtarët e grupit steril :

- A) Kirurgu
- B) Anestezisti
- C) Infermiera qarkulluese
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetja: 597

Administrimi i opiateve para operacionit ndihmon :

- A) në paksimin e sekrecioneve
- B) uljen e tonusit muskular
- C) reduktimin e ankthit dhe stresit
- D) tharjen e mukozave

Infermieri Pyetja: 598

Administrimi i antikolinergjikëve para operacionit ndikon në :

- A) në pakësimin e sekrecioneve
- B) reduktimin e ankthit dhe stresit
- C) uljen e tonusit muskular
- D) tharjen e mukozave

Infermieri Pyetja: 599

Asepsitë kirurgjikale janë aktivitete që :

- A) minimizojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- B) eliminojnë numrin dhe përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- C) pakësojnë numrin e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- D) pakësojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar

Infermieri Pyetja: 600

Asepsia është procedura që bën të mundur:

- A) eliminimin e të gjithë mikroorganizmave
- B) eliminimin e shumicës së mikroorganizmave
- C) pakësimin e të gjithë mikroorganizmave
- D) pakësimin e shumicës së mikroorganizmave

Infermieri Pyetje: 601

Anëtarë të grupit jo steril janë të gjithë si më poshtë përveç:

- A) Anestezisti
- B) Infermiera qarkulluese
- C) Ndihmës kirurgu
- D) Teknikët radiolog

Infermieri Pyetje: 602

Praktikat që ulin dhe pengojnë proceset e infeksionit në pacientët post– kirurgjikal quhen:

- A) Teknika Dezinfektuese
- B) Teknika Dekontaminuese
- C) Teknika Kontrolli
- D) Teknika Aseptike

Infermieri Pyetje: 603

Pacientët e pranuar në Njësinë e Kujdesit Post – Anestezik pa refleksin faringeal duhet të vendosen në pozicion:

- A) Dorsal
- B) Lateral
- C) Fowler
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 604

Infermieri duhet të njohë shenjat dhe simptomat e pengesës respiratore tek pacienti në periudhën post operatore, këto shenja përfshijnë:

- A) përdorimi i muskujve ndihmës gjatë frymëmarrjes
- B) hipotension arterial
- C) dhimbje kraharori
- D) asnjëra

Infermieri Pyetja: 605

Përdorimi i klizmës pastruese është i detyrueshëm të aplikohet :

- A) para të gjitha llojeve të operacioneve
- B) para operacioneve që përfshijnë traktin gastro - intestinal
- C) para operacioneve që përfshijnë traktin uro -genital
- D) para asnjë lloj operacioni pasi nuk rekomandohet më

Infermieri Pyetja: 606

Infermiera qarkulluese është pjesë e:

- A) grupit steril
- B) grupit josteril
- C) grupit vëzhgues
- D) nuk është antare e bllokut operator

Infermieri Pyetja: 607

Ruajtja e sigurisë dhe integritetit të fushës sterile gjatë procedurës kirurgjikale është detyrë e :

- A) kirurgut primar
- B) anestezistit
- C) infermieres qarkulluese
- D) infermieres instrumentare

Infermieri Pyetja: 608

Në rast se pas operacionit kanë kaluar më shumë se 12 – 18 orë dhe pacienti nuk ka urinuar, ndërhyrje primare është :

- A) vendosja e kateterit urinar
- B) nxitja e pacientit për të urinuar vetë nëpërmjet përdorimit të borsave të ngrohta
- C) vendosja e kateterit supra pubik
- D) asnjëra

Infermieri Pyetje: 609

Hipotensioni arterial në periudhën post –operatore mund të shkaktohet nga:

- A) Acidoza
- B) Hipokseミア
- C) Disritmia
- D) Humbja e gjakut dhe e lëngjeve

Infermieri Pyetje: 610

Cila nga alternativat e mëposhtme tregon për një procedurë diagnostikuese?

- A) kolostomia
- B) ileostomia
- C) kolonoskopia
- D) jejunostomia

Infermieri Pyetje: 611

Djegjet kimike të lëkurës cilat rezultojnë nga lëndë korrozive duhet:

- A) Të shpëlahen menjëherë me ujë të rrjedhshëm për 15 – 20 min
- B) Të aplikohet pomadë
- C) Të aplikohet balsame
- D) Të fashohet menjëherë

Infermieri Pyetje: 612

Pas operacioneve gastrike pacienti këshillohet të qëndroj në pozicionin:

- A) Fowler
- B) Semi- Fowler
- C) Trendelenburg
- D) Gjinekologjik

Infermieri Pyetje: 613

Infermiera qarkulluese ka përgjegjësi për të gjitha sa më poshtë përveç :

- A) A Kryerjen e veprimeve jashtë fushës sterile
- B) Të siguroj kujdes infermieror për pacientin
- C) Të siguroj mbështetje emocionale për pacientin
- D) Të numërojë instrumentet dhe pajisjet e përdorura në operacion

Infermieri Pyetje: 614

Është procedurë diagnostikuese :

- A) qarkullimi ekstrakorporal
- B) koronarografia
- C) stenti
- D) koronaroskopia

Infermieri Pyetje: 615

Qarkullimi ekstrakorporal haset në:

- A) Kardiokirurgji
- B) Neurokirurgji
- C) Kirurgji abdominale
- D) Kirurgji estetike

Infermieri Pyetje: 616

Hematemeza është :

- A) Prania e gjakut në të vjella
- B) Prania e gjakut në feçe
- C) Rrjedhja e gjakut nga hundët
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 617

Dhënia e ushqimeve dhe e lëngjeve nga goja tek pacientët post – operator fillon:

- A) Në momentin e rifillimit të peristaltikës dhe zhurmës aktive intestinale
- B) Në momentin e rifillimit të diurezës
- C) Në momentin e stabilizimit të presionit arterial
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 618

Çrregullimi i bilancit hidro-elektrolitik tek pacientët e djegur mund të vijë si pasojë e:

- A) Humbjes të një sasive të madhe plazme
- B) Humbjes të një sasive të madhe gjaku
- C) Diurezës së shtuar
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 619

Plagët nga dekubituset janë plagë që shkaktohen nga:

- A) traumat e hapura
- B) armët e zjarrit
- C) aksidentet automobilistike
- D) qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë

Infermieri Pyetje: 620

Faktorët që ndikojnë për formimin e dekubituesëve janë të gjitha përveç:

- A) kequshqyerja
- B) higjiena e ulët
- C) gjendja emocionale
- D) qëndrimi gjatë në shtrat

Infermieri Pyetja: 621

Në një retension urinar përdoret kateteri:

- A) Robinson
- B) Nichols
- C) Foley
- D) Moby- Dick

Infermieri Pyetja: 622

Gastrostomia është procedure që ushqen pacientin nga:

- A) ezofagu
- B) stomaku
- C) jejunum
- D) kolon

Infermieri Pyetja: 623

Ndërrimi i pensamentëve të plagës operatore bëhet:

- A) 10 - 15 orë pas operacionit
- B) 16 - 24 orë pas operacionit
- C) 36 - 48 orë pas operacionit
- D) 52 - 72 orë pas operacionit

Infermieri Pyetja: 624

Trajtimi fillestar i plagës bëhet me:

- A) antibiotik
- B) kortizonik
- C) sol. fiziologjik
- D) betadinë

Infermieri Pyetja: 625

Litotripsia është thyerja e gurëve në:

- A) vezikën urinare
- B) veshka
- C) uretër
- D) kolecist

Infermieri Pyetja: 626

Një plagë quhet e papastër kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka supuracion

Infermieri Pyetja: 627

Një plagë quhet e kontaminuar kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka supuracion

Infermieri Pyetja: 628

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

Infermieri Pyetje: 629

Irrigimi i plagës nënkupton:

- A) suturimi i plagës
- B) trajtimi me antibiotik
- C) lavazhi i plagës
- D) fashimi i plagës

Infermieri Pyetje: 630

Qëllimi primar në trajtimin e ulçerës stazike venoze të këmbës është:

- A) Pastrimi i plagës me alkool
- B) Përdorimi i lidokainës lokale
- C) Sigurimi i shërimit të plagës dhe parandalimi i infeksionit
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 631

Gjatë djegies pacienti ka humbje më të theksuar të :

- A) plazmës
- B) gjakut
- C) urinës
- D) djersës

Infermieri Pyetje: 632

Ku përdoret rregulli i 9-ës?

- A) Në politrauma
- B) Në ngrirjet trupore
- C) Në djegiet trupore
- D) Plagët me armë zjarri

Infermieri Pyetje: 633

Ileusi adinamik zakonisht ndodh:

- A) 1 ditë pas operacionit
- B) 2 - 3 ditë pas operacionit
- C) 4 - 6 ditë pas operacionit
- D) 6 - 8 ditë pas operacionit

Infermieri Pyetje: 634

Mamografia është e këshillueshme të bëhet çdo vit për gra:

- A) 20 vjeç
- B) 30 vjeç
- C) 40 vjeç
- D) mbi 50 vjeç

Infermieri Pyetje: 635

Ekstravazacioni është komplikacion pas:

- A) kirurgjisë
- B) kimioterapisë
- C) radioterapisë
- D) radiografisë

Infermieri Pyetje: 636

Traumata e rënda të heparit mund të shkaktojnë:

- A) Insuficiencë renale
- B) Shok hipovolemik si pasojë e hemoragjisë
- C) Hipertension arterial
- D) Leukopeni

Infermieri Pyetje: 637

Në tumoret metastatike të heparit dallohet:

- A) Angiografi negative
- B) Zvogëlim të heparit
- C) Ascit (me nuancë gjaku)
- D) Hiperproteinemi

Infermieri Pyetje: 638

Në kancerin e gjirit nuk ndikojnë:

- A) Historia familjare me këtë diagnozë
- B) Terapia me hormone
- C) Numri i pakët i lindjeve
- D) Ulja e konsumit të yndyrnave shtazore dhe proteinave

Infermieri Pyetje: 639

Për kancerin e gjirit nuk përfshihen këto diagnoza infermierore:

- A) Ndryshime në jetën seksuale
- B) Pamundësi për infeksion
- C) Dëmtim i integritetit të lëkurës
- D) Frikë dhe ankth, lidhur me prognozën e sëmundjes

Infermieri Pyetje: 640

Në pacientët me kancer gastrik:

- A) Hemoragjia është e theksuar
- B) Në raste të rralla ndodh hemoragjia për këtë diagnozë
- C) Ikteri paraqitet në stadin e parë të sëmundjes
- D) Prognoza nuk është shumë e varfër

Infermieri Pyetje: 641

Gjatë realizimit të një transfuzioni gjaku, në 15–30 minutat e para infermieri observon pacientin për :

- A) Shenja reaksioni
- B) Shenja infeksioni
- C) Hipertension
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 642

Edukimi i një pacienti me urolitiazë në lidhje me sigurimin e një hidratimi optimal, ka si qëllim kryesor:

- A) Parandalimin e recidivave
- B) Rehidrimin e pacientit
- C) Parandalimin e komplikacioneve
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 643

Në karcinomën hepatoqelizore, testet diagnostike shpesh zbulojnë:

- A) Nivele të larta të leukociteve
- B) Nivele të larta të trombociteve
- C) Nivele të larta të AFP (alfafetoproteinës)
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetje: 644

Në rastin e gastrektomisë më e rëndësishme është të administrohet:

- A) Vitaminë E
- B) Vitaminë B12
- C) Ushqime me frekuencë të lartë
- D) Ushqime me rrugë orale

Infermieri Pyetje: 645

Ileostomia - Qëllimi i interventeve infermierore nuk përfshin:

- A) Sigurimin e eliminimit normal intestinal
- B) Reduktimin e dhimbjeve dhe spazmave abdominale
- C) Përshkrimin e medikamenteve analgjezike
- D) Reduktimin e ankthit dhe stresit

Infermieri Pyetje: 646

Në prekjën e heparit nga metastazat nuk ndikojnë:

- A) Vaskularizimi i theksuar i heparit
- B) Pozicioni i tij anatomik
- C) Niveli i koshiencës
- D) Tumoret nga trakti gastrointestinal

Infermieri Pyetje: 647

Ileusi dinamik:

- A) Ka një prognozë të varfër
- B) Në përgjithësi ka prognozë të mirë
- C) Trajtimi është gjithmonë kirurgjikal
- D) Është shkaku më i rrallë i obstruksionit intestinal

Infermieri Pyetje: 648

Për të parandaluar ulçerën stazike venoze duhet të:

- A) Ndërpritet aktiviteti fizik
- B) Ekspozohet zona e prekur në temperatura të ftohta
- C) Pozicionohen ekstremitetet më poshtë se niveli i zemrës
- D) Të kontrollohen pulset periferike dhe temperatura e ekstremiteteve

Infermieri Pyetje: 649

Faktor që nuk ndikon në kalkulozën e aparatit urinar është:

- A) Staza urinare
- B) Infeksioni i traktit urinar
- C) Staza venoze
- D) Dehidrimi

Infermieri Pyetje: 650

Për të mbajtur bilancin elektrolitik, nuk është vlerësim specifik:

- A) Niveli i elektroliteve
- B) Marrjet dhe nxjerrjet e likideve
- C) Turgori i lëkurës
- D) Niveli i gazeve në gjak

Infermieri Pyetje: 651

Pacienti me gastrostomi, nuk ka prezencë infeksioni nëse:

- A) Lëkura është e skuqur përreth inçizionit
- B) Është afebril
- C) Ka drenim nga plaga
- D) Leukocitozë

Infermieri Pyetje: 652

Interventet infermierore për pacientin me ileostomi nuk kanë për qëllim:

- A) Reduktimin e dhimbjes
- B) Pakësimin gradual të marrjeve orale
- C) Mbajtjen e bilancit elektrolitik dhe peshës trupore
- D) Sigurimin e eliminimit intestinal

Infermieri Pyetja: 653

Menaxhimi infermior, para kirurgjisë kardiake përfshin:

- A) Vetëm vlerësim të hollësishëm të sistemit kardiak
- B) Vlerësimin e sistemit respirator
- C) Vlerësim të detajuar sistemik
- D) Ndërprerjen e terapisë medikamentoze të mëparshme

Infermieri Pyetja: 654

Stafi infermior instruktton pacientët me patologji të sistemit biliar të:

- A) Shtojnë sasinë e ynyrnave
- B) Të pakësojnë kaloritë dhe yndyrnat në dietën ushqimore
- C) Të shtojnë peshën trupore
- D) Mbajnë regjim absolut pushimi

Infermieri Pyetja: 655

Nuk është prioritet i menaxhimit infermior për pacientët me gastrostomi:

- A) Mbajtja e statusit nutricional
- B) Mbrojtja integritetit të lëkurës
- C) Përshtatja me ndryshimet në imazhin trupor
- D) Përcaktimi i dietës ushqimore specifike për këta pacientë

Infermieri Pyetja: 656

Perfuzioni indor për pacientët me patologji kardiake vlerësohet me të gjitha metodat e mëposhtme përveç njëjës:

- A) Monitorimit të EKG
- B) Matjes së presionit arterial dhe nivelit të gazeve në gjak
- C) Eleminimit urinar
- D) Reagimit nga medikamentet analgjezike

Infermieri Pyetje: 657

Menaxhimi i pacientëve me obstruksion të zorrës së trashë bëhet me:

- A) Trajtim operator kur bllokimi është i pjesshëm
- B) Intervent kirurgjikal vetëm kur bllokimi është i plotë
- C) Radiografi me barium
- D) Trajtim jo kirurgjikal në rastin e perforimit intestinal

Infermieri Pyetje: 658

Komplikacioni më i shpeshtë për pacientët me ileostomi është:

- A) Kalkuloza urinare
- B) Stenoza stomale
- C) Irritimi i lëkurës peristomale
- D) Cholelithiasis

Infermieri Pyetje: 659

Limadeniti është:

- A) infeksion kirurgjikal i nyjeve limfatike
- B) infeksion akut nekrotik
- C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës
- D) infeksion akut purulent

Infermieri Pyetje: 660

Ulçera diabetike karakterizohet nga:

- A) Dhimbje shumë të fortë
- B) Dhimbje të moderuar
- C) Dhimbje të lehtë ose mungesë të saj
- D) Mungesa e recidivimit

Infermieri Pyetje: 661

Në diagnozat infermierore në rastin e ileostomisë nuk përfshihet:

- A) Alternime në komfort
- B) Spazma abdominale
- C) Imbalancë lëngjesh dhe elektrolitësh
- D) Stabilitet në eliminimin intestinal

Infermieri Pyetje: 662

Shoku septik fillon me të gjitha shenjat e mëposhtme përveç:

- A) ethe
- B) stres
- C) temperaturë të lartë
- D) hypotension

Infermieri Pyetje: 663

Karbunkuli është:

- A) inflamacion akut nekrotik purulent
- B) infeksion akut-purulent
- C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës
- D) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike

Infermieri Pyetje: 664

Organizmi shkaktar për gjendjen e sepsit të rëndë nuk mund të jetë:

- A) Escherichia coli
- B) klebsiella
- C) stafilococcus aureus
- D) virusi

Infermieri Pyetje: 665

Sa duhet të jetë diureza që të themi se funksioni renal vjen duke u përmirësuar?

- A) 20 ml/ore
- B) 25 ml/ore
- C) 30 ml/ore
- D) 40 ml/ore

Infermieri Pyetje: 666

Efektin e vet dëmtues virusi i SIDA-s e ka mbi limfocitet:

- A) A
- B) C
- C) T
- D) E

Infermieri Pyetje: 667

Cili është streptokoku më i hasur tek njerëzit:

- A) hemolitik i grupit E
- B) hemolitik i grupit C
- C) hemolitik i grupit D
- D) hemolitik i grupit A

Infermieri Pyetje: 668

Mononukleoza Infektive shkaktohet nga :

- A) neisseria gonorea
- B) clostridium botulinum
- C) virusi Epstein-Barr
- D) Plasmodium

Infermieri Pyetje: 669

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor mekanik vjen nga:

- A) mizat
- B) mushkonjat
- C) karkalecat
- D) gjinkallat

Infermieri Pyetje: 670

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga:

- A) mizat
- B) mushkonjat
- C) karkalecat
- D) gjinkallat

Infermieri Pyetje: 671

Tipar i përbashkët i gjithë infeksioneve kirurgjikale është:

- A) nekroza
- B) fistula
- C) hemorragjia
- D) hipotermia

Infermieri Pyetje: 672

Shkalla e prevalencës është raporti :

- A) nr total i të sëmurëve me sëmundje infektive / nr. i pacientëve në total
- B) nr. i pacientëve në total / nr.total i të sëmurëve me sëmundje infektive
- C) nr. i pacientëve në spital në krahasim me popullatën
- D) nr. i pacientëve në infektiv / me nr. e pacientëve në spital

Infermieri Pyetje: 673

Incidenca e infeksionit për plagët operatore të pastra duhet të jetë:

- A) nën 5%
- B) nën 7 %
- C) nën 10 %
- D) nën 15 %

Infermieri Pyetje: 674

Nuk bën pjesë në plagët e mbyllura:

- A) Kontuzioni
- B) Hematomat
- C) Sindromi Crush
- D) Plagët incizionale

Infermieri Pyetje: 675

Nuk bën pjesë në manifestimet klinike të Kontuzionit:

- A) Hematoma
- B) Fraktura
- C) Hemorragjia
- D) Nauze/të vjella

Infermieri Pyetje: 676

Shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve spitalore është :

- A) E. Coli
- B) Candidas
- C) Spiroketa
- D) Streptokoku

Infermieri Pyetje: 677

Periudha e inkubacionit të mononukleozës infektive varion :

- A) 10- 20 ditë
- B) 20- 30 ditë
- C) 30- 50 ditë
- D) 40- 60 ditë

Infermieri Pyetje: 678

Triada ethe - dhimbje fyti- zmadhim i nodjve limfatik cervikal është karakteristik e:

- A) tetanozit
- B) meningokoksisë
- C) mononukleozës infektive
- D) stafilokoksisë

Infermieri Pyetje: 679

Forma më e shpeshtë e salmonelozës është :

- A) ethet tifoide
- B) forma gastrointestinale
- C) bakteremia me ose pa infektion
- D) mbartja asimptomatike

Infermieri Pyetje: 680

Sëmundja e "papastërtisë" mund të quhet

- A) salmoneloza
- B) amebiaza
- C) ethet tifoide
- D) shigeloza

Infermieri Pyetje: 681

Përfshihet në shkaqet e hemorragjisë digjестive të poshtme:

- A) varicet e ezofagut
- B) gastritet
- C) divertikuli i Meckelit
- D) sindromi Mallory-Weiss

Infermieri Pyetje: 682

Infeksionet Nosokomiale ndryshe quhen:

- A) komune
- B) ambientale
- C) spitalore
- D) shtëpiake

Infermieri Pyetje: 683

Është karakteristike për hemorragjinë venoze:

- A) gjaku me ngjyrë të kuqe
- B) gjaku rrjedh me pulsacione
- C) rrjedhje e pandërprerë e gjakut
- D) rrjedhje e ngadalshme e gjakut të errët

Infermieri Pyetje: 684

Nuk bëjnë pjesë në grupin e përhapjes së infeksionëve nga vektorët:

- A) njerëzit
- B) minjtë
- C) mizat
- D) mushkonjat

Infermieri Pyetja: 685

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

Infermieri Pyetja: 686

Vaksina profilaktike për hepatitin B aplikohet në:

- A) një dozë
- B) dy doza
- C) tre doza
- D) katër doza

Infermieri Pyetja: 687

Nuk bën pjesë në imobilizimin e jashtëm:

- A) gipsi
- B) qaforia
- C) protezat
- D) traksioni

Infermieri Pyetja: 688

Osteomieliti është:

- A) frakturë e kockës
- B) infeksioni i kockës
- C) distorcion i artikulacionit
- D) rupturë ligamenti

Infermieri Pyetja: 689

Fiksatori ekstern përdoret në :

- A) rupturën e ligamenteve
- B) rupturën e tendinave
- C) frakturë të kockave të shkurtra
- D) frakturë të kockave të gjata

Infermieri Pyetja: 690

Sa kohë mbahet longeta e allçisë në frakturën e kockave të parakrahut?

- A) 2 javë
- B) 3 javë
- C) 6 javë
- D) 8 javë

Infermieri Pyetja: 691

Koha e tharjes së allçisë në ekstremitete është:

- A) rreth 10-12-orë
- B) rreth 12-24 orë
- C) rreth 24-48 orë
- D) rreth 48-72 orë

Infermieri Pyetja: 692

Traksioni pelvik është:

- A) i vazhdueshëm
- B) statik
- C) dinamik
- D) intermitent

Infermieri Pyetje: 693

Vlerësimi i mekanizmave të dëmtimit dhe e forcave kinetike që kanë vepruar mbi pacientin gjatë një incidenti traumatik ose aksidenti quhet:

- A) energji kinetike
- B) kinetika e traumës
- C) procesi i traumës
- D) shpejtësia e goditjes

Infermieri Pyetje: 694

"Ora e artë" ju kujton:

- A) koha në të cilën ndodh një politraum
- B) koha në të cilën transportohet një person i aksidentuar
- C) dhënia e ndihmës brenda 1 ore nga koha e dëmtimit
- D) mbledhja e të dhënave për një person të aksidentuar

Infermieri Pyetje: 695

Një frakturë quhet e stresuar kur:

- A) muskujt mbështjellës nuk e akumulojnë më energjinë e nevojshme
- B) ndodh si pasojë e patologjive të ndryshme
- C) ndodh si pasojë e traumave të jashtëme
- D) ndodh si pasojë e osteomielitit

Infermieri Pyetje: 696

Esenciale kur transportohet një pacient me politraum është:

- A) mbështjellja e pacientit
- B) imobilizimi i kokës dhe i qafës
- C) imobilizimi i ekstremiteteve të sipërme
- D) infuzionimi i pacientit

Infermieri Pyetja: 697

Në cilin lloj të traksionit sasia e peshave që aplikohet është me e vogel:

- A) te lekurës
- B) skeletal
- C) statik
- D) dinamik

Infermieri Pyetja: 698

Fiksatorët ekstern në ekstremitetet e sipërme hiqen pas:

- A) 2 javë
- B) 4 javë
- C) 6 javë
- D) 8 javë

Infermieri Pyetja: 699

Cili është qëllimi kryesor i vlerësimit infermieror preoperator?

- A) Të reduktojë morbiditetin dhe mortalitetin perioperator
- B) Të merren të dhëna për sëmundjen kirurgjikale
- C) Të hartohet një strategji menaxhimi
- D) Të hartohet një plan anestetik

Infermieri Pyetja: 700

Sa orë para duhet të ushqehen neonatët dhe fëmijët para kirurgjisë?

- A) 2 orë para kirurgjisë
- B) 30 minuta para kirurgjisë
- C) 6 orë para kirurgjisë
- D) 4 orë para kirurgjisë

Infermieri Pyetje: 701

Bronkospazma mund të shkaktojë:

- A) Qëndrueshmëri hemodinamike
- B) Hiperventilim postoperator
- C) Insuficiencë renale
- D) Hipoventilim dhe hipoksemi

Infermieri Pyetje: 702

Insuficienca respiratore në kirurgjinë abdominale ndodh nga shkaqet e mëposhtme përveç:

- A) Depresion i qendrës respiratore pas anestezisë
- B) Distensioni abdominal
- C) Dhimbja abdominale
- D) Hemorragji nga plaga

Infermieri Pyetje: 703

Cili është standarti bazë për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone:

- A) vlera e presionit arterial të dioksidit të karbonit
- B) vlera e presionit arterial të oksigjenit
- C) gazanaliza e gjakut arterial
- D) vlera e oksihemoglobinës

Infermieri Pyetje: 704

Vlera e saktë e presionit arterial të oksigjenit është:

- A) 50-70 mmHg
- B) 90-100 mmHg
- C) 100-120 mmHg
- D) 30-40 mmHg

Infermieri Pyetje: 705

Shoku hipovolemik shkaktohet nga humbja e:

- A) më shumë se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut
- B) më pak se 5-10% të masës qarkulluese të gjakut
- C) afërsisht 2-3% të masës qarkulluese të gjakut
- D) 1-5% të masës qarkulluese të gjakut

Infermieri Pyetje: 706

Në shokun hipovolemik kemi:

- A) Hipertension
- B) Lëkurë të zbehtë dhe të ftohtë
- C) Puls i ngadaltë
- D) Diurezë të shtuar

Infermieri Pyetje: 707

Interventet infermirore në rastin e shokut fillojnë me:

- A) Rivendosjen e funksionit kardiak
- B) Reduktimin e ankthit
- C) Përmirësimin e oksigjenimit
- D) Rivendosjen e bilancit elektrolitik

Infermieri Pyetje: 708

Likidet intravenoze zëvendësuese:

- A) Mbajnë volumin në hapësirën vaskulare
- B) Nuk japin asnjëherë reaksione alergjike
- C) Janë trajtues të hipovolemisë
- D) Përfshijnë edhe plazmën e frekët të ngrirë

Infermieri Pyetje: 709

Pas ingestionit të substancave korrozive është i kundërlinduar:

- A) Shplarja me likide menjëherë pas ingestionit
- B) Lavazhi gastrik
- C) Hollimi i substancës korrozive
- D) Sigurimi i rrugëve respiratore

Infermieri Pyetje: 710

Në helmimet ingestive me helme, kur pacienti nuk është i koshient së pari aplikojmë:

- A) Lavazhin me sondë orogastrike
- B) Aspirimin gastrik
- C) Vendosja e tubit endotrakeal për të mbrojtur rrugët respiratore
- D) Provokimin e të vjellave

Infermieri Pyetje: 711

Në helmimet me substanca fortësisht acide ose bazike kundërlindohen:

- A) Inserimi i sondës nazogastrike me shumë kujdes
- B) Radiografia
- C) Provokimi i të vjellave
- D) Përdorimi i qumështit në raste të veçanta

Infermieri Pyetje: 712

Veprimi i parë infermior në rastin e reaksionit akut hemolitik është:

- A) Administrimi i kortikosteroideve
- B) Trajtimi i hipotensionit me likide dhe vazopresorë
- C) Dërgimi i një mostre gjaku në bankën e gjakut
- D) Ndërprerja e menjëhershme e transfuzionit

Infermieri Pyetje: 713

Shkalla e ndryshimeve që ndodhin në organizmin e të operuarit nuk varet nga:

- A) përgatitja preoperatorë
- B) gjendja e të sëmurit pas operacionit
- C) lloji i anestezisë
- D) lloji i ndërhyrjes kirurgjikale

Infermieri Pyetje: 714

Dhimbja e patrajtuar shkakton:

- A) Rritjen e kërkesave për oksigjen
- B) Ulje të pulsit
- C) Ulje të presionit arterial
- D) Reduktim të ideve suicidale

Infermieri Pyetje: 715

Në komplikacionet e mëvonshme të operacionit bën pjesë:

- A) infeksioni
- B) ethe reumatizmale
- C) pneumotoraks valvular
- D) skoliozë

Infermieri Pyetje: 716

Vlerat e presionit venoz central janë:

- A) Shumë të ulëta në shokun hipovolemik
- B) Shumë të ulëta në shokun septik
- C) Normale në shokun kardiogjen
- D) Shumë të larta në shokun hemoragjik

Infermieri Pyetje: 717

Shoku është një sindrom i:

- A) Hipertensionit dhe perfuzionit relativisht të lartë indor
- B) Presionit arterial të lartë
- C) Hipotensionit dhe perfuzionit të ulët indor
- D) Rritjes së masës qarkulluese

Infermieri Pyetje: 718

Rastet kur indikohet intubimi endotrakeal:

- A) Ventilim i përshtatshëm
- B) Rrugëve respiratore të lira
- C) Saturimi i oksigjenit është mbi 90%
- D) Insuficienca respiratore me hiperkapni

Infermieri Pyetje: 719

Nuk bën pjesë në instrumentat kirurgjikale:

- A) pincat
- B) bisturia
- C) diverikatorët
- D) defibrilatori

Infermieri Pyetje: 720

Nuk është qëllim i pastrimit të plagës në ulcer:

- A) largimi i fibrinës
- B) largimi i nekrozës
- C) largimi i gjakut
- D) largimi i fistulës

Infermieri Pyetje: 721

Halotani është lëndë anestetike e cila përdoret:

- A) Vetëm tek fëmijët
- B) Vetëm tek të rriturit
- C) Tek fëmijët dhe të rriturit
- D) Duke mos u përzier me oksigjenin

Infermieri Pyetje: 722

Obeziteti nuk favorizon komplikacione postoperatore të tilla si :

- A) Infeksion
- B) Dehishencë të suturave
- C) Obstruksion të rrugëve respiratore
- D) Psikozën postoperatore

Infermieri Pyetje: 723

Ulcerat venoze shfaqen nga:

- A) diabeti
- B) fistulat artero-venoze
- C) infeksionet e lëkurës
- D) pamjaftueshmëria arteriale

Infermieri Pyetje: 724

Obstruksioni respirator nuk manifestohet me:

- A) Cianozë
- B) Apne
- C) Nivele normale të gazeve në gjakun arterial
- D) Përdorim të muskujve aksesor

Infermieri Pyetje: 725

Në rastin e ventilimit jo të përshtatshëm kemi:

- A) Ulje të presionit të dioksidit të karbonit
- B) Ulje të PH të gjakut (acidozë respiratore)
- C) Rritje të PH sistemik
- D) Funkcion të ruajtur të miokardit

Infermieri Pyetje: 726

Stafi infermior për interventin kirurgjikal nuk mund të përcaktojë:

- A) Diagnozën, lidhur me ankthin preoperator
- B) Diagnozën, lidhur me nivelin e dhimbjes
- C) Llojin e anestezisë që do të aplikohet
- D) Komplikacionet potenciale në periudhën postoperative

Infermieri Pyetje: 727

Kateterët ureteral kanë qëllim:

- A) Diagnostik
- B) Parandalues
- C) Terapeutik
- D) Evakuativ

Infermieri Pyetje: 728

Nuk bën pjesë në komplikacionet e menjëhershme pas operacionit:

- A) Hipertension
- B) Hipotension
- C) Hipotermi
- D) Hiperkalcemi

Infermieri Pyetje: 729

Ku bën pjesë metoda kalendarike?

- A) Në kontraktivët oralë
- B) Në metodat natyrale
- C) Në metodat barrjerë
- D) Në metodat kimike

Infermieri Pyetje: 730

Cili është mekanizmi i veprimit të një spermicidi?

- A) Mbajtja e pH acid të vaginës
- B) Mbajtja e pH alkaline të vaginës
- C) Hollimit të mukosit cervikal
- D) Trashje të mukosit cervikal

Infermieri Pyetje: 731

Cila nga simptomat e mëposhtme bën që gruaja të ndërpres menjëherë kontraktivët oral të kombinuar dhe të paraqitet tek mjeku?

- A) Çrregullime të të parit
- B) Perforacion të uterusit
- C) Infeksion
- D) Temperaturë

Infermieri Pyetje: 732

Sekretionet vaginale me erë si të peshkut të prishur është karakteristike për cilin nga këto infeksione:

- A) Herpesin genital
- B) Infeksioni nga gonorea
- C) Infeksioni nga chlamydia
- D) Vaginozën bakteriale

Infermieri Pyetja: 733

Shfaqja e ulçeracionit që në momentin e parë të inokulimit të shkaktarit në organet gjenerale është karakteristike për infeksion nga:

- A) Trikomoniaza
- B) Gonorrea
- C) Sifilizi
- D) Klamidia

Infermieri Pyetja: 734

Cili nga infeksionet seksualisht të transmetueshme ka mundësi të çojë në kancer të traktit gjenerale?

- A) Human Papiloma Virus
- B) Infeksioni trikomonial
- C) Vaginoza bakteriale
- D) Infeksioni mykotik

Infermieri Pyetja: 735

Dhimbje në kuadratet e poshtme abdominale, temperaturë, gjakrrjedhje vaginale të herë pas herëshme, sekrecione vaginale purulente, nauze, të vjella; kuadri klinik i cilës patologji i referohet:

- A) Sindromit të Shokut Toksik
- B) Sëmundjes Inflammatorë Pelvike
- C) Infeksionit trikomonial
- D) Infeksionit herpetik

Infermieri Pyetje: 736

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron të përdorë një metodë kontrceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja më e përshtatshme e mamisë do të jetë:

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e shtatzanive është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i Sëmundjes Inflammatorë Pelvike është më i madh për ju

Infermieri Pyetje: 737

Cila nga metodat kontrceptive të mëposhtme përveç efektit kontrceptiv ka ndikim për të parandaluar infeksionet seksualisht të transmetueshme?

- A) Dispozitivi intrauterin
- B) Kontraceptivi oral
- C) Sterilizimi kirurgjikal
- D) Spermicidet

Infermieri Pyetje: 738

Perforacioni i uterusit është komplikacion i cilës metodë kontrceptive:

- A) Metodave barrjerë
- B) Sterilizimit kirurgjikal
- C) Kontraceptivëve injektabel
- D) Dispozitivit intrauterin

Infermieri Pyetje: 739

Karakteristika e sekrecioneve vagjinale në infeksionin mykotik është:

- A) Sekrecione të pakta në sasi por pa erë
- B) Sekrecione të pakta në sasi por me erë
- C) Sekrecione të shumta, të trasha pa erë
- D) Sekrecione të shumta, të trasha me erë

Infermieri Pyetje: 740

Cila nga infeksionet seksualisht të transmetueshme shoqërohet me sëmundjen inflamtoe pelvike, barrën ekstrauterine, infertilitetin?

- A) Gonorea
- B) Kondyloma
- C) Klamidia
- D) Herpesi

Infermieri Pyetje: 741

Mbrojtja abdominale që përfitohet gjatë palpacionit është një e dhënë e rëndësishme që ndodh në:

- A) Sëmundjen Inflamtoe Pelvike
- B) Sindromin e Shokut Toksik
- C) Infeksionin moniliar
- D) Vaginozën bakteriale

Infermieri Pyetje: 742

Nga se shkaktohet infertiliteti?

- A) Përdorimi i tamponëve vaginalë
- B) Sëmundjet seksualisht të transmetueshme
- C) Përdorimi i metodave barijere
- D) Përjetimi i infeksionit mykotik

Infermieri Pyetje: 743

Cila nga metodat kontraktive ka efekt më të gjatë?

- A) Injeksionet Depo-Provera
- B) Kontraktivi i urgjencës
- C) Implantet subdermale
- D) Spermicidet

Infermieri Pyetje: 744

Cili nga infeksionet e mëposhtme nuk ka mjekim specifik por vetëm simptomatik?

- A) Sifilizi
- B) Herpesi Genital
- C) Gonorrea
- D) Klamidia

Infermieri Pyetje: 745

Sëmundja inflamatore pelvike jep infeksionin:

- A) Salpingitis
- B) Otitis
- C) Iritis
- D) Artrit

Infermieri Pyetje: 746

Pilulat kontraceptive të kombinuara veprojnë sipas mekanizmit të mëposhtëm përveç:

- A) nivelet e larta të estrogenit parandalojnë ovulacionin duke inhibuar prodhimin e FSH
- B) progesteroni mban mukusin cervical të trashë dhe bën kështu të vështirë penetrimin e spermës.
- C) progesteroni ndryshon shtresën e uterusit dhe e bën të papërshtatshme implantimin e vezës.
- D) veprojnë lokalisht në uterus

Infermieri Pyetje: 747

Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa pyetje rreth hepatitit, të cilat bëjnë pjesë në:

- A) Anamnezën e kaluar obstetrikale
- B) Anamnezë personale dhe familjare
- C) Historinë mjekësore
- D) Anamnezë gjenetike

Infermieri Pyetje: 748

Pacientet me diabet gestacional zakonisht menaxhohen me:

- A) Dietë
- B) Insulinë me veprim të zgjatur
- C) Hipoglicemiantë oralë
- D) Hipoglicemiantë oralë dhe insulin

Infermieri Pyetje: 749

Cila nga alternativat bën pjesë në anamnezën gjinekologjike?

- A) Histori për dysmenorrhea
- B) Infeksione gjatë periudhës së post partumit
- C) Probleme të post partumit hemoragjik
- D) Rezultatet e testeve të barrës, nëse janë kryer

Infermieri Pyetje: 750

Cila nga alternativat përfshihet në anamnezën obstetrikale?

- A) Cila ka qënë mënyra e lindjes?
- B) Kur ka ndodhur kojtusi i parë?
- C) Kë Metodë kontraceptive ke përdorur?
- D) Sa është numri i partnereve seksual?

Infermieri Pyetje: 751

Konjugata diagonale është distanca midis:

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
- B) Dy tuberozitetëve iskiadike
- C) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit
- D) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike

Infermieri Pyetje: 752

Konjugata e vërtetë është distanca midis :

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
- B) Dy tuberozitetëve iskiadike
- C) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike
- D) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit

Infermieri Pyetje: 753

Pjesa e pelvisit e cila është më shumë e përfshirë me lindjen është:

- A) Koksiksi
- B) Pelvisi falls
- C) Pelvisi i vërtetë
- D) Sakrumi

Infermieri Pyetje: 754

Informacioni i siguruar nga metodat e Leopoldit përfshin:

- A) Paraqitjen fetale
- B) Rritjen dhe zhvillimin fetal
- C) Vlersimin e toneve fetale
- D) Vlersimin e tonusit maternal

Infermieri Pyetje: 755

Metodat e Leopoldit kryesisht janë përdorur për të:

- A) Për të hequr presurën nga kordoni umbilikal
- B) Përcaktuar nëse vezika është e distenduar
- C) Sygjëruar vendin e monitorimit external të kontraksioneve uterine
- D) Vlerësuar prezentacionin dhe zbritjen

Infermieri Pyetje: 756

Frekuenca normale e toneve fetale është:

- A) 90 - 100 rrahje për minut
- B) 180 rrahje për minut
- C) 90 - 140 rrahje për minut
- D) 120 - 160 rrahje për minut

Infermieri Pyetje: 757

Një grua 4 javëshe shtatzanë i kërkon mamisë se kur ajo është në gjendje të dëgjojë RZF- të e fëmijës së saj. Mami i thotë asaj se me stetoskop ultrasonografik special apo fetoson i cili i amplifikon (i zmadhon) tonet, R.Z.F. mund të dëgjoen afërsisht

- A) 2 - 4 javësh
- B) 6 - 8 javësh
- C) 10 - 12 javësh
- D) 14- 16 javësh

Infermieri Pyetje: 758

Rrahjet e Zemrës Fetale nuk dëgjoen me stetoskop të zakonshëm obstetrikal kur kemi:

- A) Anomali fetale
- B) Moshë barre 28 javë
- C) Shtatzani me më shumë se një fetus
- D) Obezitet amtar

Infermieri Pyetje: 759

Sa shpejt arrijn të përcaktojnë barrën, ekografia me sondë vagjinale?

- A) 6 javë
- B) 4 javë
- C) Afërsisht 10 javë
- D) Pas 10 ditësh

Infermieri Pyetje: 760

Si shenjë pozitive e barrës përfshihet:

- A) Amenorrhea
- B) Lëvizjet fetale që ndihen nga nëna
- C) Rritja abdominale
- D) Sonographya

Infermieri Pyetje: 761

Një shenjë supozuese e shtatzanisë është:

- A) Kontraksionet e Braxton- Hicks
- B) Ndërprerja e menseve
- C) Shenja e Hegarit
- D) Zhurmat uterine

Infermieri Pyetje: 762

Shenja Goodell është:

- A) Diskolorim (cerviksit, mukozës së vaginës & vulvës)
- B) Përkulja e trupit të uterusit mbi cerviks
- C) Zbutja e cerviksit
- D) Zbutja e istmusit

Infermieri Pyetje: 763

Në ekzaminimin fizik, mamia vë re se cervixi i gruas është në ngjyrë të kaltër. Kjo është shënja:

- A) Cheduik
- B) Goodell
- C) e Hegarit
- D) Mc Donald (Lading)

Infermieri Pyetje: 764

Cila nga pikat e mëposhtme nuk bën pjesë në ndryshimet e lëkurës gjatë shtatzanisë?

- A) Kloasoma gravidarum
- B) Linea nigra
- C) Shenja e Hegarit
- D) Striae gravidarum

Infermieri Pyetja: 765

Mamia i shpjegon gruas se gjatë shtatzanisë sëmundja e mëngjesit (nausea & të vjellat) zakonisht takohet në :

- A) Gjashte javët e para
- B) Në 6 j - 12 j
- C) Në 8j - 16j
- D) Në muajin e pare

Infermieri Pyetja: 766

Cila nga pikat e mëposhtme nuk ndikon në lartësinë e fundusit uterin?

- A) Barra binjake
- B) Hydramnioni
- C) Qëndrimi fetal
- D) Tonusi muskular

Infermieri Pyetja: 767

Lëvizjet aktive fetale perceptohen fillimisht në:

- A) Dymbëdhjetë javë
- B) Mes muajit të gjashtë dhe të shtatë
- C) Në muajin e tretë të barrës
- D) Para se të përfundojë muaji i katërt

Infermieri Pyetja: 768

Kujdesi prenatal është ideale të fillojë:

- A) Pas mundesës së tretë të menseve
- B) Pas mungesës së dytë të menseve
- C) Pas mungesës së parë të menseve
- D) Përpara mungesës parë të menseve

Infermieri Pyetje: 769

Në 16 javë niveli i fundusit uterin është:

- A) 1/3 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) 1/2 e vijës që bashkon simfizën pubike me umbilikusin
- C) 2/3 e vijës që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- D) Një gisht nën umbilicus

Infermieri Pyetje: 770

Në 24 javë niveli i fundusit uteri është:

- A) 1/3 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) 1/2 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- C) 1 - 2 gisht mbi umbilicus
- D) 3 - 4 gisht nën procesin ksifoid

Infermieri Pyetje: 771

Zonja X është 14 javë shtatzanë. Mamia duhet të palpojë fundusin e uterusit në nivelin:

- A) Në nivelin e umbilikusit
- B) Nuk palpohet mbi simfizën pubike
- C) Pak mbi simfizën pubike
- D) Pak mbi umbilikus

Infermieri Pyetje: 772

Znj është në javën e 23 të shtatzanisë. Ajo është informuar se shenjë alarmi në shtatzani është:

- A) Palpitacioni kardiak
- B) Rritja e oreksit
- C) Ulja e lëvizjeve fetale
- D) Ulja e presionit të gjakut

Infermieri Pyetje: 773

Cila nga simptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problemi potencial, dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit shëndetësor?

- A) Gjakrrjedhje vaginale
- B) Lodhje
- C) Nausea
- D) Shtim i frekuencës urinare

Infermieri Pyetje: 774

Kultura për gonorrhea në shtatzani përfshihet si një nga testet rutinë e cila rekomandohet të bëhet në:

- A) Çdo fillim muaji gjatë shtatzanisë,
- B) Fillim të vizitës së parë prenatale
- C) Përfundim të muajit të fundit të shtatzanisë
- D) Vizitën e parë prenatale dhe përsëritet në 36 javë

Infermieri Pyetje: 775

Ç' ndryshim mund të shkaktojë pozicioni lithotomik, në presionin e gjakut tek gruaja shtatzanë?

- A) Asgjë e veçantë nuk vihet re
- B) E rrit presionin e gjakut
- C) E ulë presionin e gjakut
- D) Rrit dhe ul, varet nga linja bazë e presionit të gjakut

Infermieri Pyetje: 776

Në vizitat e radhës, në shtatzaninë e pakomplikuar zakonisht nuk përfshihet:

- A) Dëgjimi i RZF-ve
- B) Ekzaminimi vaginal
- C) Manovrat e Leopoldit
- D) Matjet e lartësisë së fundusit

Infermieri Pyetja: 777

Okupimi në punë i gruas gjatë shtatzanisë:

- A) Duhet të reduktohet në tremestrin e tretë
- B) Nuk ka probleme në barrën normale
- C) Rrit rrezikun e problemeve në barrë
- D) Ul riskun e problemeve në barrë

Infermieri Pyetja: 778

Mamia instruktin gruan të zbatojë ushtrimet e Kegelit, pasi ato:

- A) Forcojnë dyshemenë pelvike
- B) Ndhmojnë në zbritjen e fetusit
- C) Ndhmojnë në zbutjen e columit
- D) Përshpejtojnë aktin e lindjes

Infermieri Pyetja: 779

Pozicioni që ju i rekomandoni gruas shtatzanë për t'u çlodhur ose fjetur është:

- A) Anash
- B) Gjysëm ndenjor.
- C) Në shpinë
- D) Permbys

Infermieri Pyetja: 780

Dita e parë e zakoneve të fundit të gruas ka qënë 3 Maj 2011, duke përdorur rregullën e Negelit kësaj gruaje i takon të lindë:

- A) 10 shkurt 2012
- B) 10 mars 2012
- C) 31 qershor 2012
- D) 06 korrik 2012

Infermieri Pyetja: 781

Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë?

- A) Parotitit
- B) Poliometilitit
- C) Rabies
- D) Varicelës

Infermieri Pyetja: 782

Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë?

- A) Difteria
- B) hepatiti b
- C) Parotiti
- D) Rabies

Infermieri Pyetja: 783

Për të përcaktuar frekuencën e kontraksioneve uterine mamia do të vlersojë kohën nga:

- A) Fillimi i një kontraksioni deri në fund të kontraksioni tjetër
- B) Fundi i një kontraksioni deri në fund të kontraksionit tjetër
- C) Shpërthimi i kontraksionit deri në fund
- D) Shpërthimi i një kontraksioni deri në shpërthimin e kontraksionit tjetër

Infermieri Pyetja: 784

Në stadin e parë të lindjes shenja vendimtare që tregon për kontraksione uterine efektive është:

- A) Dilatacioni i cerviksit
- B) Ruptura e membranave amniotike
- C) Shfaqja e një sasive hemorragjie
- D) Zbritja e fetusit

Infermieri Pyetje: 785

Mamia i mëson gruas shtatzanë rreth karakteristikave të kontraksioneve të aktivitetit të vërtetë. Mamia vlerëson të arsyetuarit e gruas nëpërmjet instruksionit kur gruaja "do të përjetojë kontraksione të aktivitetit të vërtetë":

- A) Ato shkaktojnë diskomfort në pjesën e sipërme të uterusit
- B) Kontraksionet uterine do të bien kur unë do të ecë
- C) Vazhdojnë të jenë të çrregullta, por bëhen të forta.
- D) Vazhdojnë të jenë të forta edhe nëse unë relaxohem e bëj një dush

Infermieri Pyetje: 786

Infermierja është duke parë një grua që sapo ka bërë një test shtatzanie dhe rezultoni pozitiv. Pas ekzaminimit vaginal infermierja bën shënime në kartelë. Cila nga gjetjet e mëposhtme është sinjifikative për këtë moshë shtatzanie :

- A) Zbutje të cerviksit
- B) Një zhurmë e lehtë që korrespondon me pulsën e nënës gjatë dëgjimit të uterusit
- C) Prezencën e HCG në urinë
- D) Prezencën e lëvizjeve fetale

Infermieri Pyetje: 787

Cila nga pikat e mëposhme nuk bën pjesë në nënfazat e stadi të parë të aktivitetit të lindjes?

- A) Faza aktive
- B) Faza e expulsionit
- C) Faza e tranzicionit
- D) Faza latente

Infermieri Pyetje: 788

Cila fazë e aktivitetit të lindjes është më e gjatë?

- A) Dytë
- B) Katërt
- C) Parë
- D) Tretë

Infermieri Pyetje: 789

Faza e dytë e lindjes nis me:

- A) 1 - 2 orët e para pas daljes së placentës
- B) Dilatacionin komplet dhe përfundon me lindjen e infantit
- C) Fillimin e hapjes dhe zbutjes së cerviksit
- D) Lindjen e infantit dhe përfundon me lindjen e placentës

Infermieri Pyetje: 790

Faza e tretë e lindjes nis me :

- A) 1-2 orët e para pas lindjes
- B) Dilatacionin komplet
- C) Lindjen e infantit
- D) Me përfundimin e fazës aktive

Infermieri Pyetje: 791

Në njësinë e paralindjes mamia po ndjek një grua primigravida. Ajo do ta lejojë gruan të shterzojë kur dilatacionin i qafës së mitrës të jetë:

- A) 10cm
- B) 5 cm
- C) 7cm
- D) 8cm

Infermieri Pyetje: 792

Infermierja shoqëron ekspulsionin e placentës duke administruar oxytocinë për:

- A) Lehtësimin e dhimbjeve
- B) Lehtësuar qëndrimin dhe relaximin
- C) Prevenimin e infeksionit
- D) Parandalimin e e hemoragjise pas lindjes

Infermieri Pyetje: 793

Cilat nga pikat e mëposhtme nuk i tregojnë mamisë shkolitjen e placentës?

- A) Kontraksionet uterine
- B) Ndryshime të TA dhe pulsit
- C) Ndryshimi i formës së uterusit
- D) Shtim i një sasive hemorragjie

Infermieri Pyetje: 794

Një grua duhet të marrë në konsideratë këshillimin gjenetik nëse në kohën që do të mbetet shtatzanë është :

- A) 30 vjeç ose më shumë
- B) 35 vjeç ose më shumë
- C) midis 25 vjeç dhe 30 vjeç
- D) nën 35 vjeç

Infermieri Pyetje: 795

Gjatë palpimit për të përcaktuar fundusin uterin tek një grua që sapo ka lindur, ju vini re se fundusi i saj është i fortë dhe tre gishtëgjërësi mbi umbelikus dhe i devijuar. Ju duhet të:

- A) Kontrolloni për shtim të lohjeve
- B) Masazhoni uterusin e fortë
- C) Matni presionin arterial
- D) Palponi për vezikë urinare të distenduar

Infermieri Pyetje: 796

Pritshmëria e mamisë lidhur me involucionin normal uterin në periudhën post partumit do të ishte, zbritja e uterusit :

- A) 1 cm në ditë
- B) 1 cm në dy ditë
- C) 1 cm në tre ditë
- D) 1 cm në javë

Infermieri Pyetje: 797

Dhimbja e fortë e kokës në tremestrin e tretë të shtatzanisë, mund të jetë shenjë paralajmëruese për:

- A) Dehidratim
- B) Hypertension
- C) Lodhje
- D) Pamjaftueshmëri ushqimi

Infermieri Pyetje: 798

Eklampsia është:

- A) Hipertensioni i zhvilluar menjëherë pas lindjes
- B) Prania e hipertensionit para 20 javësh gravidancë
- C) Prania e hipertensionit pas 20 javësh gravidancë
- D) Preeklampsi plus konvulsione, koma ose të dyja

Infermieri Pyetje: 799

Znj. X ka eklampsi. Detyra e parë e mamisë është:

- A) Administrimi i O₂ me maskë
- B) Aspirimin e përmbajtjes së gojës për të parandaluar kalimin në rrugën e frymëmarrjes
- C) Të fusë ajër në rrugë orale
- D) Të qëndrojë me pacienten dhe të telefonojë për ndihmë

Infermieri Pyetje: 800

Znj. X shtrohet në spital për të stimuluar lindjen për arsye të HT të induktuar nga barra. Analizat laboratorike tregojnë vlerën e trombociteve 90.000, rritje të transaminazave, dhe ulje të hematokritit. Infermeria njofton mjekun se rezultatet laboratorike

- A) HELLP sindrom
- B) K.I.D.
- C) Preeklampsi
- D) Trombocitopeni idiopatik

Infermieri Pyetje: 801

Infermierja po merr anamnezën e znj. X gjatë vizitës së parë prenatale kur gruaja rezultoi 10 javë me barrë. Cila prej pikave të mëposhtme tregon që znj. X është në rrezik për zhvillimin e diabetit gestacional gjatë kësaj barre:

- A) Ajo është 28 vjeçe
- B) Fëmija i parë i saj ka lindur me seksio
- C) Në anamnezën familjare rezultoi diabet i tipit të I-rë
- D) Pësha e fëmijës së fundit në lindje ka qënë 4530gr.

Infermieri Pyetje: 802

Gjatë instruksionit në lidhje me nivelet e dëshiruara të glukozës kur flitet për diabet gestacional, infermierja shpjegon nivelet e glukozës si p.sh. para ushqimit të cilat janë:

- A) 60-90 mg/dl
- B) 90-120 mg/dl
- C) 110-150 mg/dl
- D) 150-180 mg/dl

Infermieri Pyetje: 803

Konsultimi për konceptimin është i rëndësishëm për përfundimin e shtatzanisë tek gruaja me diabet, sepse kontrolli jo i mirë i glicemisë para dhe në periudhën e hershme të barrës shoqërohet me:

- A) Anomali kongjenitale të fetusit
- B) Episode të shpeshta të hipoglicemisë amtare
- C) Hiperemesis gravidarum
- D) Polihidramion

Infermieri Pyetja: 804

Zonja D. është 13 javë shtatzanë. Ajo ankon për dhimbje në fund të barkut dhe hemorragji. Gjatë ekzaminimit vaginal, mjeku konstaton se gruaja ka shkurtim të qafës së mitrës dhe dilatacion të saj. Cili lloj aborti është ky?

- A) Abort i paevitueshëm ose progredient
- B) Abort inkomplet
- C) Mised abort
- D) Rrezik aborti

Infermieri Pyetja: 805

Gruaja është në javën e tetë të shtatzanisë. Gjatë ekzaminimit me ultrasaund mjeku nuk arrin të kapë RZF. Në këtë rast kemi të bëjmë me:

- A) Abort habitual
- B) Abort inkomplet
- C) Abort të paevitueshmëm
- D) Mised abort

Infermieri Pyetja: 806

Një grua 10 javë shtatzanë merr në telefon shërbimin prenatal dhe i referon se ajo ka hemoragji vaginale. Cila duhet të jetë përgjigjia fillestare e infermieres?

- A) Ndoshta ju keni abortuar. Sill me vete të gjitha garzat apo lineset dhe hajde në klinikë tani.
- B) Përshkruaj sasinë e hemoragjisë, karakteristikat dhe kohën e gjakrrjedhjes (sa kohë ka zgjatur hemoragjia)
- C) Të rrijë regjim shtrati dhe nëse hemoragjia vazhdon të lajmërojë menjëherë
- D) Të vijë në klinikë sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim që të vizitohet

Infermieri Pyetja: 807

Një grua gravide 8 javëshe paraqet rrezik aborti. Kush është trajtimi i duhur për këtë lloj aborti:

- A) Përgatitja e gruas për t'ju bërë dilatacioni e kyretazhi
- B) Vendosja e gruas rregjim shtrati për disa ditë dhe rivlerësimi i saj
- C) Përgatitja e gruas për ekzaminim ekografik për të parë integritetin e sakusit gestacional
- D) Qetësimi i gruas duke i treguar asaj që edhe n.q.se e humbet këtë fëmijë ajo mund të ngelet përsëri shtatzane pas një muaji.

Infermieri Pyetja: 808

Testet e përdorura për të zbuluar SGA (I vogël për moshën e shtatzanisë) janë :

- A) Palpimi abdominal
- B) Lartësia fundale
- C) Biometria ekografike
- D) Testet biofizike për të diagnostikuar SGA/IUGR

Infermieri Pyetja: 809

Kur vendoset forcepsi dilatacioni duhet të jetë:

- A) 6 - 7 cm
- B) 7 - 8 cm
- C) 10 cm
- D) Mbi 10 cm

Infermieri Pyetja: 810

Barra serotine është shtatzania që zgjat:

- A) 36 - 38 javë
- B) 38 - 40 javë
- C) 40 - 41 javë
- D) Mbi 42 javë

Infermieri Pyetje: 811

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 41 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

Infermieri Pyetje: 812

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 38 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

Infermieri Pyetje: 813

Nëse gruaja ka një lindje para javës së 36 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

Infermieri Pyetje: 814

Shënja që një grua shtatzane ka aktivitet të parakohshëm lindje mund të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë, konstante dhe lokalizohet në pjesën e sipërme të barkut, në fundusin uterin
- B) Kontraksionet uterine zgjasin të paktën 20 minuta
- C) Kontraktimet uterine të cilat ndodhin me një frekuencë prej katër kontraksionesh në 1 orë
- D) Shkurtimi qafës së mitrës deri në 80% edhe dilatacioni 2 cm.

Infermieri Pyetje: 815

Një grua shtatzanë, në javën e 32 të shtatzanisë është përcaktuar të jetë me rrisht për lindje pretermë. Një shenjë, që të ndodhë lindja pretermë do të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë dhe konstate
- B) Dilatacioni cervikal është më shumë se 1 cm
- C) Kontraksionet uterine i kemi me një frekuencë, 4 kontraksione në një orë
- D) Përgatitja e qafës mitrës (zbutja) dhe shkurtimi i saj 25%

Infermieri Pyetje: 816

Një grua e hospitalizuar për aktivitet të parakohshëm po merr MgSO₄ i/v. Rezultati i pritur për këtë trajtim do të jetë n.q.s.:

- A) Ataket eklamptike nuk do të ndodhin
- B) Kontraksionet uterine ndalohen
- C) Mushkритë e të porsalindurit fillojnë prodhojnë surfaktant
- D) Nuk ndodh plasja e parakohshme e membranave

Infermieri Pyetje: 817

Zonja X është 23 javë shtatzanë. Ajo ju telefonon dhe ju thotë se mendon që ka rrjedhje të ujrave nga vagina.ju do ti thoni asaj:

- A) Hajdeni menjëherë në klinikë
- B) Më telefono pas 2 h dhe më trego nëse ka ndryshime të rrjedhjeve
- C) Ne mund të presim deri në vizitën tjetër të radhës
- D) Për sa kohë që bebi lëviz ju mos u shqetësoni

Infermieri Pyetje: 818

Kur gruas i plasin membranat amniotike parakohe mamia duhet të vlersojë T° çdo:

- A) 1 orë
- B) 4 orë
- C) 6 orë
- D) 8 orë

Infermieri Pyetje: 819

Gruaja paraqitet në klinikë dhe ankton për dhimbje (kontraksione). Mami mendon që gruaja i ka filluar aktivitetin e lindjes, kur kontraksionet janë:

- A) 30 minuta dhe zgjasin 90 sekonda
- B) çdo 5 minuta dhe zgjasin 30 sekonda
- C) të çrregullta në intervale të ndryshme kohore
- D) të çrregullta, por të forta

Infermieri Pyetje: 820

Znj X është 36 javë shtatzanë. Ajo referon se ka dhimbje shpine, si dhe dhimbje me forcim të barkut. Infermiera në këtë rast vlerëson kontraksionet uterine për rreth:

- A) 5min
- B) 10 min
- C) 15 min
- D) 30 min

Infermieri Pyetje: 821

Kur infermiere-mamia bëjnë planifikimin e kujdesit për gruan të cilës i kanë plasur membranat amniotike parakohe, ajo arsyeton që gruaja është e riskuar për:

- A) Hemorragji
- B) Hipotension në pozicion shtrirë me shpinë
- C) Infeksion intrauterin
- D) Lindje precipitoze

Infermieri Pyetje: 822

Menjërherë pas lindjes, gjatë vlersimit që infermieria i bën gruas vë re që fundusi uterin është i squllur dhe ka gjakrrjedhje të madhe. Etiologjia më e mundshme e kësaj gjakrrjedhje është.

- A) Atonia e uterusit
- B) Hematoma vaginale
- C) Inversioni uterin
- D) Laceracioni vaginal

Infermieri Pyetje: 823

Hemoragjitë e vona të post partumit shkaktohen nga:

- A) Atonia uterine
- B) Mbetjet e fragmenteve placentare
- C) Multipariteti i madh
- D) Zgjatje e aktivitetit të lindjes

Infermieri Pyetje: 824

Pas lindjes, gjatë ekzaminimit të zonjës X ju konstatohet se brenda 15 min linesi i saj arrin të saturohet plotësisht. Veprimi i parë infermier që ju ndërmerrni është:

- A) Kontrolloni shënjat vitale
- B) Lajmëroni mjekun
- C) Palponi fundusin uterin
- D) Rrisni marrjen e likideve i/v

Infermieri Pyetje: 825

Simptomat e mëposhtme janë karakteristike për distakon e placentës së inseruar normalisht përveç:

- A) Dhimbja konstante (abdominale) uterine
- B) Hemorragjia vaginale me gjak të errët
- C) Uterusi i kontraktuar, i dhimbshëm, hipertonic
- D) Mungesë e hemorragjisë

Infermieri Pyetje: 826

Pas lindjes gruaja ka hemoragji të vazhdueshme në sasi të pakët, fundusi uterin i kontraktuar. Kjo vjen si pasojë e:

- A) Atonisë së uterusit
- B) Laçeracionit të columit
- C) Mbetjeve të fragmenteve placentare
- D) Mbetjeve të membranave amniotike

Infermieri Pyetje: 827

Hemoragjia e hershme e postpartumit (hemoragjia që ndodh brenda 24 orëve të para të pas lindjes) ka më pak gjasa të ndodhë si rezultat i :

- A) Atonin uterine
- B) Formacioneve të hematomave
- C) Laceracionet e labieve, perineumit, vaginës ose cerviksit
- D) Subinvolucionin e uterusit

Infermieri Pyetje: 828

Shkaqet më të shpeshta të subinvolucionit janë:

- A) Barra multiple dhe hemorragjia postpartum
- B) Hemorragjia postpartum dhe infeksioni
- C) Kontraksion persistent dhe mbidozim me oxytocinë
- D) Mbetje e fragmenteve placentare dhe infeksioni

Infermieri Pyetje: 829

Një grua shtatzanë për herë të parë lind dy binjakë në javën e 37 të shtatzanisë.

Përshkrimi korrekt i anamnezës obstetrikale të gruas do të jetë:

- A) Multigravida, multipara
- B) Multigravida, primipara
- C) Primigravida, multipara
- D) Primigravida, primipara

Infermieri Pyetje: 830

Amniotomia është:

- A) Marrja e likidit amniotik për vlerësim
- B) Plasja artificiale e membranave
- C) Plasja spontane e membranave
- D) Studimi citologjik i likidit amniotik

Infermieri Pyetje: 831

Në metodat diagnostikuese jo-invazive në obstetrikë NUK bën pjesë:

- A) Ekografia
- B) Stress test
- C) Amniocenteza
- D) Profili biofizik

Infermieri Pyetja: 832

Zonja X ka zgjedhur metodën kalendarike për të kontrolluar kontracepsionin. Gjatë procesit të vleresimit, më e rëndësishme për infermieren është:

A) Ekzaminimi i pigmentacionit të lëkurës dhe cilesise së flokëve për ndryshime hormonale

B) Marrja e anamnezës menstruale për 6- 12 muajt e fundit

C) Njohja e experiencës së mëparshme të gruas për të kontrolluar lindjen

D) Përcaktimi i shtimit dhe humbjes në peshë

Infermieri Pyetja: 833

Zonja X është duke përdoruar temperaturën bazale trupore si metodë kontrceptive. Ajo shkon për kontroll në klinikë dhe i tregon infermieres "periodat e mia janë paksuar dhe temperatura nuk është rritur" përgjigja më e përshtatshme e mamisë duhet të jetë:

A) Ju keni qënë e sëmurë këtë muaj

B) Ju ndoshta nuk patët ovulacion këtë muaj

C) Kjo ndoshta nënkupton që ju jeni shtatzanë

D) Mos u mërzitni ndoshta kjo nuk është asgjë

Infermieri Pyetja: 834

Sifilia shkaktohet nga :

A) Clamidia trakomatis

B) Herpesi simpleks

C) Neiseria gonorrhoea

D) Treponema pallidum

Infermieri Pyetja: 835

Substancat spermicide veprojnë me anë të:

A) Barrierave mekanike

B) Duke frenuar ovulacionin

C) Duke shtuar rritjen e epitelit vaginal.

D) Shkatërrimit të spermës

Infermieri Pyetja: 836

Cili tip i pilulave kontraceptive konsiderohet i përshtatshëm për gjashtë javët e para pas lindjes kur është në ushqyerje me gji?

- A) pilulat kontraceptive të kombinuara
- B) pilulat kontraceptive trifazike
- C) pilulat me dozë të lartë estrogeni
- D) pilula vetëm me progesterone

Infermieri Pyetja: 837

Çrregullimet e shikimit dhe ato cerebrale janë karakteristike për:

- A) Diabetin e shtatzanisë
- B) Aneminë e shtatzanisë
- C) Preeklampsinë e rëndë
- D) Asnjë nga këto

Infermieri Pyetja: 838

Kondomët duhet të përdoren gjatë shtatzanisë:

- A) Asnjëherë
- B) Nga gratë me rrezik për kandida
- C) Nga gratë me rrezik të lartë për SST
- D) Nga të gjitha gratë shtatzana

Infermieri Pyetja: 839

Një grua e re vjen në klinikë dhe ju shpjegon që një natë më parë gjatë marëdhënies seksuale kondomi u çka. Në konsultë me këtë kliente ju e këshilloni atë që kontracepsioni post koital (kontracepsioni i urgjencës) ul rrezikun e një shtatzanie dhe është shumë efektiv kur:

- A) Ajo merret në çdo kohë përpara ciklit
- B) Doza e parë merret sa më shpejt që të jetë e mundur
- C) Doza e parë mund të merret pas 72 orëve
- D) Mund të merret dhe pas tre ditësh

Infermieri Pyetja: 840

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron një metodë kontraceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja me e përshtatëshme e ma

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e barrave është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i SIP është më i madh për ju

Infermieri Pyetja: 841

Zoti dhe Zonja X po kalojnë momente të vështira për pamundësinë e tyre për të krijuar shtatzanësi. Ata duan të dinë se çfarë mund të bëjnë për të ruajtur ekuilibrin e tyre emocional. Përgjigja më e përshtatëshme nga ana e mamisë është :

- A) T'i tregojnë gjithë shokëve të tyre dhe familjeve
- B) Të bisedojnë me homologët e tyre infertil
- C) Të kërkojnë mbështetje nga grupet e specializuara për këtë problem
- D) Të fillojnë procedurat e menjëherëshme për adoptim

Infermieri Pyetja: 842

Një grua është duke përdorur diafragmën në mënyrë jo korrekte nëse ajo:

- A) Aplikon spermicid brenda kupës dhe rreth buzëve të diafragmës
- B) E lan atë me sapun të butë dhe ujë pas përdorimit dhe më pas e pudros atë me niseshte
- C) Lëviz atë brenda 2 orëve pas aktit të fundit të koitusit
- D) Vendos diafragmën 6 orë para marrëdhënies

Infermieri Pyetje: 843

Zonja X. sapo ka patur abort në tremestrin e I-rë dhe është dërguar në shtëpi duke i dhënë kontraceptivë oral për tu mbrojtur nga një barrë, ajo është këshilluar të :

- A) Të fillojë kontraceptivët oral që ditën e kryerjes së abortit
- B) Të mënjanojë kontaktin seksual deri sa të pushojë hemorragjia
- C) Të përdorë kondom dhe shkumë për javën e parë
- D) Të përdorë një metodë tjetër kontraceptive për një cikël të plotë

Infermieri Pyetje: 844

Procedura e sterilizimit në meshkuj është:

- A) Lidhja e tubave
- B) Spermicitet
- C) Spermitostatikë
- D) Vasektomia bilaterale

Infermieri Pyetje: 845

Metoda më frekvente për kontrollin e lindjeve e përdorur nga femrat 15-19 vjeçare është:

- A) Depo-Provera
- B) DIU-ja
- C) Kontraceptivët oral
- D) Norplanti

Infermieri Pyetja: 846

Zonja X është diagnostikuar dhe trajtuar për sindromin e shokut toksik. Ajo në ndonjë rast të marrdhënieve seksuale ka përdorur kontraktivë të marrë vetë në farmaci. Bazuar në anamnezën e saj, çfarë kontraktivësh, nuk duhet të përdorë ajo dhe partner

- A) Diafragmat
- B) Kondom vaginal.
- C) Kondomi
- D) Sfungjerët

Infermieri Pyetja: 847

IST që transmetohen më shpesh janë:

- A) C. Trachomatis
- B) N. Gonorrhea
- C) Sifilizi
- D) Vulvovaginal candidosis

Infermieri Pyetja: 848

Në efektet anësore të DIU (dispozitivi intrauterin) përfshihen:

- A) Depresioni
- B) Gjendja e ankthit
- C) Nauzeja dhe dhimbja e kokës
- D) Menstruacione më të rënda

Infermieri Pyetja: 849

Cilat nga pikat e mëposhtme sugjeron infermierin që gruaja mund të ketë vaginitis monialis?

- A) Ankesë për kuarje vulvare irrituese
- B) Dhimbje mesi të padurueshme
- C) Sekrecine të ujshme në ngjyrë të verdhë
- D) Temperaturë



Infermieri Pyetja: 198

Tek astma frymemarrja e pafrytshme lidhet me:

- A) bllokimin e rrugëve ajrore
- B) përmirësimin e sëmundjes
- C) përgjigjjen jo të mirë ndaj mjekimit
- D) sekrecionet e shumta

Infermieri Pyetja: 199

Astma përfaqëson një:

- A) Dëmtim funksional
- B) Obstruksion te rrugeve respiratore
- C) Sekrecione të shumta
- D) Mjekime jo specifike

Infermieri Pyetja: 200

Haemarthrosis është gjakrrjedhje ne:

- A) toraks
- B) SNQ
- C) artikulacione
- D) traktin gastro-intestinal

Infermieri Pyetja: 201

Parotiti është një sëmundje:

- A) e gjëndrave limfatike
- B) endemike sporadike
- C) enët e gjakut
- D) sistemin nervor





Infermieri Pyetja: 202

Shkaktari i fruthit është virusi :

- A) RNA
- B) i grupit te herpoviruseve
- C) i fruthit
- D) i gripit

Infermieri Pyetja: 203

Në bronkiolit pas hyrjes së virusit kemi këto pasoja:

- A) vështirësi në frymarrje
- B) infiltrim peribronkial
- C) bllokim të anës së prekur
- D) zmadhim te anës së prekur

Infermieri Pyetja: 204

Tipari karakteristik i fibrozës cistike është:

- A) disfunkcion i sipërfaqeve epiteliale
- B) mosfunktionimit të shkëmbimit të brëndshëm të gjëndrave
- C) disfunkcioni i bërthamës qelizore të gjëndrave.
- D) mos oksigjenimi i organizmit

Infermieri Pyetja: 205

Fibroza cistike vjen si pasoj e çrregullimit te fluksit hidroelektrolitik:

- A) midis gjëndrave
- B) midis sistemeve
- C) transepitelial
- D) i enëve të gjakut





Infermieri Pyetja: 206

Metodat për përcaktimin e testit për fibrozën cistike bëhen pas muajit :

- A) të parë të jetës
- B) të gjashtë të jetës
- C) të tretë të jetës
- D) të dymbëdhjete të jetës

Infermieri Pyetja: 207

Tek fibroza cistike dozat e enzimave do jepen në bazë të :

- A) defiçitit të enzimave
- B) sipas oreksit
- C) sipas harxhimeven në organizem
- D) humbjeve të gjakut

Infermieri Pyetja: 208

Rreziku për ndryshimin e funksionit kardio-vaskular lidhet me :

- A) pamjaftushmërin e punës së zemrës
- B) mungesën e mjekimit
- C) pamundësin për të kuptuar gjëndjen
- D) pamjaftushmerin e lendëve proteinike

Infermieri Pyetja: 209

Tek të sëmurët me probleme kardiake digogsina shkakton:

- A) reduktim të të rrahurave të zemrës
- B) rritje të të rrahurave të zemrës
- C) neutralizim të të rrahurave të zemrës
- D) ndalje të punës së zemrës



Infermieri Pyetje: 210

Anemia vjen si pasoje e :

- A) uljes së masës leukocitare
- B) prodhimit gabim të leukociteve
- C) uljes së masës eritrocitare
- D) rritjes së masës eritrocitare

Infermieri Pyetje: 211

Në dëmtimet kronike renale, ulja e filtrimit renal, fillon nga rritja e:

- A) pH
- B) produktit të katabolizimit të proteinave
- C) nivelit të serumit të fosfateve
- D) nivelit të yndyrave

Infermieri Pyetje: 212

Në stadin e dytë shiriti i gjedhit migron për në :

- A) mëlçi
- B) mushkri
- C) tru
- D) veshka

Infermieri Pyetje: 213

Pas sa kohësh kemi ulçeracion të plagës nga pickimi i merimangës së zezë?

- A) 3-4 dite
- B) 7-14 dite
- C) 15-20 dite
- D) 22-27 dite





Infermieri Pyetje: 214

Veprimi i zgjatur ultralent i insulinës e ka kulmin pas sa orësh të injektimit subkutan

- A) 2-4 orë
- B) 6-12 orë
- C) 14-24 orë
- D) 28-36 orë

Infermieri Pyetje: 215

Sa është sasia e lëndëve rehidruuese (Trisol) për ml/kg/peshë, që nevojiten në 24 orë në dehidrimin e lehtë nga diarrea?

- A) 30
- B) 50
- C) 70
- D) 100



Infermieri Pyetje: 216

Në dehidrimin e rëndë sasia për ml/kg/Peshë e likideve intravenoze që nevojiten në 24 orë janë:

- A) 70
- B) 100
- C) 150
- D) 250

Infermieri Pyetje: 217

Cila është koha që fëmija riinfekton veten me oksiuere?

- A) 6-10 orë
- B) 3-5 ditë
- C) 6-8 javë
- D) 10-15 javë





Infermieri Pyetje: 218

Cila dhimbje tregon se fëmija ka askaride?

- A) Abdominale
- B) Muskujsh
- C) Koke
- D) Këmbe

Infermieri Pyetje: 219

Shenjat klinike të Trichinosis janë:

- A) dhimbje koke
- B) anemi
- C) enjte të syve
- D) kollë



Infermieri Pyetje: 220

Karakteristikat e dhimbjes të pickimit nga merimanga janë:

- A) fillon brenda një dite pas pickimit
- B) përhapet nga vendi i pickimit në kokë
- C) imiton një apendisit akut
- D) shoqërohet me prurit

Infermieri Pyetje: 221

Gjatë helmimit bëjme futjen e sondës gastrike dhe aplikojmë tretësire kripore:

- A) 10-25 ml
- B) 30-40 ml
- C) 50-80 ml
- D) 100-120 ml



Infermieri Pyetje: 222

Shenjat klinike të helmimit nga hidrokarburet janë:

- A) ndryshime të vetëdijes
- B) oliguri
- C) dehidrim
- D) anemi

Infermieri Pyetje: 223

Pas sa kohësh ndodh periudha e fshehte tek helmimi nga acetaminofeni?

- A) 2-4 sekonda
- B) 8-16 minuta
- C) 24-36 ore
- D) 7-10 ditë

Infermieri Pyetje: 224

Pas të vjellave fëmija vëzhgohet për shenja të dehidrimit, të cilat janë:

- A) thellim të syve
- B) dhimbje barku
- C) dhimbje koke
- D) thellim të syve, dhimbje barku e koke

Infermieri Pyetje: 225

Cilat janë shenjat e idiosinkrazisë?

- A) Dilatim i pupilave
- B) Puls
- C) Dhimbje barku
- D) Nauze

Infermieri Pyetje: 226

Çfarë shenjash ka stomatiti Vincent?

- A) Gjakrrjedhje nga gingivat
- B) Të vjella
- C) Dhimbje të gjymtyrëve
- D) Diarre

Infermieri Pyetje: 227

Zhvillimi i alergjisë ndikohet nga :

- A) Lloji i kontaktit
- B) dhimbjet e barkut
- C) diare
- D) të vjellat

Infermieri Pyetje: 228

Si pasojë e mungesës së vitaminës D, kemi çrregullime si:

- A) dhimbje barku
- B) nauze
- C) diarre
- D) vonesë në mbylljen e fontanelës

Infermieri Pyetje: 229

Tetania lidhet me çrregullimin e :

- A) joneve të Natriumit
- B) joneve të Kalciumit
- C) joneve të Klorit
- D) joneve të Natriumit, Kalciumit dhe Klorit

Infermieri Pyetje: 230

Regjimi diabetik përqëndrohet në:

- A) bërjen e insulinës
- B) kontrolli i diures
- C) kontrolli i të vjellave
- D) kontrolli i lekures

Infermieri Pyetje: 231

Obeziteti është i shoqëruar me një varg pasojash mjekësore ku përfshihen:

- A) diabeti
- B) puls i ulur
- C) probleme të dhëmbëve
- D) dhimbje koke

Infermieri Pyetje: 232

Ku depozitohen askaridet në stadin e parë të tyre?

- A) Duoden
- B) Pankreas
- C) Stomak
- D) Veshka

Infermieri Pyetje: 233

Vlerësimi infermieror në diabet përqëndrohet në:

- A) gjendjen fiziologjike
- B) informimin për sëmundjen
- C) dhimbjet e barkut
- D) dhimbjet e kokës

Infermieri Pyetje: 234

Shenjat klinike në reaksionin imuno kompleks janë:

- A) urtikarje
- B) nauze
- C) të vjella
- D) diare

Infermieri Pyetje: 235

Kujdesi infermieror në ostiomelit, për sigurimin e komfortit përfshin:

- A) pozicioni i pershtatshëm
- B) dhimbjet e barkut
- C) diarre
- D) të vjella

Infermieri Pyetje: 236

Ndërlëkimet afatgjata të diabetit insulinovartës janë:

- A) retinopatia
- B) sëmundjet intestinale
- C) anoreksia
- D) të vjellat

Infermieri Pyetje: 237

Veshka sekretion hormone si:

- A) Renina
- B) Acidi uric
- C) Urea
- D) Kristale

Infermieri Pyetje: 238

Periudha e inkubacionit të difterisë është :

- A) 2-5 ditë
- B) 7-10 ditë
- C) 13-16 ditë
- D) 20-24 ditë

Infermieri Pyetje: 239

Para marrjes së diuretikëve matet rregullisht:

- A) urinimi
- B) defekimi
- C) të vjellat
- D) tensioni arterial

Infermieri Pyetje: 240

Periudha e fshehtë e poliomyelitit abortiv është:

- A) 3-6 ditë
- B) 7-10 ditë
- C) 13-15 ditë
- D) 16-18 ditë

Infermieri Pyetje: 241

Faza post renale vjen si pasojë e një obstrukcioni mekanik:

- A) të traktit urinar
- B) traktit gastrointestinal
- C) respirator
- D) venoz

Infermieri Pyetja: 242

Sindromi hemoragjik tek i porsalinduri, vjen si pasojë e mungesës se vitamines:

- A) A
- B) D
- C) K
- D) E

Infermieri Pyetja: 243

Cila nga këto shenja shihet në analizën e ikerit?

- A) Rritja e glukozës në gjak
- B) Rritja e azotemisë
- C) Rritja e glicemisë
- D) Rritja e bilirubinës

Infermieri Pyetja: 244

Cila është ndërhyrja e parë në fëmijën prematur?

- A) Ushqyerja
- B) Dhënia e oksigjenit
- C) Vënia e perfuzioneve I/V
- D) Rregullimi i temperaturës

Infermieri Pyetja: 245

Cila është shenja e infeksionit umbelikal?

- A) Nauze
- B) Temperaturë
- C) Humbje oreksi
- D) Zverdhje

Infermieri Pyetje: 246

Ku konsiston ndërhyrja për foshnjën lindur me ikter?

- A) Vendosja nën oksigjen
- B) Dhënia e antibiotikëve
- C) Bërja e transfuzioneve
- D) Futja në fototerapi

Infermieri Pyetje: 247

Cila është simptoma që tregon frakturë të klavikulës?

- A) Shtrembërim të cepit të buzës
- B) Dhimbje kur i prek krahun
- C) Hematomë të fytyrës
- D) Rënie të cepit të syrit

Infermieri Pyetje: 248

Cili organ luan rol në eliminimin e bilirubinës, gjatë jetës fetale?

- A) Placenta
- B) Mushkëria
- C) Zemra
- D) Pankreasi

Infermieri Pyetje: 249

Cila është ndërhyrja e parë, që bëhet në foshnjën me asfiksi?

- A) Ushqyerja
- B) Rregullimi i temperaturës
- C) Aspirimi
- D) marrja e analizave



Infermieri Pyetje: 250

Apnea është:

- A) frymëmarrje e shpejtë
- B) frymëmarrje e ngadaltë
- C) pushim në frymëmarrje
- D) frymëmarrje normale

Infermieri Pyetje: 251

Cila është simptoma e stenozes hipretrofike të pilorit?

- A) Cianoze
- B) Frymëmarrje e vështirësuar
- C) Apnoe
- D) Të vjella



Infermieri Pyetje: 252

Cila është masa e parë që marrim për parandalimin e përhapjes së infeksionit?

- A) Dhënia e oksigjenit
- B) Rregullimi i temperaturës
- C) Izolimi i foshnjës
- D) Bërja e ekzaminimeve

Infermieri Pyetje: 253

Hipoglicemia trajtohet me dhënie të:

- A) kaliumit
- B) antibiotikëve
- C) bikarbonat natriumit
- D) perfuzioneve me glukozë 5%





Infermieri Pyetja: 254

Periudha neonatale quhet periudha që përfshin:

- A) 20 ditët e para të jetës
- B) 28 ditët e para të jetës
- C) 30 ditët e para të jetës
- D) 40 ditët e para të jetës

Infermieri Pyetja: 255

Ushqyerja me sondë nazo-gastrike behet në fëmijët me:

- A) ikter
- B) frakturë të klavikulës
- C) buzë dhe qelzë të carë
- D) asfiksi



Infermieri Pyetja: 256

Cili lindje është shkaktare për një lindje asfiktike?

- A) Ne term
- B) Me sexio-cezarea
- C) Post - term
- D) Podalike

Infermieri Pyetja: 257

Me çfarë trajtohet nje infeksion umbilikal?

- A) Antibiotic
- B) Natri-bikarbonat
- C) Alkool 70 gradë
- D) Perfuzionel/V



Infermieri Pyetje: 258

Cili nga këta faktorë nuk ndikon në shfaqjen e diabetit?

- A) Moshë e fëmijës
- B) Kequshqyerja ose humbja në peshë
- C) Higjiena e pastër
- D) Mosruajtja e mirë e ushqimeve

Infermieri Pyetje: 259

Në cilën nga shkallët e dehidrimit është shprehur saktë rënia e peshës trupore?

- A) Dehidrim i lehtë = 10 %
- B) Dehidrim mesatar mbi 10%
- C) Dehidrim i rëndë = 10%
- D) Dehidrim i rëndë > 10%

Infermieri Pyetje: 260

Cili nga faktorët nuk është shkaktar i obezitetit?

- A) Metabolik
- B) Trashëgues
- C) Nënushqyerja
- D) Psikologjik

Infermieri Pyetje: 261

Cila nga kujdesjet nuk bën pjesë në trajtimet e anoreksisë?

- A) Kujdesi ndaj malnutricionit
- B) Fillimi i një diete të pasur dhe me lëngje
- C) Mbështetja psikologjike
- D) Përdorimi i laksativëve



Infermieri Pyetje: 262

Cili nuk hyn në shkaktarët e stomatitit?

- A) Sëmundjet sistemike
- B) Traumat
- C) Dalja e dhëmbëve
- D) Higjena e pastër

Infermieri Pyetje: 263

Kandidoza orale është:

- A) Infeksion kërpudhor
- B) Inflamacion i mukozave orale
- C) Ulcer e membranave të mukozave të gojës
- D) Sëmundje sistemike



Infermieri Pyetje: 264

Cili është ekzaminimi që përcakton llojin e parazitit në fece?

- A) Gjak komplet
- B) Urokulturë
- C) Koprokulturë
- D) Sputum

Infermieri Pyetje: 265

Në cilin helmim nuk këshillohet nxitja e të vjellave?

- A) Medikamentet
- B) Ushqyerja
- C) Salicilatet
- D) Lëndët gërryese





Infermieri Pyetje: 266

Cili nga këto nuk është shkaktar i shfaqjes së alergjive?

- A) Ushqimi
- B) Medikamentet
- C) Mungesa e hekurit
- D) Pluhurat

Infermieri Pyetje: 267

Në mjekimin e shokut anafilaktik nuk ndikon:

- A) Adrenalina
- B) Ultrakorteni
- C) Aspirina
- D) Antihistaminikët



Infermieri Pyetje: 268

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk vërehet në sëmundjen e serumit?

- A) Edema
- B) Eritema
- C) Hipotirozë
- D) Edeme laringu

Infermieri Pyetje: 269

Cila është zona ku nuk shfaqet dermatiti seborroik?

- A) Skalpi
- B) Balli
- C) Zona inguinale
- D) Shputat e këmbëve



Infermieri Pyetje: 270

Cili nga këta shkaktarë nuk është përgjegjës për mungesën e vitaminës D?

- A) Niveli i ulët social-ekonomik
- B) Keqpërthithja e lëndëve ushqimore
- C) Ekspozimi në diell
- D) Banimi në zona të ndotura

Infermieri Pyetje: 271

Cila nga këto vitamina mund të sintetizohet nga organizmi ?

- A) Vitamina A
- B) Vitamina B
- C) Vitamina C
- D) Vitamina D

Infermieri Pyetje: 272

Deformimet kockore të avitaminozës D prekin të gjitha të poshtëshënuara përveç:

- A) Toraksin
- B) Kockat e fytyrës
- C) Anësitë
- D) Kockat e kokës

Infermieri Pyetje: 273

Cila nuk është e saktë, në shenjat e fëmijëve me hipotiroide, në lindje?

- A) Ikteri fiziologjik
- B) Dalje e shpejtë jashtë
- C) Probleme respiratore
- D) Vështirësi në ushyerje



Infermieri Pyetje: 274

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në sëmundjen e osteomielitit?

- A) Temperturë e lartë
- B) Zona e prekur e skuqur dhe e nxehtë
- C) Epistaksis
- D) Gjymtyrë e dhimbshme

Infermieri Pyetje: 275

Cili regjion nuk preket nga osteomieliti?

- A) Tibian
- B) Shputat e këmbëve
- C) Humerusi
- D) Shputat e duarve



Infermieri Pyetje: 276

Cili nga parametrat ndryshon shumë në osteomielit?

- A) Eritrocitet
- B) Leukocitet
- C) Hemoglobina
- D) Hematokriti

Infermieri Pyetje: 277

Cilin nga indet apo organet prek artriti?

- A) Veshkën
- B) Mushkëritë
- C) Kycet
- D) Pankreasin



Infermieri Pyetje: 278

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në artrit?

- A) Inflamacion lokal
- B) Lëvizjes spontane të kyceve
- C) Humbje të vetëdijes
- D) Temperaturë

Infermieri Pyetje: 279

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme është i zgjedhuri në defektet e lindura të zemrës?

- A) Skaner
- B) Radiografi
- C) Rezonancë
- D) Ekografi

Infermieri Pyetje: 280

Cili nga të mëposhtmet nuk e shkakton artritin?

- A) E. Coli
- B) Haemophilus influenzae
- C) Salmonela
- D) Stafilokok

Infermieri Pyetje: 281

Cili pohim nuk është i saktë në ndërhyrjet post - operatore të tonsilitit?

- A) Monitorimi
- B) Pozicionohet shtrirë dhe drejtë
- C) Vlerësohet për shenjat e hemoragjisë
- D) Fillohen perfuzione I/V



Infermieri Pyetje: 282

Skarlatina shkaktohet nga:

- A) Bordetella pertusis
- B) Corynae bacterium diphtheriae
- C) Streptokoku B hemolitik i grupit A
- D) Bakteriet

Infermieri Pyetje: 283

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është e saktë, në rihnit?

- A) Teshtitje
- B) Obstruksion i rrugëve të frymëmarrjes
- C) Temperaturë
- D) Sekrecione



Infermieri Pyetje: 284

Cila nga këto sëmundje nuk bën pjesë në LTB(laringo-trakeo -bronkitit)?

- A) Laringotrakeiti
- B) Epiglottis
- C) Bronkioliti
- D) Trakeiti bakterial

Infermieri Pyetje: 285

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në laringo-trakeo -bronkitit?

- A) Temperaturë
- B) Dhimbje fyti
- C) Melena
- D) Vështirësi në frymëmarrje





Infermieri Pyetje: 286

Cila nuk bën pjesë në ndërhyrjet e laringo-trakeo-bronkitit?

- A) Ruajtja e pastër e rrugëve ajrore
- B) Dhënia e oksigjeno-terapisë
- C) Plotësimi i nevojave me lëngje
- D) Dhënia e vitaminës D

Infermieri Pyetje: 287

Cila nuk bën pjesë në kujdesin për pulmonet?

- A) Dhënia e Heparinës
- B) Aerozoloterapia
- C) Aspirimi i sekrecioneve
- D) Oksigjenoterapia



Infermieri Pyetje: 288

Cili nga medikamentet e mëposhtme nuk jepet në astmën bronkiale?

- A) Bronkodilatatorët
- B) Kortikosteroidet
- C) Levotiroksina
- D) Antiacidet





Infermieri Pyetje: 289

Cili nga aparatet e mëposhtme preket më shumë nga fibroza cistike?

- A) Genito-urinar
- B) I frymëmarrjes
- C) Kardio-vaskular
- D) Pankreasi

Infermieri Pyetje: 290

Në cilën nga të dhënat e mëposhme nuk bazohet diagnoza e fibrozës cistike?

- A) Në historinë e sëmundjes familjare
- B) Në mungesën e enzimave pankreatike
- C) Në dhimbjen abdominale
- D) Në rritjen e koncentrimin elektrolitik të djersës

Infermieri Pyetje: 291

Cili nga kriteret e mëposhtme, nuk është manifestim klinik madhor i etes?

- A) Karditis
- B) Poliartriti
- C) Artralgjia
- D) Eritema

Infermieri Pyetje: 292

Shkaktojnë endokardit bakterial të gjitha, me përjashtim të:

- A) Streptokoku
- B) Enterokoku
- C) Gonokoku
- D) Rikecia





Infermieri Pyetja: 293

Kemi anemi kur hemoglobina është:

- A) nën 12g/dl (6 - 12 vjec)
- B) 12g/dl (6 muaj - 6 vjec)
- C) 13g/dl (6muaj - 6 vjec)
- D) nën 11g/dl (6muaj - 12 vjec)

Infermieri Pyetja: 294

Cili nuk bën pjesë në efektet klinike të talasemisë major?

- A) Difektet në sintezën e hemoglobinës A
- B) Dobësim i strukturës së qelizave të kuqe të gjakut
- C) Rritje e numrit të leukociteve
- D) Jetëgjatësia e shkurtër e eritrocitit

Infermieri Pyetja: 295

Cilët nga elementët e analizës së gjakut, rriten në leucemi?

- A) Eritrocitet
- B) Hemoglobina
- C) Leukocitet
- D) Sedimenti

Infermieri Pyetja: 296

Cila nga nderhyrjet, nuk bën pjesë në ndërhyjet per IRA?

- A) Monitorimi i shenjave vitale
- B) Llogaritja me saktësi e marrjen dhe nxjerrjen e lëngjeve
- C) Administrimi i medikamentave
- D) Kryerja e ushtimeve fizike



Infermieri Pyetja: 297

Cilat nga indet e mëposhtme prek encefaliti?

- A) Brinjët e përparme të palsës së kurrizit
- B) Prek indin granular dhe sistemin nervor
- C) Prek parenkimën e trurit
- D) Prek aparatën e frymëmarrjes

Infermieri Pyetja: 298

Cili nga këto manifestime klinike tregon për sëmundjen e hemofilisë?

- A) Rënia në peshe
- B) Vështirësi në frymëmarrje
- C) Melena
- D) Të vjella

Infermieri Pyetja: 299

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në klinikën e bronkiolitit?

- A) Temperaturë 38- 39
- B) Dhimbje koke
- C) Vështirësi në frymëmarrje
- D) Konvulsione

Infermieri Pyetja: 300

Nuk është shkaktar i bronkopneumonisë bakteriale ?

- A) Bakteriet
- B) Streptokoku
- C) Pneumokoku
- D) Fruthi

Infermieri Pyetja: 301

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk është e pranishme në meningit?

- A) Temperatura
- B) Cefaleja
- C) Rigiditeti nuchal
- D) çrregullim i ritmit të zemrës

Infermieri Pyetja: 302

Cila nuk bën pjesë në trajtimin e fëmijës me anemi?

- A) Aerosolo-terapia
- B) Dhënia e vit B12
- C) Dhënia Fe
- D) Dhënia e një diete të pasur me Fe

Infermieri Pyetja: 303

Nuk bën pjesë në ndërhyrjen e pacientëve me IRA (insuficiencë renale akute)?

- A) Kufizimi i kriprave
- B) Dhënia e antibiotiko-terapisë
- C) Bërja e dializës
- D) Oksigjenoterapia

Infermieri Pyetja: 304

Cila shenje nuk bën pjesë në manifestimet klinike të trombocitopenisë?

- A) Hematemezis
- B) Melena
- C) Hemoragji e gingivave
- D) Temperaturë



Infermieri Pyetja: 305

Meningiti është:

- A) Inflamacion i meningeve
- B) Inflamacion i zorreve
- C) Inflamacion i perikardit
- D) Sëmundje e trashëguar

Infermieri Pyetja: 306

Inkubacioni tek rubeola zgjat:

- A) 10-20 ditë
- B) 17-30 ditë
- C) 6- 7 ditë
- D) 14-21 ditë



Infermieri Pyetja: 307

Nuk është rruga e saktë e transmetimit të heptatitit B?

- A) Rruga aerogene
- B) Nga nëna shtatzanë te fetusit
- C) Rruga hematogene
- D) Me anë të pështymës

Infermieri Pyetja: 308

Cila është rruga e transmetimit të fruthit?

- A) Nëpërmjet frymëmarrjes, spërklave
- B) Rrugës hematogene
- C) Perfuzioneve I/V
- D) Kontaktit të lëkurës



Infermieri Pyetja: 309

Eneurezis nokturna është urinim:

- A) normal
- B) me ndërprerje
- C) i shpeshtë
- D) i pavullnetshëm natën

Infermieri Pyetja: 310

Përgjegjësia kryesore e veshkave është të mbaje konstant:

- A) volumin e lëngjeve
- B) frymëshkëmbimin
- C) ritmin e zemrës
- D) qarkullimin e gjakut

Infermieri Pyetja: 311

Cila nga përgjigjet nuk është e saktë për fëmijët me sindrom Down?

- A) Kanë qëndrim hypotonik
- B) Pëllëmba e dorës me rrudha
- C) Fytyra me pamje normale
- D) Gishti i madh i dorës i vecuar

Infermieri Pyetja: 312

Forma më e rëndë e krizave epileptike quhet:

- A) Humbje e vetëdijes
- B) Marrje mendsh
- C) Status epileptik
- D) Gjendje sinkopale



Infermieri Pyetje: 313

Në analizën e gjakut të fëmijëve me leuçemi kemi rritje:

- A) Të eritrociteve
- B) Hemoglobinës
- C) Hematokritit
- D) Leukociteve

Infermieri Pyetje: 314

Në purpurën trombocitopenike, ulja e trombociteve është nën:

- A) 150.000/mm³
- B) 140.000/mm³
- C) 130.000/mm³
- D) 120.000/mm³



Infermieri Pyetje: 315

Sa shkurtohet jeta e eritrocitit tek trombocitopenia?

- A) 2-4 dite
- B) 3-5 dite
- C) 6-8 dite
- D) 7-10 dite

Infermieri Pyetje: 316

Cili nga aparatet preket në 90% të rasteve nga fibroza cistike?

- A) Genito-urinar
- B) Kardiak
- C) Respirator
- D) SNQ





Infermieri Pyetje: 317

Cila nuk bën pjesë në shenjat e astmës bronkiale?

- A) Kolla e thatë
- B) Vështirësi në frymëmarrje
- C) Fishkëllima në ekspirim
- D) Urinim i pavullnetshëm

Infermieri Pyetje: 318

Dhënia e karbohidrateve ndihmon në:

- A) Kursimin e proteinave të organizmit
- B) Pakësimin e rezervave të glikogjenit
- C) Prodhimin e proteinave dhe glikogjenit
- D) Eliminimin e proteinave dhe glikogjenit

Infermieri Pyetje: 319

Fëmijët me kequshqyerje rrezikohen nga plaget e:

- A) dekubituseve
- B) kavitetit oral
- C) narinës
- D) lobit të veshit

Infermieri Pyetje: 320

Gjatë vitit të parë të jetës, fëmija duhet të marrë vitaminë D:

- A) 400 UI në ditë
- B) 1000 UI në ditë
- C) 2000 UI në ditë
- D) 2500 UI në ditë





Infermieri Pyetje: 321

Tetania është:

- A) Një gjendje e shtuar ekstabiliteti neuromuskular
- B) Një gjendje e pakësuar ekstabiliteti neuromuskular
- C) Një mungesë totale ekstabiliteti neuromuskular
- D) Një gjendje e shtimit dhe pakësimit në të njëjtën kohë

Infermieri Pyetje: 322

Ç'është Ketoacidoza diabetike?

- A) Shtim i theksuar i insulinës
- B) Mungesë e theksuar e insulinës
- C) Pakësim i kalciumit
- D) Pakësim i elektroliteve

Infermieri Pyetje: 323

Shkallët e dehidrimit janë:

- A) I lehtë 5%; mesatar 10%; i rëndë mbi 10%
- B) I lehtë 10%; mesatar 15%; i rëndë 20%
- C) I lehtë 15%; mesatar 20%; i rëndë 25%
- D) I lehtë 20%; mesatar 25%; i rëndë 30%

Infermieri Pyetje: 324

Nuk është shenjë klinike në vendosjen e trupave të huaj në bronke:

- A) Hemoragji nga hunda
- B) Kolla
- C) Kriza dispneje
- D) Wheezing



Infermieri Pyetje: 325

Trupat e huaj në trake manifestohen me:

- A) Vështirësi në frymëmarrje
- B) Mungesë kolle
- C) Skuqje të fytyrës
- D) Frymëmarrje normale

Infermieri Pyetje: 326

Nëse bronkoskopia rigide dështon:

- A) Është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal
- B) Nuk është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal
- C) Përdoren mënyra të tjera
- D) Nuk ekzistojnë mënyra të tjera

Infermieri Pyetje: 327

Virusi respirator sincicial tek bronkioliti është:

- A) Shkaku i vetëm
- B) Shkaku kryesor në mbi 50% të rasteve
- C) Nuk është shkak kryesor
- D) Nuk ekziston fare si mundësi

Infermieri Pyetje: 328

Matja e gazeve në gjak është e rëndësishme:

- A) Për të testuar influencën e tyre
- B) Për mbulimin e agjentit etiologjik
- C) Për të gjykuar gravitetin e sëmundjes
- D) Për kodifikimin e tyre

Infermieri Pyetje: 329

Bronkopneumonia takohet në:

- A) të gjitha moshat
- B) moshën e tretë
- C) adoleshencë
- D) parashkollorë

Infermieri Pyetje: 330

Disavantazhi i aeorozolit është:

- A) Medikamentet nuk absorbohen me shpejtësi
- B) Fëmija mund të kërkojë administrimin e tij shumë shpesh
- C) Medikamentet veprojnë me shpejtësi
- D) Minimizon efektet e përgjithshme

Infermieri Pyetje: 331

Ç'është hidroklortiaziti dhe përse përdoret?

- A) Diuretik dhe përdoret për të rritur diurezen
- B) Vitaminë dhe përdoret për rritje rezistence
- C) Antidepresiv dhe përdoret për gjendjet depresive
- D) Atropine dhe përdoret për relaksim e muskulaturës së pilorit

Infermieri Pyetje: 332

Procesi i kujdesjeve në pediatri përfshin:

- A) Moskryerjen e ekzaminimeve fizike
- B) Vendosjen e diagnozës
- C) Mjekimin e menjëhershëm
- D) Zbatimin e planeve të kujdesjeve

Infermieri Pyetja: 333

Vlerësimi për veten i përket gjykimit:

- A) personal
- B) përgjithësues
- C) asnjëherë
- D) pa subjekt

Infermieri Pyetja: 334

Për të parandaluar pasojat e ftohjes prematuri:

- A) vendoset në inkubator
- B) vendoset në një dhomë shtëpi që të jetë
- C) i vishen rroba të trasha
- D) Temperatura e dhomës të jetë sa më e lartë

Infermieri Pyetja: 335

Shpenzimi minimal i Oksigjenit ndodh kur temperatura sipërfaqësore e lëkurës është:

- A) 36.5 gradë celsius
- B) 36.8 gradë celsius
- C) 37 gradë celsius
- D) 37.2 gradë celsius

Infermieri Pyetja: 336

Te kujdesjet për lëkurën e fëmijës këshillohet:

- A) Përdorimi i sapunëve
- B) Përdorimi i locioneve alkaline
- C) Çdo lloj solucioni larës
- D) Jo çdo lloj solucioni



Infermieri Pyetja: 337

Nevojat themelore të fëmijës jane:

- A) Te jetës së përditshme
- B) Ushqimi dhe uji
- C) Mbajtja afër
- D) Ajër i pastër

Infermieri Pyetja: 338

Për të parandaluar fleksionin e qafës së fëmijës:

- A) Vendoset një jastëk nën shpatull
- B) Vendoset një jastëk nën kokë
- C) Vendoset një jastëk nën zonën e belit
- D) Nuk vendoset jastëk fare



Infermieri Pyetja: 339

Nëse ndërpritet ushqyerja me gji:

- A) Ulet niveli serik i bilirubinës
- B) Ngrihet niveli serik i bilirubinës
- C) Niveli serik i bilirubinës s'lëviz
- D) Niveli serik i bilirubinës ngrihet dhe ulet

Infermieri Pyetja: 340

Me rritjen e moshës së shtatzanisë:

- A) Frekuenca respiratore ulet
- B) Frekuenca respiratore ngrihet
- C) Frekuenca respiratore s'pëson ndryshim
- D) Ndryshimet respiratore janë të pakonsiderushme





Infermieri Pyetje: 341

Mekanizmat e thithjes dhe të tretjes:

- A) Përcaktohen pas lindjes
- B) Përcaktohen para lindjes
- C) Përcaktohen shumë më vonë
- D) Nuk përcaktohen absolutisht

Infermieri Pyetje: 342

Disa nga faktorët që shkaktojnë asfiksionë janë:

- A) Moshë e nënës, e shtatzënisë
- B) Lindjet në kohë, barrë e rregullt
- C) Mospërdorimi i medikamenteve
- D) Problemet psikologjike



Infermieri Pyetje: 343

Janë shenja të infeksionit tek i porsalinduri përveç:

- A) Lëkurë e zbehtë në ngjyrë gri
- B) Pin mirë gjirin
- C) Çrregullime të frekuencës respiratore dhe kardiake
- D) Ulje të temperaturës

Infermieri Pyetje: 344

Traumat e indeve të buta shkaktohen:

- A) Kur ka disproporcion cefalopelvik
- B) kur nuk ka disproporcion pelvik
- C) Kur ka proporcion cefalopelvik
- D) Si pasojë e dëmtimeve të ndryshme





Infermieri Pyetja: 345

Në hemoragjitë umbilikale injektohet vitamine:

- A) D për parandalim
- B) A për parandalim
- C) K për parandalim
- D) C për parandalim

Infermieri Pyetja: 346

Edemat serosanguine:

- A) Nuk janë leziona cefalike
- B) Janë leziona cefalike
- C) Janë leziona cefalo-pelvike
- D) Nuk janë leziona të asnjë lloji

Infermieri Pyetja: 347

Stenoza e pilorit është:

- A) Bllokim hipertrofik i muskulit rrethues të kanalit të pilorit
- B) Zgjerim i muskulit rrethues të kanalit të pilorit
- C) Bllokimi dhe zgjerimi në të njëjtën kohe i muskulit rrethues
- D) Çrregullim Hidro-elektrolitik

Infermieri Pyetja: 348

Obeziteti shoqërohet me:

- A) Pasoja mjekësore, psikologjike
- B) Vetëm pasoja mjekësore
- C) Vetëm pasoja psikologjike
- D) Luhatje sipërfaqësore





Infermieri Pyetje: 349

Medikamentet që shkaktojnë humbjen në peshë tek anoreksikët janë:

- A) Laksativët, diuretikët
- B) Imipramina, deprimina
- C) Antepar, povan
- D) Aspirina, Fe sulfat

Infermieri Pyetje: 350

Në rastet e një reaksioni të rëndë nga pickimi i grerëzës apo bletës:

- A) Bëhet lavazh stomaku
- B) Injektohet vit.K
- C) Bëhet adrenalinë e ultrakorten
- D) Injektohet vit A+D



Infermieri Pyetje: 351

Alergjia është:

- A) Hipersensibilitet ndaj një substance
- B) Hiposensibilitet ndaj një substance
- C) Përqasje e virozave të stinës
- D) Komplikacion nga substancat toksike

Infermieri Pyetje: 352

Eritroblastozë fetale quhet ndryshe sëmundje:

- A) hemolitike e të porsalindurit
- B) ikterike e të porsalindurit
- C) bakteriale e të porsalindurit
- D) e sistemit respirator e të porsalindurit





Infermieri Pyetja: 353

Me çfarë trajtohet hipokalcemia?

- A) Kalcium
- B) Glukozë
- C) Serum
- D) Oksigjen

Infermieri Pyetja: 354

Me çfarë trajtohet hipoglicemia?

- A) Trisol
- B) Kalcium
- C) Perfuzion solucion glukoze
- D) Vitamine A

Infermieri Pyetja: 355

Mamia di që faza e parë e lindjes është :

- A) Dalja e placentës
- B) Dilatacioni
- C) ExpulSIONI
- D) Rikuperimi i gruas

Infermieri Pyetja: 356

Shenjat klinike më të zakonshme në pacientet me enfizemë pulmonare janë:

- A) Prania e sputumit
- B) Ortopnea
- C) Lodhja
- D) Dispnea



Infermieri Pyetja: 357

Infermieri/a e vlerëson pacientin me bronkit kronik për:

- A) Fryrje abdominale
- B) Kequshqyerje
- C) Cianoza
- D) Dispnea

Infermieri Pyetja: 358

Gjatë një ataku azmatik infermieri e vlerëson pacientin për :

- A) Kollë produktive
- B) Obstruksion respirator
- C) Ortopne
- D) Ankthin

Infermieri Pyetja: 359

Shenjat e kufizimit respirator ,në momente qetësie zakonisht zhduken në :

- A) Insufiçensë repiratore
- B) Asthma bronkiale
- C) Bronkitin kronik
- D) Emphizemë

Infermieri Pyetja: 360

Diagnozat e mundshme infermirore në asthmën bronkiale janë:

- A) Reduktimi I rrezikut për infeksion
- B) Përmirsimi I shkëmbimit të gazeve
- C) Intolerance e aktiviteteve
- D) Reduktimi I ankthit



Infermieri Pyetje: 361

Gjeni përgjigjen e saktë

- A) Leukocitet në urinë nuk tregojnë praninë e infeksionit
- B) Prania e eritrociteve në urinë është gjithnjë tregues i prekjes renale
- C) Proteinuria është karakteristike e uretriteve
- D) Mund të ndodhë bakteriuriasimptomatike

Infermieri Pyetje: 362

Sistemet e shpërndarjes së oksigjenit me ritëm të lartë janë:

- A) Maska pa rithithje të ajrit
- B) Maska me rithithje të ajrit
- C) Maska venturë
- D) Kanjula nazale

Infermieri Pyetje: 363

Në hipertirozë janë të gjitha shenjet me përjashtim të:

- A) Takikardisë
- B) Shkurtim të reflekseve
- C) Shtim në peshë
- D) Çrregullim të ciklit menstrual

Infermieri Pyetje: 364

Toksiciteti i mushkërive me O₂ jep dëmtime të tyre të tilla si:

- A) Dhembje substernale
- B) Koll productive
- C) Ortopne
- D) Temperaturë





Infermieri Pyetja: 365

Kërkesat për oksigjen zakonisht rriten në gjendje të tilla si:

- A) Edemë polmonare
- B) Hemoragji polmonare
- C) Membrana hyaline
- D) Gjendjet septike

Infermieri Pyetja: 366

Agjentët mukolitike në pacientët me probleme respiratore përdoren në kolla:

- A) me sekrecione trasha
- B) jopruduktive
- C) pa sekrecione
- D) produktive



Infermieri Pyetja: 367

Në hipotireozë kemi situatën e mëposhtme hormonale:

- A) Rritje të T3, T4 dhe rritje të TSH
- B) Rritje të T3, T4 dhe ulje të TSH
- C) Ulje të T3, T4 dhe rritje të TSH
- D) Ulje të T3, rritje të T4 dhe ulje të TSH

Infermieri Pyetja: 368

Përdorimi i anksiolitikëve është më produktiv gjatë gjendjeve të tilla si:

- A) Emboli pulmonare
- B) Emphyzemë pulmonare
- C) Atelektazë pulmonare
- D) Atak azmatik





Infermieri Pyetja: 369

Edukimi shëndetësor i pacientit me probleme respiratore bëhet nëpërmjet:

- A) Përmiresimit të marrjeve ushqimore
- B) Përmiresimit te natyrës se frymemarrjes
- C) Përmiresimit të ankthit
- D) Terapisë relaksuese

Infermieri Pyetja: 370

Rritje të rasteve me TBC ka pasur vitet e fundit në pacientët me :

- A) hepatit B kronik
- B) hepatit C
- C) HIV
- D) IST



Infermieri Pyetja: 371

Artriti rheumatoid nuk ka karakteristikë:

- A) Prekjen e artikulacioneve të vogla
- B) Eritemën marginale
- C) Fenomenin Raynaud
- D) Karakterin simetrik të prekjes artikulare

Infermieri Pyetja: 372

Vlersimi infermieror i një pacienti me TBC bëhet nëpërmjet:

- A) Gjendje e përgjithshme septike me temperature
- B) Prezantimit të simptomave
- C) Të dhënave objektive
- D) Të dhënave subjektive





Infermieri Pyetja: 373

Zakonisht pacientët të cilët kanë sëmundjen e TBC:

- A) Kanë temperature
- B) Nuk kanë fare temperaturë
- C) Kanë temperature subfebrile
- D) Temperatura nuk është kriter vlerësimi

Infermieri Pyetja: 374

Në rastin e aplikimit të testit të tuberkulinës, zona e skuqjes së lëkurës është reaksion pozitiv:

- A) me diameter 5 mm
- B) me l madh se 10mm
- C) me l vogel se 10mm
- D) me diameter 10mm



Infermieri Pyetja: 375

Vaksina e BCG jep mbrojtje efektive për pacientët për:

- A) Zakonisht per 5 vjet
- B) Zakonisht per 10 vjet
- C) Zakonisht per 15 vjet
- D) Për 20 vjet

Infermieri Pyetja: 376

Shkaktari më i shpeshtë i embolisë pulmonare është:

- A) Cdo substancë që depërton në qarkullim
- B) Nje copë garze ose pambuk
- C) Nje copë age metalike
- D) Nje koagul gjaku



Infermieri Pyetja: 377

Angina pectoris është gjendje në të cilën kemi:

- A) Imbalancë e përhershme e muskulit kardiak nga oksigjeni
- B) Imbalancë e përkohshme nga oksigjeni
- C) Deprivim i përgjithshëm nga oksigjeni
- D) Nekrotizim i përkohshëm

Infermieri Pyetja: 378

Ndër faktorët e modifikushëm të sëmundjeve te arterieve koronare janë:

- A) Historia familjare
- B) Stresi
- C) Seksi
- D) Mosha

Infermieri Pyetja: 379

Cila nga të dhënat e mëposhtme nuk i përket endokarditit:

- A) Zmadhim total i zemrës
- B) Temperaturë, palpitacione
- C) Djersë të shtuara, dispne
- D) Kollë me sekrecione të shumta hemoragjike

Infermieri Pyetja: 380

Cila është veçoria me tipike e angina pectoris?

- A) Dhembja substernale
- B) Ndodh pa ndonjë shkaktar
- C) Zakonisht zgjat 30 minuta
- D) Lehtësohet vetëm me opioide

Infermieri Pyetje: 381

Zakonisht pacientët që kanë dizorientim dhe konfuzion mendor janë:

- A) Të moshës mesme post- infarkt
- B) Të moshës vjetër post-infarkt
- C) Më shumë burrat post- infarkt
- D) Më shumë gratë post- infarkt

Infermieri Pyetje: 382

Në pacientët të cilët vuajnë nga angina ose infarkt gjatë observimit të përgjithshëm
verejmë:

- A) Me anë të palpacionit shohim që lëkura është e ngrohtë
- B) Me anë të prekjes ndjejmë që lëkura është e ftohtë
- C) Observimi me sy shohim djersitje
- D) Mungesë e pranisë së djersve

Infermieri Pyetje: 383

Cili nga shkaktarët e mëposhtëm nuk i përket pankreatitit:

- A) Gurët biliare, hiperlipidemia
- B) Ndërhyrjet kirurgjikale
- C) Infeksionet virale
- D) Osteoporoza dhe varfërimi me kalcium



Infermieri Pyetje: 384

Nitroglicerina jepet nga infermieri/a zakonisht me rrugë:

- A) i.m
- B) i.v
- C) s/c
- D) sublinguale

Infermieri Pyetje: 385

Gjeni përgjigjen e gabuar për Kolutin ulceroz:

- A) Karakterizohet nga ulceracione të shumta të zorrës
- B) Prek kryesisht duodenin
- C) Shoqërohet me rënie në peshë dhe diarre
- D) Kolonoskopia vendos diagnozën

Infermieri Pyetje: 386

Një pacient i cili ka kaluar infarkt miokardi zakonisht për tu shëruar plotësisht i duhen:

- A) Me pak se 4 jave
- B) Zakonisht 5-6 jave
- C) Duhet 6-8 jave
- D) Në 10 jave shërohen plotësisht

Infermieri Pyetje: 387

Osteoartriti prek më shumë regjionin cervikal në nivelin:

- A) C2-C3
- B) C3-C4
- C) C4-C5
- D) C4-C6





Infermieri Pyetja: 388

Gjeni përgjigjen e gabuar:

- A) HTA sekondar ka patologjitë renale si shkaktarë më të shpeshtë
- B) HTA kemi vetëm në rastet kur presioni sistolik është mbi 160 mmHg
- C) Hipertrofia kardiake është karakteristike e HTA kronik
- D) Preken nga HTA më shumë meshkujt se sa femrat

Infermieri Pyetja: 389

Gjeni përgjigjen e saktë:

- A) Nekroza miokardiale është proces i rikthyeshëm
- B) Obeziteti nuk është faktor predispozues për Infarkt Akut të Miokardit
- C) Preken më shumë femrat se meshkujt nga Infarkti Akut i Miokardit
- D) Duhanpirja është ndër faktorët etiologjikë më të shpeshtë të Infarktit Akut të

Miokardit



Infermieri Pyetja: 390

Menaxhim kirurgjikal në osteoartrit do të thotë:

- A) Rivendosje e pjeshme e kyçit
- B) Osteotomi
- C) Heqje e pjeshme e kyçit
- D) Rivendosje totale e kyçit

Infermieri Pyetja: 391

"Ngurtësimi mengjezor" është shenjë tipike për pacientët me :

- A) Osteoartrit
- B) Artriti reumatoid
- C) Asnjëra
- D) Hernie diskale te regjionit lumbar



Infermieri Pyetje: 392

Një kyç i ngrohtë dhe i enjtur tregon për:

- A) Rritje e furnizimit me gjak në atë pjesë të kyçit
- B) Grumbullim jonormal i gjakut venoz në atë pjesë të kyçit
- C) Inflamacion
- D) Infeksion

Infermieri Pyetje: 393

Gastriti kronik shoqërohet me :

- A) Infeksion
- B) Inflamacion
- C) Lezione në tru
- D) Insuficiencë renale

Infermieri Pyetje: 394

Terapia antiacide nuk lehtëson gjendjen në:

- A) Gastritin kronik
- B) Gastritin atrofik
- C) Gastritin akut
- D) Në ulçeren gastrike

Infermieri Pyetje: 395

Vitamina B12, e rëndësishme si antianemik, sekretohet nga mukoza:

- A) e pemës bronkiale
- B) intestinale
- C) gastrike
- D) e ezofagut

Infermieri Pyetje: 396

Gjeni përgjigjen e saktë:

- A) Insuficiencia renale shoqërohet me ulje të kreatininës
- B) Mungesa e eritropoetinës është karakteristike e insuficiencës renale
- C) Proteinuria tregon për dëmtim tëndjeshëm të filtracionit glomerular
- D) Dializa është një ndër opsionet terapeutike

Infermieri Pyetje: 397

Shkaktar të tilla si helicobacter pilori, duhani, stresi janë tipike për:

- A) Gastritin akut
- B) Gastritin kronik
- C) Gastritin atrofik
- D) Ulçeren peptike

Infermieri Pyetje: 398

Triada discomfort - dhembje - urth janë tipike për ulçerën :

- A) gastrike
- B) peptike
- C) duodenale
- D) sipërfaqesore

Infermieri Pyetje: 399

Perforacioni i stomakut shkakton shok:

- A) septic
- B) hypovolemik
- C) hemoragjik
- D) endogjen



Infermieri Pyetje: 400

Shkaktarët më të zakonshëm të pielonefritit janë:

- A) Pseudomonas
- B) Enterobakteret
- C) E. Coli
- D) Klipsiella

Infermieri Pyetje: 401

Gjeni përgjigjen e gabuar

- A) Leucemia është mieloidë dhe limfoide
- B) Ulja e eritrocitëve është domosdoshmëri në leucemi
- C) Prek me shumë meshkujt se femrat
- D) Leucemia mund të jetë akute ose kronike



Infermieri Pyetje: 402

Trajtimi i pielonefritit bëhet nëpërmjet:

- A) Ndjekje e vazhdueshme në shtëpi
- B) Trajtimi me ilaçe
- C) Trajtimi kirurgjikal
- D) Hospitalizimi

Infermieri Pyetje: 403

Ulcera gastrike ndodh zakonisht në grup moshat:

- A) 50-60 vjeçarë
- B) 40-50 vjeçarë
- C) 30-40 vjeçarë
- D) 20-30 vjeçarë



Infermieri Pyetje: 404

Simptoma klinike karakteristike e pacientit me Cistit është:

- A) Urgjenca për të urinuar
- B) Anuri
- C) Oliguri
- D) Temperaturë e ulët

Infermieri Pyetje: 405

Gjeni përgjigjen e gabuar: në astmën bronkiale kemi:

- A) Respiracion të shpeshtë
- B) Spirometria tregon rritje të kapacitetit pulmonar
- C) Dhimbje të krahërorit
- D) Kollë të forte

Infermieri Pyetje: 406

Në aneminë ferrodificitare gjejmë të gjitha përveç:

- A) Ferritinemi të ulur
- B) Rritje të hemoglobinës
- C) Hipokromi
- D) Ulje të hematokritit

Infermieri Pyetje: 407

Gjeni përgjigjen e saktë:

- A) Hiperuricemia nuk shkakton patologji reumatizmale
- B) Dhimbjet me karakter inflamator nuk ndeshen në qetësi
- C) Polimialgjia gjendet vetëm në sëmundjet reumatizmale
- D) Osteoporoza prek më shumë femrat se meshkujt



Infermieri Pyetje: 408

Gjeni përgjigjen e gabuar:

- A) Neuropatia monitorohet përmes ENG
- B) Fundus okuli është ekzaminim i domosdoshëm tek diabetikët
- C) HbA1C nuk është tregues i saktë i hiperglicemive
- D) Peptidi C tregon për sasinë e saktë të insulinës së prodhuar nga pankreasi

Infermieri Pyetje: 409

Tek pacienti me insuficiencë renale kronike, manifestimet hematologjike përfshijnë, anemine, e cila manifestohet me:

- A) temperaturë
- B) dhimbje
- C) zbehje
- D) të vjella

Infermieri Pyetje: 410

Tek pacientet me insuficiencë renale kronike, infermieri monitoron sasinë e kaliumit të marrë, pasi hiperkalemia mund shkaktojë:

- A) Disritmi kardiake
- B) Hypertension
- C) Edema
- D) Te vjella

Infermieri Pyetje: 411

Tek pacientet me insuficiencë renale kronike, infermieri siguron kujdesje për çdo zonë ku integriteti i lëkurës është i demtuar; kjo është e rëndësishme për të :

- A) Zvogëluar rrezikun për infeksione
- B) Është një kujdesje rutine nga ana e infermierit
- C) Është e rëndësishme për higjienën e pacientit
- D) Nuk është faktorë pedipozues





Infermieri Pyetja: 412

Në diabetin mellitus janë të pranishme të gjitha shenjat përveç njërës:

- A) Polidipsia
- B) Polifagia
- C) Galaktorrea
- D) Poliuria

Infermieri Pyetja: 413

Per te reduktuar konstipacionin, me qellim qe pacienti te kete nje aktivitet normal te zorreve eshte e rendesishme:

- A) Nje diete me permbajtje fibrash
- B) Nje diete pikante
- C) Jete sedentare
- D) Sa me pak aktivitet



Infermieri Pyetja: 414

Trajtimi primar i pacienteve me anemi nga mungesa e Fe, eshte:

- A) Rritja e marrjeve orale te hekurit nepermjet ushqimit
- B) Aktiviteti fizik
- C) Sa me shume likide
- D) Regjim shtrati

Infermieri Pyetja: 415

Ne trajtimin e pacienteve me anemi aplastike themelore jane:

- A) Transfuzionet e gjakut
- B) Dieta
- C) Likidet
- D) Aktiviteti





Infermieri Pyetja: 416

Tek pacientet me anemi , shmangia e lodhjes, eshte e rendesishme qe:

- A) Pacienti te mos perjetoje lodhje gjate kryerjes se aktiviteteve ditore
- B) Eshte nje kujdes rutin
- C) Nuk eshte e rendesishme per pacientin
- D) Aktivizon pacientin

Infermieri Pyetja: 417

Qarko nje nder simptomat karakteristike te semundjes se diabetit mellitus:

- A) Polifagi
- B) Fotofobi
- C) Anuri
- D) Edem



Infermieri Pyetja: 418

Cirroza hepatiche ka si shkaktar te gjithë shkaqet e poshtëshënuar përveç njërit:

- A) Konsumimin e alkoolit
- B) Dëmtimet e rrugëve biliare
- C) Ulcerën duodenale
- D) Hepatitin autoimun

Infermieri Pyetja: 419

Limfomat Hodgkin jane semundje malinjizante qe mund te zhvillohen ne cdo grup moshe, por, piken me te madhe te incidences e ka ne moshat e reja:

- A) 10-vjecare
- B) 20-vjecare
- C) 30-vjecare
- D) 40-vjecare



Infermieri Pyetja: 420

Per infermierin qe kujdeset per pacientin me Leucemi, objektivi kryesor eshte :

- A) Ta mbroje ate nga infeksionet
- B) Te parandaloje te vjellat
- C) Te qetesoj nauset
- D) Te qetesoj familjaret

Infermieri Pyetja: 421

Per shkak se prodhimi I palces normale eshte shume I kufizuar ne pacientet me leucemi, kjo e vendos pacientin ne rrezik te madhe:

- A) per hemoragji
- B) per nausea
- C) te vjella
- D) temperature

Infermieri Pyetja: 422

Diabeti mellitus eshte nje semundje kronike qe ndikon ne :

- A) Shume organe dhe sisteme te organizmit
- B) Ne te gjithe organizmin
- C) Pothuaj nuk ndikon ne organet dhe sistemet e organizmit
- D) Prek vetem nje organ te organizmi

Infermieri Pyetja: 423

Mungesa e insulines ndalon qelizat qe :

- A) Te perdorin glukozen si burim energjie
- B) Nuk eshte e rendesishme per organizmin
- C) Eshte fatale ne organizem
- D) Ndikon disi ne mbarvajtjen e organizmit

Infermieri Pyetje: 424

Një ndër faktorët predispozues të infeksioneve të traktit urinar është:

- A) Anomalia strukturale dhe funksionale e traktit urinar
- B) Refluksi ezofageal
- C) Gastritët
- D) Diarret

Infermieri Pyetje: 425

Cistiti jo-infeksioz mund të rezultojë nga:

- A) ekspozimi në agjent kimik
- B) ekspozimi në agjent infeksioz
- C) ekspozimi në temperatura të larta
- D) sëmundje të ndryshme

Infermieri Pyetje: 426

Një ndër vendet ku është lokalizuar edema në pacientët me Cirroze është :

- A) Fytyra
- B) Kapakët e syve
- C) Sakrumi
- D) në të gjithë trupin

Infermieri Pyetje: 427

Hypokalemia kronike që takohet tek bulemikët rezulton nga:

- A) Abuzimi me laksativ
- B) Abuzimi me alkool
- C) Abuzimi me kafein
- D) Aktivitet i tepruar

Infermieri Pyetje: 428

Në pankreatitin akut nuk gjejmë:

- A) Amilazën e rritur
- B) Lipazën e rritur
- C) Eritopoetinën e rritur
- D) Kalcifikime të pankreasit

Infermieri Pyetje: 429

Psikoterapia tek pacientë me bulëmi nervore është e rëndësishme dhe ka si qëllim:

- A) Rritjen e vet-vleresimit
- B) Është një procedurë rutinë
- C) Nuk ka ndonjë qëllim të caktuar
- D) Ndikon në ushqyerjen e pacientit

Infermieri Pyetje: 430

Shkaktari kryesor i Cistitit është:

- A) Bakteri koliform
- B) Insulin
- C) Acetilkolina
- D) Dopamine

Infermieri Pyetje: 431

Bronhektazia karakterizohet nga të gjithë elementet me përjashtim të:

- A) Kollë kronike me sputum purulent
- B) Hemoptizia
- C) Elemente kutane purpurik
- D) Dispne dhe cianoze

Infermieri Pyetje: 432

Kolecistiti kronik nuk karakterizohet nga:

- A) Dhimbje të forta në zonën epigastrike
- B) Të vjella biliare
- C) Temperaturë subferile
- D) Rritje e amilazës dhe lipazës

Infermieri Pyetje: 433

Qarko një ndër simptomat karakteristike të sëmundjes së diabetit insipid:

- A) Diureza masive
- B) Fotofobia
- C) Anuria
- D) Edema



Infermieri Pyetje: 434

Diabeti insipid nefrogenik rezulton nga:

- A) Një defekt I trashëgueshem
- B) Tumoret në regionin hypothalamic-petuitar
- C) Trauma në koke
- D) Tumoret metastazike

Infermieri Pyetje: 435

Pielonefriti akut është :

- A) Infeksioni akut I traktit të sipërurinar
- B) Pezmatimi I fshikëzës urinare
- C) Pezmatimi I uretrës
- D) Pezmatimi I prostatit



Infermieri Pyetje: 436

Një ndër shkaktarët sekondarë të glomerulonefritit kronik është:

- A) Stafilokoku
- B) Streptokoku beta hemolitiki grupit A
- C) Lupus sistemik eritematoz
- D) Hepatitis A

Infermieri Pyetje: 437

Një ndër shkaktarët primar të glomerulonefritit akut është:

- A) sklerodermia sistëmiqe progresive
- B) purpura trombocitopenike
- C) poliartriti nodular
- D) sifilizi



Infermieri Pyetja: 438

Azotemia prerenale në pacientë me insuficiencë renale akute karakterizohet me një nga simptomat e mëposhtme:

- A) Ndryshime në sasinë ose aparencën e urinës
- B) Hipotension arterial
- C) Diarre
- D) Konstipacion

Infermieri Pyetja: 439

Agjenti shkaktar i hepatitit A përhapet nëpërmjet rrugës:

- A) Hematogjene
- B) Oralo-fekale
- C) Kontakti me plagë të kontaminuar
- D) Kontakti me ujë të kontaminuar

Infermieri Pyetja: 440

Periudha e inkubacionit të hepatitit A është:

- A) 2-3 javë
- B) 2-6 javë
- C) 2-9 javë
- D) 2-12 javë

Infermieri Pyetja: 441

Gastriti kronik shkakton dhimbje epigastrike e cila:

- A) Lehtesohet nga marrja e ushqimit
- B) Perkeqesohet nga marrja e ushqimit
- C) Nuk ndikon ne dhimbje marrja ose jo e ushqimit
- D) Lehtesohet me likide



Infermieri Pyetja: 442

Tek cirrotiket, rekomandohet administrimi I Laktulozes per arsye se:

- A) Eleminon amoniakun nepermjet feceve
- B) Eshte pjese e kujdesit
- C) Nuk eleminon amoniakun
- D) Ndikon ne permiresimin e klinikes

Infermieri Pyetja: 443

Faktoret familjare dhe gjenetik luajne nje rol te rendesishem ne obezitet. Kur te dy prinderit jane obese sa % e femijeve lindin te tille:

- A) 80 % e femijeve
- B) 60 % e femijve
- C) 40% e femijve
- D) 20% e femijve



Infermieri Pyetja: 444

Nje person percaktohet si obez kur, pesha e tij eshte:

- A) 45-50 % mbi peshen ideale
- B) 35-40 % mbi peshen ideale
- C) 25-30% mbi peshen ideale
- D) 15-20% mbi peshen ideale

Infermieri Pyetja: 445

Nje person percaktohet me obezitet morbid kur pesha e tij eshte:

- A) 80% mbi peshen ideale
- B) 60% mbi peshen ideale
- C) 40 % mbi peshen ideale
- D) 20 % mbi peshen ideale



Infermieri Pyetje: 446

Karaharori i pacientit merr një formë si fuçi (bucelë) në:

- A) Bronkit kronik
- B) Pneumoni
- C) Emfizemë
- D) Fibrozë cistike

Infermieri Pyetje: 447

Pacientët me SPOK (Sëmundje Pulmonare Obstruktive Kronike), preferohen të administrohen nëpërmjet inhalatimit sepse shpërnahet medikamenti direkt në mushkëri:

- A) Mukolitikët
- B) Sodium kromolin
- C) Bronkodilatatorët
- D) Antibiotikët

Infermieri Pyetje: 448

Në pacientët me Pneumoni aspekti më i rëndësishëm për edukimin e pacientëve dhe familjarëve është:

- A) Larja e duarve
- B) Pozicionimi
- C) Edukimi për shmangien e infeksioneve të traktit të sipërm respirator
- D) Shmangia e qëndrimit me këmbë të kryqëzuara

Infermieri Pyetje: 449

Në pacientët me SPOK, për të reduktuar inflamacionin në fyt dhe mushkëri: përdoren

- A) Mukolitikët
- B) Antikolinergjikët
- C) Sodium kromolin
- D) Kortikosteroidet

Infermieri Pyetje: 450

Testi i tuberkulizimit bëhet (injektohet) në mënyrë:

- A) Intravenoze
- B) Intradermale
- C) Intramuskulare
- D) Subkutane

Infermieri Pyetje: 451

Në pacientët me emboli pulmonare mjekët, që të mos lejojnë zmadhimin e embolës dhe të parandalojnë formimin e koagulave të reja, rekomandojnë:

- A) Analgjezik
- B) Antikoagulantë
- C) Antikolinergjikë
- D) Antibiotikë

Infermieri Pyetje: 452

Palpitacioni është:

- A) Një ndjenjë e të rrahurave të shpeshta në krahë
- B) Humbje e përkohshme e koshiencës
- C) Frymëmarrje e shkurtër
- D) Një tregues i qarkullimit periferial

Infermieri Pyetje: 453

Diferenca midis vlerave sistolike dhe diastolike është referuar si:

- A) Pulsacioni venoz
- B) Presion i pulsit
- C) Presion i gjakut paradoksal
- D) Presion postural i gjakut

Infermieri Pyetje: 454

Presioni i gjakut paradoksal është përkufizuar si një rënie e presionit sistolik më shumë se:

- A) 10 mmHg
- B) 20 mmHg
- C) 30 mmHg
- D) 40 mmHg

Infermieri Pyetje: 455

Vlerësimi i pulsacionit arterial i jep infermierit informacion për:

- A) Zhurmat
- B) Integritetin vascular dhe qarkullimin
- C) Temperaturën e lëkurës
- D) Cianozën periferiale

Infermieri Pyetje: 456

Shkaktari më i zakonshëm i insuficiencës kardiace është:

- A) Infarkti i miokardit
- B) Pneumonia
- C) Bronkiti kronik
- D) Astma bronkiale

Infermieri Pyetje: 457

Në pacientët me Insuficiencë kardiace, për të rritur kontrakturat dhe zvogëluar rrahjet e zemrës tradicionalisht rekomandohen:

- A) Diuretikë
- B) Betablokues
- C) Digitalikë
- D) Bronkodilatatorë



Infermieri Pyetja: 458

Në pacientët me hipertension, efekti anësor kryesor që shoqëron administrimin e diuretikëve është:

- A) Disfunksioni seksual
- B) Lodhja
- C) Depresioni
- D) Hypokalemia

Infermieri Pyetja: 459

Në pacientët me Infarkt Miokardi mjeku mund të përshkruajë morfinë sulfat për lehtësimin e diskomfortit. Shenjat e një intoksikimi me morfinë janë:

- A) Depresioni respirator-hypotensioni-të vjella të shumta
- B) Lodhje-hypoglicemi-hypokalemi
- C) Dhimbje koke-marrje mendsh-zbehtësi
- D) Dobesi-lodhje-marrje mendsh

Infermieri Pyetja: 460

Në pacientët me Angina Pectoris medikamenti fillestar i përshkruar kundër dhimbjes është nitroglicerina sublinguale. Nitroglicerina:

- A) Rishpërndan gjakun në drejtim të subendokardit
- B) Redukton ritmin dhe punën e zemrës
- C) Rrit kontrakturat
- D) Ka efekt të shpejtë shkarkues

Infermieri Pyetja: 461

Endokarditi infektiv i referohet:

- A) Inflamacionit të perikardiumit, qeses embriologjike që mbështjell zemrën
- B) Trashjes inflamatore kronike të perikardiumit që e shtyp zemrën
- C) Infeksionit bakteral ose fungal të endokardit, e cila përshin dhe valvulat
- D) Dëmtimeve inflamatore të gjitha shtresave të zemrës





Infermieri Pyetja: 462

Ankesa kryesore e një pacienti me Osteoartrit është:

- A) Dispnea
- B) Kolla
- C) Dhimbja e kyçeve
- D) Petekie

Infermieri Pyetja: 463

Nodulat Osler's apo lezionet Janeways konsiderohen manifestime klasike në pacientët me:

- A) Endokardit infektiv
- B) Perikardit
- C) Kardiomiopati
- D) Kardit reumatik



Infermieri Pyetja: 464

Manifestimi më i madh dhe zakonisht i vetmi në Lupusin diskoid është:

- A) Temperature lokale
- B) Lokalizimi i edemave
- C) Prania e rasheve të thata dhe të luspuara në fytyrë
- D) Hipertrofi e kyçeve

Infermieri Pyetja: 465

Për shkak se Lupus nefritis është një shkaktar i vdekjes, infermieri me vëmendje vlerëson për shenjat e përfshirjes së:

- A) sistemit respirator
- B) sistemit renal
- C) sistemit kardiak
- D) sistemit neurologjik





Infermieri Pyetja: 466

Për shkak se Lupusi Sistemik është një gjendje inflamatore, gjendja më e zakonshme tek këta pacientë është:

- A) Ethja
- B) Takikardia
- C) Dispnea
- D) Kolla

Infermieri Pyetja: 467

Kujdesi infermieror për një pacient me Sklerodermi përfshin:

- A) Përmirësimin dhe sigurimin e mos vajtjes në llixha dhe plazh
- B) Sigurimin e lëvizjes së artikulacioneve duke inkurajuar ushtrime të shumta
- C) Përdorimin e kremit mbrojtës kundër diellit
- D) Kujdesin ndaj perceptimit të familjarëve

Infermieri Pyetja: 468

Është një sëmundje inflamatore kronike e rrugëve të frymëmarrjes, në të cilën marrin pjesë shumë qeliza dhe element qelizorë, sidomos mastocitet, eozinofilet, dhe limfocitet T:

- A) Tuberkulozi pulmonar
- B) Embolia pulmonare
- C) Astma bronkiale
- D) Edema pulmonare





Infermieri Pyetje: 469

Glukokortikoidet inhalatore janë barnat mbajtëse më efikase në pacientët astmatikë. Ato:

- A) Frenojnë inflamacionin e rrugëve të ajrit, pakësojnë hiperaktivitetin bronkial, kontrollojnë dhe parandalojnë simptomat
- B) Janë bronkodilatatorë që bllokojnë efektin e acetilkolinës së çliruar nga nervat kolinergjikë në rrugët e ajrit
- C) Janë bronkodilatatorë që e relaksojnë muskulaturën e lëmuar të bronkeve
- D) Janë bronkodilatatorë që mund të kenë efekte ekstrapulmonare

Infermieri Pyetje: 470

Disfagia është:

- A) Ndjenja e bllokimit apo shtrëngimit në rajonin retrosternal apo epigastër, gjatë fazës së kalimit të masës ushqimore nëpër ezofag
- B) Një inflamacion i shtresës mukozale të stomakut
- C) Një okluzion i plotë i lumenit të një segmenti të traktit gastrointestinal
- D) Një kalim permanent ose intermitent i një porcioni të pjesës së sipërme të stomakut, nëpërmjet orificiumit ezofageal të diafragmës

Infermieri Pyetje: 471

Refluksi- Gastro-Ezofagial përfaqëson një:

- A) okluzion të plotë të lumenit të një segmenti të traktit gastro-intestinal
- B) ngushtim të lumenit të një pjese të tubit tretës
- C) qese të lokalizuar të murit të traktit tretës e cila përmban të gjitha shtresat e indit
- D) situatë patologjike, që karakterizohet nga rikthimi i përmbajtjes acide të stomakut në ezofag.



Infermieri Pyetje: 472

Cilat nga barnat e mëposhtme shkakton efekteve të padëshirueshme në stomak?

- A) Antiinflamatorët josteroide
- B) Antiacidet
- C) Antagonistët e receptorëve histaminikë
- D) Frenuesit e pompës protonike

Infermieri Pyetje: 473

Asciti është:

- A) Rritja e likidit me përmbajtje të lartë të karbohidrateve dhe të ulet në yndyrna
- B) Akumulimi i likidit brenda kavitetit peritoneal
- C) Rritja e osmolaritetit në urinë
- D) Rritja e nivelit të urea-nitrogenit në serum

Infermieri Pyetje: 474

Ikteri hepatoqelizor zhvillohet sepse hepari:

- A) Nuk mund të metabolizojë bilirubinën
- B) Metabolizon bilirubinën më shumë se norma
- C) Nuk ka çdo lob të përfshirë
- D) I ka nodulat që ndryshojnë në formë dhe përmasë

Infermieri Pyetje: 475

Në pacientët me Cirrozë dhe likid ascitik qëllimi primar i terapisë diuretike është:

- A) Të reduktojë volumin qarkullues dhe të ulë sasinë e likidit ascitik
- B) Që pacienti të përjetojë lehtësim nga hemoragjia gastro-intestinale
- C) Të mos ketë ripërsëritje të episodeve hemoragjike
- D) Reduktimi i simptomave gastro-intestinale

Infermieri Pyetje: 476

Bulimia nervore është një sëmundje e ushqyerjes që karakterizohet nga:

- A) Episode të mbingrënies të cilat janë të pakontrolluara
- B) Refuzimi i ushqimit për shkak të frikës së dhjamosjes
- C) Defiçite të vitaminave në dietë
- D) Humbje e masës kockore nga osteoporoza

Infermieri Pyetje: 477

Obeziteti morbid (patologjik) i referohet peshës që negativisht vepron në shëndetin e personit, zakonisht më shumë se:

- A) 10% e peshës ideale trupore
- B) 20% e peshës ideale trupore
- C) 30% e peshës ideale trupore
- D) 40% e peshës ideale trupore

Infermieri Pyetje: 478

Infeksionet e traktit urinar ndodhin:

- A) Në raport të njëjtë mes meshkujve dhe femrave
- B) Më shpesh tek meshkujt se tek femrat
- C) Më shpesh tek femrat se tek meshkujt
- D) Nuk ka rëndësi gjinia

Infermieri Pyetje: 479

Cistiti ndodh më shpesh tek gratë për shkak të:

- A) Shkurtësisë së uretrës
- B) Ndryshimeve në inde lidhur me nivelin e ulët të estrogenit
- C) Ndryshimeve në procesin e të menduarit
- D) Deficiteve në njohuri në lidhje me metodat e parandalimit

Infermieri Pyetje: 480

Veçoria primare e sindromit nefrotik është nivel i lartë i:

- A) proteinurisë
- B) glicemisë
- C) leukociteve
- D) acidit folik

Infermieri Pyetje: 481

Anemia hemolitike kongjenitale më e shpeshtë është e shoqëruar me mungesën e:

- A) Fe (hekurit)
- B) Glukoz 6 Fosfat Dehidrogjenit (G6PD)
- C) Vit B 12
- D) Acidit folik

Infermieri Pyetje: 482

Problemi bazë në aneminë nga mungesa e Fe është:

- A) Pengimi i transportit të acidit folik
- B) Një deficiet i qarkullimit të eritrociteve, nga një dëmtim i qelizave të mëparshme hemapoetike
- C) Zvogëlimi i mbështetjes së Fe për zhvillimin e ruazave të kuqe të gjakut
- D) Një deficiet i enzimës Glukoz 6 Fosfat Dehidrogjenit (G6PD)

Infermieri Pyetje: 483

Komplikacionet kryesore të diabetit përfshijnë:

- A) Çrregullime të strukturës e funksionit të murit të enës së gjakut
- B) Dhimbje koke
- C) Zvogëlim të periudhave të vëmendjes
- D) Hemoragji nga gingivat

Infermieri Pyetje: 484

Acidoketoza Diabetike vjen nga mungesa e insulinës, me rritje relative apo absolute të:

- A) Proteinurisë
- B) Urea-nitrogenit
- C) Glukagonit
- D) Kaliumit

Infermieri Pyetje: 485

Hypomagnezemia shihet tek:

- A) Pijanecet dhe tek personat me sindromë të keqabsorbimit, disa sëmundje renale dhe keqëushqim
- B) Tek pacientët me mungesë të Vit D
- C) Tek pacientët me deformime të gjymtyrëve
- D) Tek pacientët me shqetësime psikologjike

Infermieri Pyetje: 486

Endokarditi Reumatik ndodh zakonisht pas një infeksioni të rrugëve të sipërme respiratore, shkaktuar nga:

- A) Streptokoku i grupit A
- B) Pseudomonas aeruginosa
- C) Serratia marcescens
- D) Adenoviruset

Infermieri Pyetje: 487

Sindroma klinike, që karakterizohet nga rënie e shpejtë dhe e theksuar e vlerës së filtrimit glomerular (me rritje të kreatininës dhe azotemisë) është:

- A) Insuficenca kardiake
- B) Insuficenca ventilatore
- C) IRA (Insuficenca Renale Akute)
- D) Insuficenca e oksigjenimit

Infermieri Pyetje: 488

Teste përgatitese për provimin e licencës për studentët e infermierisë
<https://gjithcka.al>

Në diabetin insipid sasia e ADH (Hormoni Anti Diuretik) e çliruar në përgjigje të stimujve fiziologjikë është:

- A) E pamjaftueshme
- B) Në normë
- C) E rritur
- D) Në vlerat maksimale

Infermieri Pyetje: 489

Sindroma Kushing është sëmundje që vjen si pasojë e prodhimit të shtuar të:

- A) Kortizolit
- B) Kaliumit
- C) Kalçiumit
- D) Natriumit

Infermieri Pyetje: 490

Shkaktari kryesor i Ulçerës gastrike është:

- A) Anemia pernicioze
- B) *Helicobacter pylori*
- C) Terapia me antiacid
- D) Marrja e qumështit

Infermieri Pyetje: 491

Është sëmundje multisistemike e karakterizuar nga dëmtime inflamatorë, vaskulare të lëkurës dhe të organeve të brendshme:

- A) Ethja reumatizmale
- B) Artriti reumatoid
- C) Sklerodermia
- D) Osteoartriti



Infermieri Pyetje: 492

Në pacientët me Uretrit, Cistit dhe Piolenefrit mikrobi shkakton në 80% të infeksioneve të pandërlikuara të rrugëve urinare është:

- A) Esherica coli
- B) Herpes simplex
- C) Adenoviruset
- D) Cytomegaloviruset

Infermieri Pyetje: 493

Infermieri fokusohet në simptomat kryesore të një pacienti me Bronkit kronik të cilat janë:

- A) Dhimbje kraharori gjatë respirimit
- B) Dispne dhe kollë produktive
- C) Temperaturë dhe djersë
- D) Takipne dhe takikardi

Infermieri Pyetje: 494

Dhimbja e kraharorit në pacientët me Angina Pectoris shkaktohet nga:

- A) Vazokonstriksioni koronar
- B) Lëvizja e trombit
- C) Ishemia e miokardit
- D) Prezenca e ateromës

Infermieri Pyetje: 495

Ndër efektet anësore kryesore që shoqërojnë administrimin e nitroglicerines është:

- A) Dobësia muskulare
- B) Hipertensioni
- C) Bradikardia
- D) Dhimbja e kokës

Infermieri Pyetje: 496

Alogjia-simptomat negative të skizofrenisë do të thotë:

- A) Kontakt i varfër me sy
- B) Emocion i papërshtatshëm
- C) Varfëri në të folur
- D) Latencë në përgjigje

Infermieri Pyetje: 497

Bashkëbisedimet terapeutike përbëhen nga:

- A) ato sociale dhe terapeutike
- B) Faza fillestare ose faza hyrëse
- C) Faza e punës
- D) Faza përfundimtare

Infermieri Pyetje: 498

Faza përfundimtare e bashkëbisedimeve do të thotë:

- A) Menaxhim i ankthit
- B) Kujdesi dhe puna në maksimum
- C) Një hap pozitiv
- D) Përforsimi i kufinjëve gjatë takimeve

Infermieri Pyetje: 499

Infermieri/a i shëndetit mendor është i aftë kur është në gjendje:

- A) Të respektojë diversitetin
- B) Të ketë besim tek të tjerët
- C) Të manifestojë siguri
- D) Të marrë përsipër përgjegjësitë

Infermieri Pyetja: 500

Cila nga shtresat e lëkurës përbëhet kryesisht nga fije kolagjene dhe elastike:

- A) epiderma
- B) shtresa korneale
- C) derma
- D) hipoderma

Infermieri Pyetja: 501

Kortikoterapia është trajtimi bazë për:

- A) folikulitin
- B) kandidozën
- C) ekzemën
- D) melanomën

Infermieri Pyetja: 502

Në principet e rikthimit të pacientit në jetën normale bën pjesë:

- A) Mbështetja familjare
- B) Aksesit në burime
- C) Kujdesi klinik
- D) Stigma

Infermieri Pyetja: 503

Respektimi I Diversitetit do të thotë:

- A) Bashkëpunimi me familjarë dhe kolegë
- B) Të kuptojë dhe të njohë diversitetin
- C) Përkushtim dhe mundësi të barabarta
- D) Respektimi I nivelit kulturor të pacientit

Infermieri Pyetje: 504

Dermatofitoza është një infeksion:

- A) viral
- B) mikrobik
- C) stafilo-streptokoksik
- D) mykotik

Infermieri Pyetje: 505

Depresioni shprehet me :

- A) Vështërsi në përqendrim
- B) Tension muskular
- C) Deluzione
- D) Haluçinacione

Infermieri Pyetje: 506

Ankthi i vazhdueshëm mund të shkaktojë:

- A) Pamundësi funksionimi i përditshëm
- B) Depresion të pakontrollueshëm
- C) Psikozë manjakale
- D) Skizofreni hebrefrenike

Infermieri Pyetje: 507

Gjendjet ankioze shoqërohen me:

- A) Pamundësi për tu kujdesur për veten
- B) Harrese dhe humbje kujtese
- C) Papërgjegjshmëri
- D) Gjykim i dobët

Infermieri Pyetje: 508

Manaxhimi i depresionit bëhet nëpërmjet:

- A) Manaxhimi i sëmundjes fizike
- B) Trajtimi me ilaçe
- C) Vetëndihma
- D) Trajtim i përgjithshëm

Infermieri Pyetje: 509

Të sjellë shndryshimin do të thotë:

- A) Të kuptosh pasojat e problemit
- B) Formulimi i programit të besueshëm
- C) Të mundësosh shërbime me vlera
- D) Arritja e një ndryshimi pozitiv

Infermieri Pyetje: 510

Zhvillim personal i infermierit do të thotë:

- A) Një plan personal dhe profesional zhvillimi
- B) Aftësi për të vendosur synime realiste
- C) Akses në trajnime dhe arsimim
- D) Kërkimi i vazhdueshëm i të rejave të fundit

Infermieri Pyetje: 511

Rreziqet nga çrregullimet e humorit vijnë si rezultat i:

- A) Gjykimit të dobët
- B) Moshës së rrezikut
- C) Agresivitetit
- D) Provokimit

Infermieri Pyetje: 512

Nuk është formë e depresionit:

- A) Crregullimi bipolar
- B) Ulja mëngjezore
- C) Hypomania
- D) Mania

Infermieri Pyetje: 513

Neuralgjia posherpetike nuk ka si karakteristikë:

- A) dhimbjet nevralgjike që mund të zgjatën për një kohë të gjatë
- B) shfaqet kryesisht te të moshuarit
- C) shoqëron infeksionet bakteriale
- D) është një komplikacion pas shërimit klinik të Herpes Zoster

Infermieri Pyetje: 514

Çrregullimi bipolar NJE shprehet me:

- A) Distrofi parësore
- B) Mani me depression
- C) Hypomania pa depression
- D) Ulje mëngjezore

Infermieri Pyetje: 515

Trajtimi në crregullimet e humorit bëhet me:

- A) Antidepresiv
- B) Antikomvulsiv
- C) Antipsikotik
- D) ECT

Infermieri Pyetje: 516

Zakonisht pacientët me hypomani paraqesin:

- A) Entuziazëm të tepruar
- B) Hiperaktivitet
- C) Pagjumësi
- D) Suicid

Infermieri Pyetje: 517

Në psikozën paranoide pacienti paraqet:

- A) Rritje e vetvlersimit
- B) Veprimtari e shtuar
- C) Humor i ngritur
- D) Halucinacione

Infermieri Pyetje: 518

Pacienti me depresion psikotik paraqet:

- A) Tentativa për vetvrasje
- B) Çrregullime të oreksit
- C) Të qara me lot
- D) Anhedoni

Infermieri Pyetje: 519

Në psikozën maniakale pacienti paraqet:

- A) Konfuzion
- B) Izolim
- C) Fluturim të ideve
- D) Anhedoni

Infermieri Pyetja: 520

Niveli I litiumit në gjak duhet të jetë Brenda normës:

- A) 5-7 miliektolitër
- B) 7-10 miliektolitër
- C) 10-17 miliektolitër
- D) 17-20 miliektolitër

Infermieri Pyetja: 521

Episodet depressive të mëdha shoqërohen me:

- A) Çrregullime emocionale
- B) Mendime për vetvrasje
- C) Humor I ngritur
- D) Veprimtari e shtuar

Infermieri Pyetja: 522

Për cilën nga sëmundjet është karakteristike shoqërimi me sëmundje të tjera atopike:

- A) psoriazis vulgaris
- B) akne Vulgaris
- C) ekzema endogjene
- D) tinea pedis

Infermieri Pyetja: 523

Simptomat pozitive të skizofrenisë I përkasin dimensionit:

- A) emocional
- B) intelektual
- C) psikotik
- D) shpirtëror

Infermieri Pyetje: 524

Skizofrenia shoqërohet me prognozë "shumë të keqe" në atë:

- A) katatonike
- B) hebefrenike
- C) reziduale
- D) të thjeshtë

Infermieri Pyetje: 525

Shkaktari më domethënës i skizofrenisë është :

- A) Çrregullimi biokimik i metabolizmit në tru
- B) Zhvillimi patologjik i trurit
- C) Faktorët ambjental
- D) Gjenetika

Infermieri Pyetje: 526

Trajtimi më produktiv në skizofreni konsiston në :

- A) Trajtim social
- B) Antipsikotik
- C) Antidepresiv
- D) ECT

Infermieri Pyetje: 527

Deluzionet janë zakonisht:

- A) Konkluzione
- B) Perceptione
- C) Zëra imagjinare
- D) Bindje të gabuara

Infermieri Pyetje: 528

Halucinacionet janë perceptime:

- A) imagjinare
- B) fetare
- C) somatike
- D) nihiliste

Infermieri Pyetje: 529

Në psikozën paranoide mbizotërues është deluzioni:

- A) persekutimit
- B) përndjekjes
- C) madhështisë
- D) xhelozisë

Infermieri Pyetje: 530

Fenomeni i "mutizmit" është tipik për :

- A) Skizofreninë e thjeshtë
- B) Skizofreninë reziduale
- C) Skizofreninë katatonike
- D) Skizofreninë e padiferencuar

Infermieri Pyetje: 531

Vlerësimi infermieror parësor në skizofreni i referohet vlerësimit të:

- A) gjendjes së humorit
- B) potencialit për dhunë
- C) mbështetjes sociale
- D) njohurive

Infermieri Pyetja: 532

Ndërhyrja infermierore në skizofreni fillon me permiresimin e:

- A) procesit të mendimit
- B) e izolimit social
- C) kujdesjeve vetjake
- D) komunikimit verbal

Infermieri Pyetja: 533

Rritja, shkolla, puna , martesë janë shprehje domethënëse për dimensionin:

- A) intelektual
- B) fizik
- C) social
- D) shoqëror

Infermieri Pyetja: 534

Hedhja sistematike që në lindje e një koliri antiseptik ose antibiotik ka për qëllim
prevenimin e konjuktivitit:

- A) Nga adenoviruset
- B) Nga trakoma
- C) Gonokoksik
- D) Pneumokoksik

Infermieri Pyetja: 535

Hedhja e kolireve kortikoide kundraindikohem në:

- A) Edemën korneale
- B) Uveitin anterior
- C) Keratitin epithelial
- D) Kataraktën

Infermieri Pyetje: 536

Cili është kundraindikacioni absolutë i midriatikëve?

- A) Koroiditi
- B) Neuriti optik
- C) Glaucoma me kënd të mbyllur
- D) Keratiti

Infermieri Pyetje: 537

Pilokarpina është një kolir:

- A) Parasimpatikomimetik
- B) Parasimpatolitik
- C) Simpatikomimetik
- D) Simpatikolitik

Infermieri Pyetje: 538

Epinefrina është një kolir:

- A) Parasimpatikomimetik
- B) Parasimpatolitik
- C) Simpatikomimetik
- D) Miotik

Infermieri Pyetje: 539

Cili nga koliret e mëposhtëm nuk e zgjeron pupilën?

- A) Pilokarpina
- B) Kokaina
- C) Adrenalina
- D) Atropine

Infermieri Pyetje: 540

Cili nga propozimet e mëposhtme mbi koliret nuk është i saktë?

- A) Koliret me bazë sulfamidë nuk veprojnë ndaj infeksioneve nga klamidet
- B) Koliret antibiotikë penetrojnë keq në vitroz
- C) Koliret anestezike në doza të përsëritura kanë efekt toksik mbi epitelin e kornesë
- D) Koliret simpatomimetike kanë efekt midriatik

Infermieri Pyetje: 541

Çfarë duhet survejuar në rastet e përdorimit të zgjatuar të kolireve kortikoide?

- A) Tensioni ocular

- B) Këndi irido-korneal
- C) Sensibiliteti korneal
- D) Endoteli i kornesë

Infermieri Pyetje: 542

Cili nga koliret e mëposhtëm nuk duhet përdorur në rastet me iridociklit?

- A) Midriatikët
- B) Miotikët
- C) Antibiotikët lokalë
- D) Kortikoidët lokalë

Infermieri Pyetje: 543

Cili nga propozimet e mëposhtme ka kundërindikacion absolut përdorimin e kolireve parasimpatikolitike?

- A) Trajtimi i uveitit anterior
- B) Ekzaminimi i fundus okulit
- C) Trajtimi i glaukomës
- D) Riedukimi i ambliopisë

Infermieri Pyetje: 544

Cili nga propozimet e mëposhtme lidhur me kolirët nuk është i saktë?

- A) Penicilina përdoret pak në kolir sepse jep alergji
- B) Kloramfenikoli ka difuzion corneal
- C) Neomicina ka një spektër të ngushtë veprimi
- D) Aminoizidet përdoren kundër mikroorganizmave gram-negativë



Infermieri Pyetja: 545

Koliret midriatike indikohen në rastet me:

- A) Sklerit
- B) Iridociklit
- C) Glaukomë kronike me kënd të hapur
- D) Glaukomë me kënd të mbyllur

Infermieri Pyetja: 546

Cilët nga kolirët e mëposhtëm japin hipertoni okulare?

- A) Midriatikët
- B) Miotikët
- C) Antiseptikët
- D) Antibiotikët

Infermieri Pyetja: 547

Cili nga koliret e mëposhtëm favorizon rrjedhjen e lëngut uxor jashtë syrit:

- A) Pilocarpina
- B) Timololi
- C) Atropine
- D) Neosinefrina

Infermieri Pyetja: 548

Cili nga koliret e mëposhtëm redukton sekrecionin e lëngut uxor?

- A) Betablokuesit
- B) Kortikoidet
- C) Acetazolamidi
- D) Kolinergjikët

Infermieri Pyetje: 549

Cili nga propozimet e mëposhtme nuk shkakton katarakt?

- A) Hipokalçemia
- B) Diabeti
- C) Marrja e kortikoidëve
- D) Marrja e indometacinës

Infermieri Pyetje: 550

Cilët janë argumentët në favor të konjuktivitit?

- A) Cefalea e fortë
- B) Kornea transparente
- C) Ulja e pamjes
- D) Prekja unilaterale

Infermieri Pyetje: 551

Në cilin nga lezionet e mëposhtme nuk duhet të kërkohet prezenca e një trupi të huaj intra okular?

- A) Plagë e kornesë
- B) Opacitet i kristalinit
- C) Hemoragji sub-konjuktivale
- D) Zbardhje e papilës

Infermieri Pyetje: 552

Cili nga propozimet që i përkasin glaukomës me kënd të mbyllur nuk është i saktë?

- A) Trajtimi medical mbështetet në përdorimin e hipotonikëve me rrugë të përgjithshme
- B) Miotikët janë të kundraindikuar
- C) Trajtimi kirurgjikal sekondar është i nevojshëm
- D) Kriza e glaukomës akute përfaqëson mbylljen jo komplete të këndit irido-korneal

Infermieri Pyetje: 553

Për të kontrolluar rritjen e bakterieve në mungesë të infeksionit në pacientët me ulçerë dekubituese rekomandohen:

- A) Antibakterial lokalë
- B) Antiinflamatorë
- C) Analgjezikë
- D) Antimykotikë

Infermieri Pyetje: 554

Një dëmtim të aftësive të pacientit me ulçerë dekubituese për të rezistuar ndaj infeksionit e tregon:

- A) Një edemë e thellë subkutane
- B) Një prurit i rëndë
- C) Një sasi e shtuar eksudati dhe një shkatërrim progresiv i indeve
- D) Rritja e temperaturës së lëkurës

Infermieri Pyetje: 555

Cila prej shkaqeve të mëposhtme bën pjesë në shkaqet e brendshme të sëmundjeve të lëkurës:

- A) mykotike
- B) parazitare
- C) gjenetike
- D) kimike

Infermieri Pyetje: 556

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt antiseptik:

- A) acicloviri
- B) sol. Gencian violet
- C) sol. Benzilbenzoat
- D) hidrokortizoni

Infermieri Pyetje: 557

Shfaqja e lezioneve në Herpes Zoster ngjan me Herpesin Simplex, por veçoria kryesore është:

- A) Shfaqja e lezioneve vizaton trajektoren e nervave sensitive
- B) Shfaqja e papulave të rastësishme
- C) Telengioektazitë dhe pigmentimi
- D) Shfaqja e papulave me mure të forta rrethore

Infermieri Pyetje: 558

Shfaqja më e shpeshtë klinike e HSV-1 (Herpes Simplex Virus 1) është:

- A) Papula me mure të forta rrethore
- B) Telengioektazi dhe pigmentim
- C) Një grup me vezikula mbi një bazë eritematoze
- D) Makula të vogla me kruste të verdha të forta

Infermieri Pyetje: 559

Incidenca në patologjinë e Psoriasis zakonisht më e ulur është në:

- A) Racat e bardha
- B) Racat e zeza
- C) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të lartë të rruazave të kuqe të gjakut
- D) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të ulët të rruazave të kuqe të gjakut

Infermieri Pyetje: 560

Funksionin e saj sekretor, lëkura e realizon nëpërmjet :

- A) poreve të lëkurës
- B) hapësirave ndërçelimore
- C) folikujve të flokut
- D) gjendrave të yndyrës dhe djersës

Infermieri Pyetje: 561

Funksionin sensitiv i lëkurës e realizon nëpërmjet:

- A) pH të saj acid
- B) mbaresave nervore
- C) proceseve të shumta metabolike
- D) shtresës së shndritshme

Infermieri Pyetje: 562

Krusta është element morfologjik dytësor që formohet nga :

- A) disa qeliza të brirëzuara të shtresës korneale
- B) tharja e sekrecioneve të vezikulave, erozioneve apo ulçerave
- C) traumatizimi i lëkurës me anë të thonjve
- D) hollimi i sipërfaqes së të gjitha shtresave të lëkurës

Infermieri Pyetje: 563

Përdorimi i acidit salicilik, për cilën nga patologjitë e mëposhtme është karakteristike:

- A) Psoriazis vulgaris
- B) Variçela
- C) Erizipela
- D) Skabies

Infermieri Pyetje: 564

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt keratolitik:

- A) permanganati i kaliumit
- B) pomada me gentamicinë
- C) acidi salicilik
- D) kortizonikët lokalë

Infermieri Pyetje: 565

Adipocitet janë qeliza të pranishme në :

- A) epidermë
- B) shtresën bazale të lëkurës
- C) shtresën papilare të dermës
- D) hipodermë

Infermieri Pyetje: 566

Cilën nga funksionet e mëposhtme kryen melaninia:

- A) merr pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare
- B) mbron lëkurën nga veprimi i rrezeve ultraviolette
- C) siguron funksionin mbrojtës kimik
- D) siguron mbajtjen konstante të temperaturës

Infermieri Pyetje: 567

Cila nga karakteristikat e mëposhtme i përket shtresës korneale:

- A) është shtresa e parë e epidermës duke u nisur nga brendësia në sipërfaqe
- B) përbëhet nga qeliza të mëdha me bërthamë
- C) merr pjesë në rigjenerimin e shtresave të sipërme të epidermës
- D) përbëhet nga qeliza të vdekura pa bërthamë

Infermieri Pyetje: 568

Në pacientët me Urtikarie, reaksioni i lëkurës është shoqëruar me një çlirim të histaminës, medikamentet e zgjedhura janë:

- A) Antibiotikët
- B) Antimykotikët
- C) Antihistaminikët
- D) Antiviralët

Infermieri Pyetje: 569

Cilat nga qelizat e mëposhtme marrin pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare të organizmit:

- A) qelizat e Masonit
- B) melanocitet
- C) qelizat e Langerhansit
- D) adipocitet

Infermieri Pyetje: 570

Infeksionet bakteriale lokale zakonisht mjekohen me:

- A) Antiviral
- B) Antibiotikë topikal
- C) Nizoral
- D) Antihistaminikë

Infermieri Pyetje: 571

Cilat janë komplikacionet që takohen tek pacienti pas demtimit të sistemit nervor qendror?

- A) Paraliza
- B) Dhimbje kyçesh
- C) Dhimbje muskujsh
- D) Temperaturë e lartë

Infermieri Pyetje: 572

Sa % e foshnjave të lindura nga nëna me Miaseni gravis shfaqin simptoma të sëmundjes?

- A) 44% e foshnjave
- B) 34% e foshnjave
- C) 24% e foshnjave
- D) 14% e foshnjave

Infermieri Pyetje: 573

Parkinsoni prek më shpesh grup-moshat:

- A) 50-55 vjeç
- B) 60-65 vjeç
- C) 70-75 vjeç
- D) 80-85 vjeç

Infermieri Pyetje: 574

Zona Wernicke, e lokalizuar midis zonave paresore të degjimit dhe shikimit është shumë e rëndësishme për:

- A) Interpretimin e gjuhës
- B) Përgjegjësi për gjenerimin e modeleve levizore
- C) Termoregulacionin
- D) Shikimin

Infermieri Pyetje: 575

Demtmet konjitive tek pacienti me skleroze multiple hasen në:

- A) Fazën e hershme të sëmundjes
- B) Fazën e mëvonshme
- C) Nuk takohen të tilla demtime
- D) Janë simptoma paralajmëruese

Infermieri Pyetje: 576

Vëzhgimi dhe vlerësimi neurologjik i pacientit me epilepsi, nga ana e infermierit, janë faktorë të rëndësishëm sepse:

- A) Përcaktojnë tipin e krizës epileptike
- B) Përcaktojnë llojin e medikamentoz të trajtimit
- C) Vendosin diagnozën përfundimtare
- D) Nuk janë pjesë e kujdesit

Infermieri Pyetje: 577

Termi hiperemi aktive i referohet ngjyrës së lëkurës:

- A) pas djegies së saj
- B) normale
- C) pas mjekimit
- D) pas një traume

Infermieri Pyetje: 578

Hypotermia aksidentale është një gjendje ku personi ekspozohet:

- A) në temperatura shumë të ulta
- B) në temperatura të ulta
- C) në situata aksidentale
- D) në temperatura të larta

Infermieri Pyetje: 579

Hypotermia urbane është :

- A) ekspozimi ekstrem ndaj të ftohtit në mjedise urbane
- B) ulja e temperaturës trupore nga kontakti me ujë të ftohtë
- C) ulja e temperaturës trupore nga patologji të ndryshme
- D) ulja e temperaturës trupore nga të ftohtit

Infermieri Pyetje: 580

Hemoragjia, quhet e ndërmjetme kur shfaqet :

- A) gjatë operacionit
- B) pak orë pas operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtme

Infermieri Pyetje: 581

Hemoragjia, quhet primare kur shfaqet:

- A) pak orë pas operacionit
- B) gjatë operacionit
- C) pak ditë pas operacionit
- D) pas një traume të jashtëme

Infermieri Pyetje: 582

Ndihma e parë në raste hemoragjike është:

- A) vendosja shtrirë e pacientit
- B) vendosja e bandazhit
- C) vendosja e akullit
- D) terapi medikamentoze

Infermieri Pyetje: 583

Donatori lejohet të japë gjak pasi të kenë kaluar të paktën:

- A) 45 ditë nga dhurimi i fundit
- B) 56 ditë nga dhurimi i fundit
- C) 65 ditë nga dhurimi i fundit
- D) 75 ditë nga dhurimi i fundit

Infermieri Pyetje: 584

Sasia e gjakut që dhurohet është të paktën :

- A) 350ml
- B) 450 ml
- C) 550ml
- D) 650ml

Infermieri Pyetje: 585

Pesha minimale trupore për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 40 kg
- B) 50 kg
- C) 60 kg
- D) 70 kg

Infermieri Pyetje: 586

Mosha minimale për një donator gjaku është:

- A) 15 vjeç
- B) 17 vjeç
- C) 20 vjeç
- D) 25 vjeç

Infermieri Pyetje: 587

Mosha maksimale për një donator gjaku duhet të jetë:

- A) 45 vjeç
- B) 55 vjeç
- C) 65 vjeç
- D) 75 vjeç

Infermieri Pyetje: 588

Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët pas operacionit është :

- A) pozicioni semi - Fowler
- B) pozicioni Fowler
- C) tredelenburg
- D) gjinekologjik

Infermieri Pyetje: 589

Mjeku Reanimator është anëtar në grupin:

- A) steril
- B) jo steril
- C) vezhgues
- D) qarkullues

Infermieri Pyetje: 590

Numërimi i veglave kirurgjikale para dhe pas operacionit kryhet nga:

- A) infermiera qarkulluese
- B) infermiera instrumentare
- C) mjeku kirurg
- D) mjeku anestezi

Infermieri Pyetje: 591

Me termin asepsi nënkuptojmë:

- A) Eliminim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar
- B) Kufizim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar
- C) Pastrim
- D) Dezinfektim

Infermieri Pyetje: 592

Asepsia kirurgjikale përfshin të gjitha si më poshtë përveç:

- A) Përdorimin e dorezave sterile gjatë vendosjes së kateterit urinar
- B) Përdorimin e pajisjeve sterile në ndryshimin e garzave të plagës
- C) Larjen e duarve para dhe pas kryerjes së manipulimeve
- D) Sterilizimin e instrumentave kirurgjikal

Infermieri Pyetje: 593

Asepsia mjekësore përfshin :

- A) Larjen e duarve para dhe pas servirjes së ushqimit
- B) Larjen e duarve pas zbrazjes së uturakut
- C) Përdorimin e dorezave sterile gjatë mjekimit të plagës
- D) Larjen e duarve para, pas servirjes së ushqimit dhe pas zbrazjes së uturakut

Infermieri Pyetje: 594

Flebotomia konsiston në :

- A) venipunkturën dhe thithjen e gjakut
- B) dëmtimin e enës së gjakut
- C) venipunkturën dhe dhënien e gjakut
- D) aplikimin e infuzioneve

Infermieri Pyetje: 595

Vlerësimet fizike të pacientit në periudhën preoperative përfshijnë të gjitha si më poshtë, përveç :

- A) Vlerësimin e bilancit hidrik dhe elektrolytik
- B) Vlerësimin e statusit ushqimor
- C) Vlerësimin e funksionit kardiovaskular
- D) Vlerësimin e ankthit

Infermieri Pyetje: 596

Bën pjesë në anëtarët e grupit steril :

- A) Kirurgu
- B) Anestezisti
- C) Infermiera qarkulluese
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetja: 597

Administrimi i opiateve para operacionit ndihmon :

- A) në paksimin e sekrecioneve
- B) uljen e tonusit muskular
- C) reduktimin e ankthit dhe stresit
- D) tharjen e mukozave

Infermieri Pyetja: 598

Administrimi i antikolinergjikëve para operacionit ndikon në :

- A) në pakësimin e sekrecioneve
- B) reduktimin e ankthit dhe stresit
- C) uljen e tonusit muskular
- D) tharjen e mukozave

Infermieri Pyetja: 599

Asepsitë kirurgjikale janë aktivitete që :

- A) minimizojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- B) eliminojnë numrin dhe përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- C) pakësojnë numrin e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar
- D) pakësojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar

Infermieri Pyetja: 600

Asepsia është procedura që bën të mundur:

- A) eliminimin e të gjithë mikroorganizmave
- B) eliminimin e shumicës së mikroorganizmave
- C) pakësimin e të gjithë mikroorganizmave
- D) pakësimin e shumicës së mikroorganizmave

Infermieri Pyetje: 601

Anëtarë të grupit jo steril janë të gjithë si më poshtë përveç:

- A) Anestezisti
- B) Infermiera qarkulluese
- C) Ndihmës kirurgu
- D) Teknikët radiolog

Infermieri Pyetje: 602

Praktikat që ulin dhe pengojnë proceset e infeksionit në pacientët post– kirurgjikal quhen:

- A) Teknika Dezinfektuese
- B) Teknika Dekontaminuese
- C) Teknika Kontrolli
- D) Teknika Aseptike

Infermieri Pyetje: 603

Pacientët e pranuar në Njësinë e Kujdesit Post – Anestezik pa refleksin faringeal duhet të vendosen në pozicion:

- A) Dorsal
- B) Lateral
- C) Fowler
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 604

Infermieri duhet të njohë shenjat dhe simptomat e pengesës respiratore tek pacienti në periudhën post operatore, këto shenja përfshijnë:

- A) përdorimi i muskujve ndihmës gjatë frymëmarrjes
- B) hipotension arterial
- C) dhimbje kraharori
- D) asnjëra

Infermieri Pyetja: 605

Përdorimi i klizmës pastruese është i detyrueshëm të aplikohet :

- A) para të gjitha llojeve të operacioneve
- B) para operacioneve që përfshijnë traktin gastro - intestinal
- C) para operacioneve që përfshijnë traktin uro -genital
- D) para asnjë lloj operacioni pasi nuk rekomandohet më

Infermieri Pyetja: 606

Infermiera qarkulluese është pjesë e:

- A) grupit steril
- B) grupit josteril
- C) grupit vëzhgues
- D) nuk është antare e bllokut operator

Infermieri Pyetja: 607

Ruajtja e sigurisë dhe integritetit të fushës sterile gjatë procedurës kirurgjikale është detyrë e :

- A) kirurgut primar
- B) anestezistit
- C) infermieres qarkulluese
- D) infermieres instrumentare

Infermieri Pyetja: 608

Në rast se pas operacionit kanë kaluar më shumë se 12 – 18 orë dhe pacienti nuk ka urinuar, ndërhyrje primare është :

- A) vendosja e kateterit urinar
- B) nxitja e pacientit për të urinuar vetë nëpërmjet përdorimit të borsave të ngrohta
- C) vendosja e kateterit supra pubik
- D) asnjëra

Infermieri Pyetja: 609

Hipotensioni arterial në periudhën post –operatore mund të shkaktohet nga:

- A) Acidoza
- B) Hipokseミア
- C) Disritmia
- D) Humbja e gjakut dhe e lëngjeve

Infermieri Pyetja: 610

Cila nga alternativat e mëposhtme tregon për një procedurë diagnostikuese?

- A) kolostomia
- B) ileostomia
- C) kolonoskopia
- D) jejunostomia

Infermieri Pyetja: 611

Djegjet kimike të lëkurës cilat rezultojnë nga lëndë korrozive duhet:

- A) Të shpëlahen menjëherë me ujë të rrjedhshëm për 15 – 20 min
- B) Të aplikohet pomadë
- C) Të aplikohet balsame
- D) Të fashohet menjëherë

Infermieri Pyetja: 612

Pas operacioneve gastrike pacienti këshillohet të qëndroj në pozicionin:

- A) Fowler
- B) Semi- Fowler
- C) Tredelenburg
- D) Gjinekologjik

Infermieri Pyetja: 613

Infermiera qarkulluese ka pergjegjesi per te gjitha sa me poshte pervec :

- A) A Kryerjen e veprimeve jashte fushes sterile
- B) Te siguroj kujdes infermieror per pacientin
- C) Te siguroj mbeshtetje emocionale per pacientin
- D) Te numeroje instrumentet dhe paisjet e perdorura ne operacion

Infermieri Pyetja: 614

Eshte procedure diagnostikuese :

- A) qarkullimi ekstrakorporal
- B) koronarografia
- C) stenti
- D) koronaroskopia

Infermieri Pyetja: 615

Qarkullimi ekstrakorporal haset ne:

- A) Kardiokirurgji
- B) Neurokirurgji
- C) Kirurgji abdominale
- D) Kirurgji estetike

Infermieri Pyetja: 616

Hematemeza eshte :

- A) Prania e gjakut ne te vjella
- B) Prania e gjakut ne fece
- C) Rrjedhja e gjakut nga hundet
- D) Asnjera

Infermieri Pyetje: 617

Dhënia e ushqimeve dhe e lëngjeve nga goja tek pacientët post – operator fillon:

- A) Në momentin e rifillimit të peristaltikës dhe zhurmës aktive intestinale
- B) Në momentin e rifillimit të diurezës
- C) Në momentin e stabilizimit të presionit arterial
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 618

Çrregullimi i bilancit hidro-elektrolitik tek pacientët e djegur mund të vijë si pasojë e:

- A) Humbjes të një sasive të madhe plazme
- B) Humbjes të një sasive të madhe gjaku
- C) Diurezës së shtuar
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 619

Plagët nga dekubituset janë plagë që shkaktohen nga:

- A) traumat e hapura
- B) armët e zjarrit
- C) aksidentet automobilistike
- D) qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë

Infermieri Pyetje: 620

Faktorët që ndikojnë për formimin e dekubituesëve janë të gjitha përveç:

- A) kequshqyerja
- B) higjiena e ulët
- C) gjendja emocionale
- D) qëndrimi gjatë në shtrat

Infermieri Pyetje: 621

Në një retension urinar përdoret kateteri:

- A) Robinson
- B) Nichols
- C) Foley
- D) Moby- Dick

Infermieri Pyetje: 622

Gastrostomia është procedure që ushqen pacientin nga:

- A) ezofagu
- B) stomaku
- C) jejunum
- D) kolon

Infermieri Pyetje: 623

Ndërrimi i pensamentëve të plagës operative bëhet:

- A) 10 - 15 orë pas operacionit
- B) 16 - 24 orë pas operacionit
- C) 36 - 48 orë pas operacionit
- D) 52 - 72 orë pas operacionit

Infermieri Pyetje: 624

Trajtimi fillestar i plagës bëhet me:

- A) antibiotik
- B) kortizonik
- C) sol. fiziologjik
- D) betadinë

Infermieri Pyetja: 625

Litotripsia është thyerja e gurëve në:

- A) vezikën urinare
- B) veshka
- C) uretër
- D) kolecist

Infermieri Pyetja: 626

Një plagë quhet e papastër kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka supuracion

Infermieri Pyetja: 627

Një plagë quhet e kontaminuar kur:

- A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale
- B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues
- C) që nuk kanë shenja të pezmatimit
- D) nëse ka supuracion

Infermieri Pyetja: 628

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

Infermieri Pyetje: 629

Irrigimi i plagës nënkupton:

- A) suturimi i plagës
- B) trajtimi me antibiotik
- C) lavazhi i plagës
- D) fashimi i plagës

Infermieri Pyetje: 630

Qëllimi primar në trajtimin e ulçerës stazike venoze të këmbës është:

- A) Pastrimi i plagës me alkool
- B) Përdorimi i lidokainës lokale
- C) Sigurimi i shërimit të plagës dhe parandalimi i infeksionit
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 631

Gjatë djegies pacienti ka humbje më të theksuar të :

- A) plazmës
- B) gjakut
- C) urinës
- D) djersës

Infermieri Pyetje: 632

Ku përdoret rregulli i 9-ës?

- A) Në politrauma
- B) Në ngrirjet trupore
- C) Në djegiet trupore
- D) Plagët me armë zjarri

Infermieri Pyetje: 633

Ileusi adinamik zakonisht ndodh:

- A) 1 ditë pas operacionit
- B) 2 - 3 ditë pas operacionit
- C) 4 - 6 ditë pas operacionit
- D) 6 - 8 ditë pas operacionit

Infermieri Pyetje: 634

Mamografia është e këshillueshme të bëhet çdo vit për gra:

- A) 20 vjeç
- B) 30 vjeç
- C) 40 vjeç
- D) mbi 50 vjeç

Infermieri Pyetje: 635

Ekstravazacioni është komplikacion pas:

- A) kirurgjisë
- B) kimioterapisë
- C) radioterapisë
- D) radiografisë

Infermieri Pyetje: 636

Traumata e rënda të heparit mund të shkaktojnë:

- A) Insuficiencë renale
- B) Shok hipovolemik si pasojë e hemoragjisë
- C) Hipertension arterial
- D) Leukopeni

Infermieri Pyetje: 637

Në tumoret metastatike të heparit dallohet:

- A) Angiografi negative
- B) Zvogëlim të heparit
- C) Ascit (me nuancë gjaku)
- D) Hiperproteinemi

Infermieri Pyetje: 638

Në kancerin e gjirit nuk ndikojnë:

- A) Historia familjare me këtë diagnozë
- B) Terapia me hormone
- C) Numri i pakët i lindjeve
- D) Ulja e konsumit të yndyrnave shtazore dhe proteinave

Infermieri Pyetje: 639

Për kancerin e gjirit nuk përfshihen këto diagnoza infermierore:

- A) Ndryshime në jetën seksuale
- B) Pamundësi për infeksion
- C) Dëmtim i integritetit të lëkurës
- D) Frikë dhe ankth, lidhur me prognozën e sëmundjes

Infermieri Pyetje: 640

Në pacientët me kancer gastrik:

- A) Hemoragjia është e theksuar
- B) Në raste të rralla ndodh hemoragjia për këtë diagnozë
- C) Ikteri paraqitet në stadin e parë të sëmundjes
- D) Prognoza nuk është shumë e varfër

Infermieri Pyetje: 641

Gjatë realizimit të një transfuzioni gjaku, në 15–30 minutat e para infermieri observon pacientin për :

- A) Shenja reaksioni
- B) Shenja infeksioni
- C) Hipertension
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 642

Edukimi i një pacienti me urolitiazë në lidhje me sigurimin e një hidratimi optimal, ka si qëllim kryesor:

- A) Parandalimin e recidivave
- B) Rehidrimin e pacientit
- C) Parandalimin e komplikacioneve
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 643

Në karcinomën hepatoqelizore, testet diagnostike shpesh zbulojnë:

- A) Nivele të larta të leukociteve
- B) Nivele të larta të trombociteve
- C) Nivele të larta të AFP (alfafetoproteinës)
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetje: 644

Në rastin e gastrektomisë më e rëndësishme është të administrohet:

- A) Vitaminë E
- B) Vitaminë B12
- C) Ushqime me frekuencë të lartë
- D) Ushqime me rrugë orale

Infermieri Pyetje: 645

Ileostomia - Qëllimi i interventeve infermierore nuk përfshin:

- A) Sigurimin e eliminimit normal intestinal
- B) Reduktimin e dhimbjeve dhe spazmave abdominale
- C) Përshkrimin e medikamenteve analgjezike
- D) Reduktimin e ankthit dhe stresit

Infermieri Pyetje: 646

Në prekjen e heparit nga metastazat nuk ndikojnë:

- A) Vaskularizimi i theksuar i heparit
- B) Pozicioni i tij anatomik
- C) Niveli i koshiencës
- D) Tumoret nga trakti gastrointestinal

Infermieri Pyetje: 647

Ileusi adinamik:

- A) Ka një prognozë të varfër
- B) Në përgjithësi ka prognozë të mirë
- C) Trajtimi është gjithmonë kirurgjikal
- D) Është shkaku më i rrallë i obstruksionit intestinal

Infermieri Pyetje: 648

Për të parandaluar ulçerën stazike venoze duhet të:

- A) Ndërpritet aktiviteti fizik
- B) Ekspozohet zona e prekur në temperatura të ftohta
- C) Pozicionohen ekstremitetet më poshtë se niveli i zemrës
- D) Të kontrollohen pulset periferike dhe temperatura e ekstremiteteve

Infermieri Pyetje: 649

Faktor që nuk ndikon në kalkulozën e aparatit urinar është:

- A) Staza urinare
- B) Infeksioni i traktit urinar
- C) Staza venoze
- D) Dehidrimi

Infermieri Pyetje: 650

Për të mbajtur bilancin elektrolitik, nuk është vlerësim specifik:

- A) Niveli i elektroliteve
- B) Marrjet dhe nxjerrjet e likideve
- C) Turgori i lëkurës
- D) Niveli i gazeve në gjak

Infermieri Pyetje: 651

Pacienti me gastrostomi, nuk ka prezencë infeksioni nëse:

- A) Lëkura është e skuqur përreth inçizionit
- B) Është afebril
- C) Ka drenim nga plaga
- D) Leukocitozë

Infermieri Pyetje: 652

Interventet infermierore për pacientin me ileostomi nuk kanë për qëllim:

- A) Reduktimin e dhimbjes
- B) Pakësimin gradual të marrjeve orale
- C) Mbajtjen e bilancit elektrolitik dhe peshës trupore
- D) Sigurimin e eliminimit intestinal

Infermieri Pyetja: 653

Menaxhimi infermior, para kirurgjisë kardiake përfshin:

- A) Vetëm vlerësim të hollësishëm të sistemit kardiak
- B) Vlerësimin e sistemit respirator
- C) Vlerësim të detajuar sistemik
- D) Ndërprerjen e terapisë medikamentoze të mëparshme

Infermieri Pyetja: 654

Stafi infermior instruktton pacientët me patologji të sistemit biliar të:

- A) Shtojnë sasinë e ynyrnave
- B) Të pakësojnë kaloritë dhe yndyrnat në dietën ushqimore
- C) Të shtojnë peshën trupore
- D) Mbajnë regjim absolut pushimi

Infermieri Pyetja: 655

Nuk është prioritet i menaxhimit infermior për pacientët me gastrostomi:

- A) Mbajtja e statusit nutricional
- B) Mbrojtja integritetit të lëkurës
- C) Përshtatja me ndryshimet në imazhin trupor
- D) Përcaktimi i dietës ushqimore specifike për këta pacientë

Infermieri Pyetja: 656

Perfuzioni indor për pacientët me patologji kardiake vlerësohet me të gjitha metodat e mëposhtme përveç njëjës:

- A) Monitorimit të EKG
- B) Matjes së presionit arterial dhe nivelit të gazeve në gjak
- C) Eleminimit urinar
- D) Reagimit nga medikamentet analgjezike

Infermieri Pyetje: 657

Menaxhimi i pacientëve me obstrukcion të zorrës së trashë bëhet me:

- A) Trajtim operator kur bllokimi është i pjesshëm
- B) Intervent kirurgjikal vetëm kur bllokimi është i plotë
- C) Radiografi me barium
- D) Trajtim jo kirurgjikal në rastin e perforimit intestinal

Infermieri Pyetje: 658

Komplikacioni më i shpeshtë për pacientët me ileostomi është:

- A) Kalkuloza urinare
- B) Stenoza stomale
- C) Irritimi i lëkurës peristomale
- D) Cholelithiasis

Infermieri Pyetje: 659

Limadeniti është:

- A) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike
- B) infeksion akut nekrotik
- C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës
- D) infeksion akut purulent

Infermieri Pyetje: 660

Ulçera diabetike karakterizohet nga:

- A) Dhimbje shumë të fortë
- B) Dhimbje të moderuar
- C) Dhimbje të lehtë ose mungesë të saj
- D) Mungesa e recidivimit

Infermieri Pyetje: 661

Në diagnozat infermierore në rastin e ileostomisë nuk përfshihet:

- A) Alternime në komfort
- B) Spazma abdominale
- C) Imbalancë lëngjesh dhe elektrolitësh
- D) Stabilitet në eliminimin intestinal

Infermieri Pyetje: 662

Shoku septik fillon me të gjitha shenjat e mëposhtme përveç:

- A) ethe
- B) stres
- C) temperaturë të lartë
- D) hypotension

Infermieri Pyetje: 663

Karbunkuli është:

- A) inflamacion akut nekrotik purulent
- B) infeksion akut-purulent
- C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës
- D) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike

Infermieri Pyetje: 664

Organizmi shkaktar për gjendjen e sepsit të rëndë nuk mund të jetë:

- A) Escherichia coli
- B) klebsiella
- C) stafilococcus aureus
- D) virusi

Infermieri Pyetje: 665

Sa duhet të jetë diureza që të themi se funksioni renal vjen duke u përmirësuar?

- A) 20 ml/ore
- B) 25 ml/ore
- C) 30 ml/ore
- D) 40 ml/ore

Infermieri Pyetje: 666

Efektin e vet dëmtues virusi i SIDA-s e ka mbi limfocitet:

- A) A
- B) C
- C) T
- D) E

Infermieri Pyetje: 667

Cili është streptokoku më i hasur tek njerëzit:

- A) hemolitik i grupit E
- B) hemolitik i grupit C
- C) hemolitik i grupit D
- D) hemolitik i grupit A

Infermieri Pyetje: 668

Mononukleoza Infektive shkaktohet nga :

- A) neisseria gonorea
- B) clostridium botulinum
- C) virusi Epstein-Barr
- D) Plasmodium

Infermieri Pyetje: 669

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor mekanik vjen nga:

- A) mizat
- B) mushkonjat
- C) karkalecat
- D) gjinkallat

Infermieri Pyetje: 670

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga:

- A) mizat
- B) mushkonjat
- C) karkalecat
- D) gjinkallat

Infermieri Pyetje: 671

Tipar i përbashkët i gjithë infeksioneve kirurgjikale është:

- A) nekroza
- B) fistula
- C) hemorragjia
- D) hipotermia

Infermieri Pyetje: 672

Shkalla e prevalencës është raporti :

- A) nr total i të sëmurëve me sëmundje infektive / nr. i pacientëve në total
- B) nr. i pacientëve në total / nr.total i të sëmurëve me sëmundje infektive
- C) nr. i pacientëve në spital në krahasim me popullatën
- D) nr. i pacientëve në infektiv / me nr. e pacientëve në spital

Infermieri Pyetje: 673

Incidenca e infeksionit për plagët operatore të pastra duhet të jetë:

- A) nën 5%
- B) nën 7 %
- C) nën 10 %
- D) nën 15 %

Infermieri Pyetje: 674

Nuk bën pjesë në plagët e mbyllura:

- A) Kontuzioni
- B) Hematomat
- C) Sindromi Crush
- D) Plagët incizionale

Infermieri Pyetje: 675

Nuk bën pjesë në manifestimet klinike të Kontuzionit:

- A) Hematoma
- B) Fraktura
- C) Hemorragjia
- D) Nauze/të vjella

Infermieri Pyetje: 676

Shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve spitalore është :

- A) E. Coli
- B) Candidas
- C) Spiroketa
- D) Streptokoku

Infermieri Pyetje: 677

Periudha e inkubacionit të mononukleozës infektive varion :

- A) 10- 20 ditë
- B) 20- 30 ditë
- C) 30- 50 ditë
- D) 40- 60 ditë

Infermieri Pyetje: 678

Triada ethe - dhimbje fyti- zmadhim i nodjve limfatik cervikal është karakteristik e:

- A) tetanozit
- B) meningokoksisë
- C) mononukleozës infektive
- D) stafilokoksisë

Infermieri Pyetje: 679

Forma më e shpeshtë e salmonelozës është :

- A) ethet tifoide
- B) forma gastrointestinale
- C) bakteremia me ose pa infektion
- D) mbartja asimptomatike

Infermieri Pyetje: 680

Sëmundja e "papastërtisë" mund të quhet

- A) salmoneloza
- B) amebiaza
- C) ethet tifoide
- D) shigeloza

Infermieri Pyetje: 681

Përfshihet në shkaqet e hemorragjisë digjестive të poshtme:

- A) variçet e ezofagut
- B) gastritet
- C) divertikuli i Meckelit
- D) sindromi Mallory-Weiss

Infermieri Pyetje: 682

Infeksionet Nosokomiale ndryshe quhen:

- A) komune
- B) ambientale
- C) spitalore
- D) shtëpiake

Infermieri Pyetje: 683

Është karakteristike për hemorragjinë venoze:

- A) gjaku me ngjyrë të kuqe
- B) gjaku rrjedh me pulsacione
- C) rrjedhje e pandërprerë e gjakut
- D) rrjedhje e ngadalshme e gjakut të errët

Infermieri Pyetje: 684

Nuk bëjnë pjesë në grupin e përhapjes së infeksionëve nga vektorët:

- A) njerëzit
- B) minjtë
- C) mizat
- D) mushkonjat

Infermieri Pyetja: 685

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç:

- A) përkujdesja perioperative
- B) sterilizimi i pajisjeve
- C) gjendja e të sëmurit
- D) statusi emocional i të sëmurit

Infermieri Pyetja: 686

Vaksina profilaktike për hepatitin B aplikohet në:

- A) një dozë
- B) dy doza
- C) tre doza
- D) katër doza

Infermieri Pyetja: 687

Nuk bën pjesë në imobilizimin e jashtëm:

- A) gipsi
- B) qaforia
- C) protezat
- D) traksioni

Infermieri Pyetja: 688

Osteomieliti është:

- A) frakturë e kockës
- B) infeksioni i kockës
- C) distorcion i artikulacionit
- D) rupturë ligamenti

Infermieri Pyetje: 689

Fiksatori ekstern përdoret në :

- A) rupturën e ligamenteve
- B) rupturën e tendinave
- C) frakturë të kockave të shkurtra
- D) frakturë të kockave të gjata

Infermieri Pyetje: 690

Sa kohë mbahet longeta e allçisë në frakturën e kockave të parakrahut?

- A) 2 javë
- B) 3 javë
- C) 6 javë
- D) 8 javë

Infermieri Pyetje: 691

Koha e tharjes së allçisë në ekstremitete është:

- A) rreth 10-12-orë
- B) rreth 12-24 orë
- C) rreth 24-48 orë
- D) rreth 48-72 orë

Infermieri Pyetje: 692

Traksioni pelvik është:

- A) i vazhdueshëm
- B) statik
- C) dinamik
- D) intermitent

Infermieri Pyetje: 693

Vlerësimi i mekanizmave të dëmtimit dhe e forcave kinetike që kanë vepruar mbi pacientin gjatë një incidenti traumatik ose aksidenti quhet:

- A) energji kinetike
- B) kinetika e traumës
- C) procesi i traumës
- D) shpejtësia e goditjes

Infermieri Pyetje: 694

"Ora e artë" ju kujton:

- A) koha në të cilën ndodh një politraum
- B) koha në të cilën transportohet një person i aksidentuar
- C) dhënia e ndihmës brenda 1 ore nga koha e dëmtimit
- D) mbledhja e të dhënave për një person të aksidentuar

Infermieri Pyetje: 695

Një frakturë quhet e stresuar kur:

- A) muskujt mbështjellës nuk e akumulojnë më energjinë e nevojshme
- B) ndodh si pasojë e patologjive të ndryshme
- C) ndodh si pasojë e traumave të jashtëme
- D) ndodh si pasojë e osteomielitit

Infermieri Pyetje: 696

Esenciale kur transportohet një pacient me politraum është:

- A) mbështjellja e pacientit
- B) imobilizimi i kokës dhe i qafës
- C) imobilizimi i ekstremiteteve të sipërme
- D) infuzionimi i pacientit

Infermieri Pyetja: 697

Në cilin lloj të traksionit sasia e peshave që aplikohet është me e vogel:

- A) te lekurës
- B) skeletal
- C) statik
- D) dinamik

Infermieri Pyetja: 698

Fiksatorët ekstern në ekstremitetet e sipërme hiqen pas:

- A) 2 javë
- B) 4 javë
- C) 6 javë
- D) 8 javë

Infermieri Pyetja: 699

Cili është qëllimi kryesor i vlerësimit infermieror preoperator?

- A) Të reduktojë morbiditetin dhe mortalitetin perioperator
- B) Të merren të dhëna për sëmundjen kirurgjikale
- C) Të hartohet një strategji menaxhimi
- D) Të hartohet një plan anestetik

Infermieri Pyetja: 700

Sa orë para duhet të ushqehen neonatët dhe fëmijët para kirurgjisë?

- A) 2 orë para kirurgjisë
- B) 30 minuta para kirurgjisë
- C) 6 orë para kirurgjisë
- D) 4 orë para kirurgjisë

Infermieri Pyetje: 701

Bronkospazma mund të shkaktojë:

- A) Qëndrueshmëri hemodinamike
- B) Hiperventilim postoperator
- C) Insuficiencë renale
- D) Hipoventilim dhe hipoksemi

Infermieri Pyetje: 702

Insuficienca respiratore në kirurgjinë abdominale ndodh nga shkaqet e mëposhtme përveç:

- A) Depresion i qendrës respiratore pas anestezisë
- B) Distensioni abdominal
- C) Dhimbja abdominale
- D) Hemorragji nga plaga

Infermieri Pyetje: 703

Cili është standarti bazë për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone:

- A) vlera e presionit arterial të dioksidit të karbonit
- B) vlera e presionit arterial të oksigjenit
- C) gazanaliza e gjakut arterial
- D) vlera e oksihemoglobinës

Infermieri Pyetje: 704

Vlera e saktë e presionit arterial të oksigjenit është:

- A) 50-70 mmHg
- B) 90-100 mmHg
- C) 100-120 mmHg
- D) 30-40 mmHg

Infermieri Pyetje: 705

Shoku hipovolemik shkaktohet nga humbja e:

- A) më shumë se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut
- B) më pak se 5-10% të masës qarkulluese të gjakut
- C) afërsisht 2-3% të masës qarkulluese të gjakut
- D) 1-5% të masës qarkulluese të gjakut

Infermieri Pyetje: 706

Në shokun hipovolemik kemi:

- A) Hipertension
- B) Lëkurë të zbehtë dhe të ftohtë
- C) Puls i ngadaltë
- D) Diurezë të shtuar

Infermieri Pyetje: 707

Interventet infermirore në rastin e shokut fillojnë me:

- A) Rivendosjen e funksionit kardiak
- B) Reduktimin e ankthit
- C) Përmirësimin e oksigjenimit
- D) Rivendosjen e bilancit elektrolitik

Infermieri Pyetje: 708

Likidet intravenoze zëvendësuese:

- A) Mbajnë volumin në hapësirën vaskulare
- B) Nuk japin asnjëherë reaksione alergjike
- C) Janë trajtues të hipovolemisë
- D) Përfshijnë edhe plazmën e frekët të ngrirë

Infermieri Pyetje: 709

Pas ingestionit të substancave korrozive është i kundërlinduar:

- A) Shplarja me likide menjëherë pas ingestionit
- B) Lavazhi gastrik
- C) Hollimi i substancës korrozive
- D) Sigurimi i rrugëve respiratore

Infermieri Pyetje: 710

Në helmimet ingestive me helme, kur pacienti nuk është koshient së pari aplikojmë:

- A) Lavazhin me sondë orogastrike
- B) Aspirimin gastrik
- C) Vendosja e tubit endotrakeal për të mbrojtur rrugët respiratore
- D) Provokimin e të vjellave

Infermieri Pyetje: 711

Në helmimet me substanca fortësisht acide ose bazike kundërlindohen:

- A) Inserimi i sondës nazogastrike me shumë kujdes
- B) Radiografia
- C) Provokimi i të vjellave
- D) Përdorimi i qumështit në raste të veçanta

Infermieri Pyetje: 712

Veprimi i parë infermior në rastin e reaksionit akut hemolitik është:

- A) Administrimi i kortikosteroideve
- B) Trajtimi i hipotensionit me likide dhe vazopresorë
- C) Dërgimi i një mostre gjaku në bankën e gjakut
- D) Ndërprerja e menjëhershme e transfuzionit

Infermieri Pyetje: 713

Shkalla e ndryshimeve që ndodhin në organizmin e të operuarit nuk varet nga:

- A) përgatitja preoperatorë
- B) gjendja e të sëmurit pas operacionit
- C) lloji i anestezisë
- D) lloji i ndërhyrjes kirurgjikale

Infermieri Pyetje: 714

Dhimbja e patrajtuar shkakton:

- A) Rritjen e kërkesave për oksigjen
- B) Ulje të pulsit
- C) Ulje të presionit arterial
- D) Reduktim të ideve suicidale

Infermieri Pyetje: 715

Në komplikacionet e mëvonshme të operacionit bën pjesë:

- A) infeksioni
- B) ethe reumatizmale
- C) pneumotoraks valvular
- D) skoliozë

Infermieri Pyetje: 716

Vlerat e presionit venoz central janë:

- A) Shumë të ulëta në shokun hipovolemik
- B) Shumë të ulëta në shokun septik
- C) Normale në shokun kardiogjen
- D) Shumë të larta në shokun hemoragjik

Infermieri Pyetje: 717

Shoku është një sindrom i:

- A) Hipertensionit dhe perfuzionit relativisht të lartë indor
- B) Presionit arterial të lartë
- C) Hipotensionit dhe perfuzionit të ulët indor
- D) Rritjes së masës qarkulluese

Infermieri Pyetje: 718

Rastet kur indikohet intubimi endotrakeal:

- A) Ventilim i përshtatshëm
- B) Rrugëve respiratore të lira
- C) Saturimi i oksigjenit është mbi 90%
- D) Insuficienca respiratore me hiperkapni

Infermieri Pyetje: 719

Nuk bën pjesë në instrumentat kirurgjikale:

- A) pincat
- B) bisturia
- C) diverikatorët
- D) defibrilatori

Infermieri Pyetje: 720

Nuk është qëllim i pastrimit të plagës në ulcer:

- A) largimi i fibrinës
- B) largimi i nekrozës
- C) largimi i gjakut
- D) largimi i fistulës

Infermieri Pyetje: 721

Halotani është lëndë anestetike e cila përdoret:

- A) Vetëm tek fëmijët
- B) Vetëm tek të rriturit
- C) Tek fëmijët dhe të rriturit
- D) Duke mos u përzier me oksigjenin

Infermieri Pyetje: 722

Obeziteti nuk favorizon komplikacione postoperatore të tilla si :

- A) Infeksion
- B) Dehishencë të suturave
- C) Obstruksion të rrugëve respiratore
- D) Psikozën postoperatore

Infermieri Pyetje: 723

Ulcerat venoze shfaqen nga:

- A) diabeti
- B) fistulat artero-venoze
- C) infeksionet e lëkurës
- D) pamjaftueshmëria arteriale

Infermieri Pyetje: 724

Obstruksioni respirator nuk manifestohet me:

- A) Cianozë
- B) Apne
- C) Nivele normale të gazeve në gjakun arterial
- D) Përdorim të muskujve aksesori

Infermieri Pyetje: 725

Në rastin e ventilimit jo të përshtatshëm kemi:

- A) Ulje të presionit të dioksidit të karbonit
- B) Ulje të PH të gjakut (acidozë respiratore)
- C) Rritje të PH sistemik
- D) Funkcion të ruajtur të miokardit

Infermieri Pyetje: 726

Stafi infermior për interventin kirurgjikal nuk mund të përcaktojë:

- A) Diagnozën, lidhur me ankthin preoperator
- B) Diagnozën, lidhur me nivelin e dhimbjes
- C) Llojin e anesteziës që do të aplikohet
- D) Komplikacionet potenciale në periudhën postoperative

Infermieri Pyetje: 727

Kateterët ureteral kanë qëllim:

- A) Diagnostik
- B) Parandalues
- C) Terapeutik
- D) Evakuativ

Infermieri Pyetje: 728

Nuk bën pjesë në komplikacionet e menjëhershme pas operacionit:

- A) Hipertension
- B) Hipotension
- C) Hipotermi
- D) Hiperkalcemi

Infermieri Pyetje: 729

Ku bën pjesë metoda kalendarike?

- A) Në kontraktivët oralë
- B) Në metodat natyrale
- C) Në metodat barrjerë
- D) Në metodat kimike

Infermieri Pyetje: 730

Cili është mekanizmi i veprimit të një spermicidi?

- A) Mbajtja e pH acid të vaginës
- B) Mbajtja e pH alkaline të vaginës
- C) Hollimit të mukosit cervikal
- D) Trashje të mukosit cervikal

Infermieri Pyetje: 731

Cila nga simptomat e mëposhtme bën që gruaja të ndërpres menjëherë kontraktivët oral të kombinuar dhe të paraqitet tek mjeku?

- A) Çrregullime të të parit
- B) Perforacion të uterusit
- C) Infeksion
- D) Temperaturë

Infermieri Pyetje: 732

Sekretionet vaginale me erë si të peshkut të prishur është karakteristike për cilin nga këto infeksione:

- A) Herpesin genital
- B) Infeksioni nga gonorea
- C) Infeksioni nga chlamydia
- D) Vaginozën bakteriale

Infermieri Pyetja: 733

Shfaqja e ulçeracionit që në momentin e parë të inokulimit të shkaktarit në organet genitale është karakteristike për infeksion nga:

- A) Trikomoniaza
- B) Gonorrea
- C) Sifilizi
- D) Klamidia

Infermieri Pyetja: 734

Cili nga infeksionet seksualisht të transmetueshme ka mundësi të çojë në kancer të traktit genital?

- A) Human Papiloma Virus
- B) Infeksioni trikomonial
- C) Vaginoza bakteriale
- D) Infeksioni mykotik

Infermieri Pyetja: 735

Dhimbje në kuadratet e poshtme abdominale, temperaturë, gjakrrjedhje vaginale të herë pas herëshme, sekrecione vaginale purulente, nauze, të vjella; kuadri klinik i cilës patologji i referohet:

- A) Sindromit të Shokut Toksik
- B) Sëmundjes Inflamatore Pelvike
- C) Infeksionit trikomonial
- D) Infeksionit herpetik

Infermieri Pyetje: 736

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron të përdorë një metodë kontraktive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja më e përshtatshme e mamisë do të jetë:

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e shtatzanive është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i Sëmundjes Inflammatorë Pelvike është më i madh për ju

Infermieri Pyetje: 737

Cila nga metodat kontraktive të mëposhtme përveç efektit kontraktiv ka ndikim për të parandaluar infeksionet seksualisht të transmetueshme?

- A) Dispozitivi intrauterin
- B) Kontraktivi oral
- C) Sterilizimi kirurgjikal
- D) Spermicidet

Infermieri Pyetje: 738

Perforacioni i uterusit është komplikacioni i cilës metode kontraktive:

- A) Metodave barijere
- B) Sterilizimit kirurgjikal
- C) Kontraktiveve injektueshëm
- D) Dispozitivit intrauterin

Infermieri Pyetje: 739

Karakteristika e sekrecioneve vagjinale në infeksionin mykotik është:

- A) Sekrecione të pakta në sasi por pa erë
- B) Sekrecione të pakta në sasi por me erë
- C) Sekrecione të shumta, të trasha pa erë
- D) Sekrecione të shumta, të trasha me erë

Infermieri Pyetje: 740

Cila nga infeksionet seksualisht të transmetueshme shoqërohet me sëmundjen inflamtoe pelvike, barrën ekstrauterine, infertilitetin?

- A) Gonorea
- B) Kondyloma
- C) Klamidia
- D) Herpesi

Infermieri Pyetje: 741

Mbrojtja abdominale që përfitohet gjatë palpacionit është një e dhënë e rëndësishme që ndodh në:

- A) Sëmundjen Inflamtoe Pelvike
- B) Sindromin e Shokut Toksik
- C) Infeksionin moniliar
- D) Vaginozën bakteriale

Infermieri Pyetje: 742

Nga se shkaktohet infertiliteti?

- A) Përdorimi i tamponëve vaginalë
- B) Sëmundjet seksualisht të transmetueshme
- C) Përdorimi i metodave barijere
- D) Përjetimi i infeksionit mykotik

Infermieri Pyetje: 743

Cila nga metodat kontraktive ka efekt më të gjatë?

- A) Injeksionet Depo-Provera
- B) Kontraktivi i urgjencës
- C) Implantet subdermale
- D) Spermicidet

Infermieri Pyetje: 744

Cili nga infeksionet e mëposhtme nuk ka mjekim specifik por vetëm simptomatik?

- A) Sifilizi
- B) Herpesi Genital
- C) Gonorrea
- D) Klamidia

Infermieri Pyetje: 745

Sëmundja inflamatore pelvike jep infeksionin:

- A) Salpingitis
- B) Otitis
- C) Iritis
- D) Artrit

Infermieri Pyetje: 746

Pilulat kontraceptive të kombinuara veprojnë sipas mekanizmit të mëposhtëm përveç:

- A) nivelet e larta të estrogenit parandalojnë ovulacionin duke inhibuar prodhimin e FSH
- B) progesteroni mban mukusin cervical të trashë dhe bën kështu të vështirë penetrimin e spermës.
- C) progesteroni ndryshon shtresën e uterusit dhe e bën të papërshtatshme implantimin e vezës.
- D) veprojnë lokalisht në uterus

Infermieri Pyetje: 747

Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa pyetje rreth hepatitit, të cilat bëjnë pjesë në:

- A) Anamnezën e kaluar obstetrikale
- B) Anamnezë personale dhe familjare
- C) Historinë mjekësore
- D) Anamnezë gjenetike

Infermieri Pyetja: 748

Pacientet me diabet gestacional zakonisht menaxhohen me:

- A) Dietë
- B) Insulinë me veprim të zgjatur
- C) Hipoglicemiantë oralë
- D) Hipoglicemiantë oralë dhe insulin

Infermieri Pyetja: 749

Cila nga alternativat bën pjesë në anamnezën gjinekologjike?

- A) Histori për dysmenorrhea
- B) Infeksione gjatë periudhes së post partumit
- C) Probleme të post partumit hemoragjik
- D) Rezultatet e testeve të barrës, nëse janë kryer

Infermieri Pyetja: 750

Cila nga alternativat perfshihet në anamnezën obstetrikale?

- A) Cila ka qënë mënyra e lindjes?
- B) Kur ka ndodhur kojtusi i parë?
- C) Kë Metodë kontrceptive ke përdorur?
- D) Sa është numri i partnereve seksual?

Infermieri Pyetja: 751

Konjugata diagonale është distanca midis:

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
- B) Dy tuberoziteteve iskiadike
- C) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit
- D) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike

Infermieri Pyetje: 752

Konjugata e vërtetë është distanca midis :

- A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit
- B) Dy tuberozitetëve iskiadike
- C) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike
- D) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit

Infermieri Pyetje: 753

Pjesa e pelvisit e cila është më shumë e përfshirë me lindjen është:

- A) Koksiksi
- B) Pelvisi falls
- C) Pelvisi i vërtetë
- D) Sakrumi

Infermieri Pyetje: 754

Informacioni i siguruar nga metodat e Leopoldit përfshin:

- A) Paraqitjen fetale
- B) Rritjen dhe zhvillimin fetal
- C) Vlersimin e toneve fetale
- D) Vlersimin e tonusit maternal

Infermieri Pyetje: 755

Metodat e Leopoldit kryesisht janë përdorur për të:

- A) Për të hequr presurën nga kordoni umbilikal
- B) Përcaktuar nëse vezika është e distenduar
- C) Sygjeruar vendin e monitorimit external të kontraksioneve uterine
- D) Vlerësuar prezentacionin dhe zbritjen

Infermieri Pyetje: 756

Frekuenca normale e toneve fetale është:

- A) 90 - 100 rrahje për minut
- B) 180 rrahje për minut
- C) 90 - 140 rrahje për minut
- D) 120 - 160 rrahje për minut

Infermieri Pyetje: 757

Një grua 4 javëshe shtatzanë i kërkon mamisë se kur ajo është në gjendje të dëgjojë RZF- të e fëmijës së saj. Mamia i thotë asaj se me stetoskop ultrasonografik special apo fetoson i cili i amplifikon (i zmadhon) tonet, R.Z.F. mund të dëgjoen afërsisht

- A) 2 - 4 javësh
- B) 6 - 8 javësh
- C) 10 - 12 javësh
- D) 14- 16 javësh

Infermieri Pyetje: 758

Rrahjet e Zemrës Fetale nuk dëgjoen me stetoskop të zakonshëm obstetrikal kur kemi:

- A) Anomali fetale
- B) Moshë barre 28 javë
- C) Shtatzani me më shumë se një fetus
- D) Obezitet amtar

Infermieri Pyetje: 759

Sa shpejt arrin të përcaktojë barrën, ekografia me sondë vaginale?

- A) 6 javë
- B) 4 javë
- C) Afërsisht 10 javë
- D) Pas 10 ditësh

Infermieri Pyetje: 760

Si shenjë pozitive e barrës përfshihet:

- A) Amenorrhea
- B) Lëvizjet fetale që ndihen nga nëna
- C) Rritja abdominale
- D) Sonographya

Infermieri Pyetje: 761

Një shenjë supozuese e shtatzanisë është:

- A) Kontraksionet e Braxton- Hicks
- B) Ndërprerja e menseve
- C) Shenja e Hegarit
- D) Zhurmat uterine

Infermieri Pyetje: 762

Shenja Goodell është:

- A) Diskolorim (cerviksit, mukozës së vaginës & vulvës)
- B) Përkulja e trupit të uterusit mbi cerviks
- C) Zbutja e cerviksit
- D) Zbutja e istmusit

Infermieri Pyetje: 763

Në ekzaminimin fizik, mamia vë re se cervixi i gruas është në ngjyrë të kaltër. Kjo është shënja:

- A) Cheduik
- B) Goodell
- C) e Hegarit
- D) Mc Donald (Lading)

Infermieri Pyetje: 764

Cila nga pikat e mëposhtme nuk bën pjesë në ndryshimet e lëkurës gjatë shtatzanisë?

- A) Kloasoma gravidarum
- B) Linea nigra
- C) Shenja e Hegarit
- D) Striae gravidarum

Infermieri Pyetja: 765

Mamia i shpjegon gruas se gjatë shtatzanisë sëmundja e mëngjesit (nausea & të vjellat) zakonisht takohet në :

- A) Gjashte javët e para
- B) Në 6 j - 12 j
- C) Në 8j - 16j
- D) Në muajin e pare

Infermieri Pyetja: 766

Cila nga pikat e mëposhtme nuk ndikon në lartësinë e fundusit uterin?

- A) Barra binjake
- B) Hydramnioni
- C) Qëndrimi fetal
- D) Tonusi muskular

Infermieri Pyetja: 767

Lëvizjet aktive fetale perceptohen fillimisht në:

- A) Dymbëdhjetë javë
- B) Mes muajit të gjashtë dhe të shtatë
- C) Në muajin e tretë të barrës
- D) Para se të përfundojë muaji i katërt

Infermieri Pyetja: 768

Kujdesi prenatal është ideale të fillojë:

- A) Pas mundesës së tretë të menseve
- B) Pas mungesës së dytë të menseve
- C) Pas mungesës së parë të menseve
- D) Përpara mungesës parë të menseve

Infermieri Pyetje: 769

Në 16 javë niveli i fundusit uterin është:

- A) 1/3 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) 1/2 e vijës që bashkon simfizën pubike me umbilikusin
- C) 2/3 e vijës që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- D) Një gisht nën umbilicus

Infermieri Pyetje: 770

Në 24 javë niveli i fundusit uteri është:

- A) 1/3 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- B) 1/2 e poshtme që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid
- C) 1 - 2 gisht mbi umbilicus
- D) 3 - 4 gisht nën procesin ksifoid

Infermieri Pyetje: 771

Zonja X është 14 javë shtatzanë. Mamia duhet të palpojë fundusin e uterusit në nivelin:

- A) Në nivelin e umbilikusit
- B) Nuk palpohet mbi simfizën pubike
- C) Pak mbi simfizën pubike
- D) Pak mbi umbilikusin

Infermieri Pyetje: 772

Znj është në javën e 23 të shtatzanisë. Ajo është informuar se shenjë alarmi në shtatzani është:

- A) Palpitacioni kardiak
- B) Rritja e oreksit
- C) Ulja e lëvizjeve fetale
- D) Ulja e presionit të gjakut

Infermieri Pyetje: 773

Cila nga simptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problemi potencial, dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit shëndetësor?

- A) Gjakrrjedhje vaginale
- B) Lodhje
- C) Nausea
- D) Shtim i frekuencës urinare

Infermieri Pyetje: 774

Kultura për gonorrhea në shtatzani përfshihet si një nga testet rutinë e cila rekomandohet të bëhet në:

- A) Çdo fillim muaji gjatë shtatzanisë,
- B) Fillim të vizitës së parë prenatale
- C) Përfundim të muajit të fundit të shtatzanisë
- D) Vizitën e parë prenatale dhe përsëritet në 36 javë

Infermieri Pyetje: 775

Ç' ndryshim mund të shkaktojë pozicioni lithotomik, në presionin e gjakut tek gruaja shtatzanë?

- A) Asgjë e veçantë nuk vihet re
- B) E rrit presionin e gjakut
- C) E ulë presionin e gjakut
- D) Rrit dhe ul, varet nga linja bazë e presionit të gjakut

Infermieri Pyetje: 776

Në vizitat e radhës, në shtatzaninë e pakomplikuar zakonisht nuk përfshihet:

- A) Dëgjimi i RZF-ve
- B) Ekzaminimin vaginal
- C) Manovrat e Leopoldit
- D) Matjet e lartësisë së fundusit

Infermieri Pyetja: 777

Okupimi në punë i gruas gjatë shtatzanisë:

- A) Duhet të reduktohet në tremestrin e tretë
- B) Nuk ka probleme në barrën normale
- C) Rrit rrezikun e problemeve në barrë
- D) Ul riskun e problemeve në barrë

Infermieri Pyetja: 778

Mamia instruktin gruan të zbatojë ushtrimet e Kegelit, pasi ato:

- A) Forcojnë dyshemenë pelvike
- B) Ndhmojnë në zbritjen e fetusit
- C) Ndhmojnë në zbutjen e columit
- D) Përshpejtojnë aktin e lindjes

Infermieri Pyetja: 779

Pozicioni që ju i rekomandoni gruas shtatzanë për t'u çlodhur ose fjetur është:

- A) Anash
- B) Gjysëm ndenjtur.
- C) Në shpinë
- D) Permbys

Infermieri Pyetja: 780

Dita e parë e zakoneve të fundit të gruas ka qënë 3 Maj 2011, duke përdorur rregullën e Negelit kësaj gruaje i takon të lindë:

- A) 10 shkurt 2012
- B) 10 mars 2012
- C) 31 qershor 2012
- D) 06 korrik 2012

Infermieri Pyetje: 781

Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë?

- A) Parotitit
- B) Poliomeilitit
- C) Rabies
- D) Varicelës

Infermieri Pyetje: 782

Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë?

- A) Difteria
- B) hepatiti b
- C) Parotiti
- D) Rabies

Infermieri Pyetje: 783

Për të përcaktuar frekuencën e kontraksioneve uterine mamia do të vlersojë kohën nga:

- A) Fillimi i një kontraksioni deri në fund të kontraksioni tjetër
- B) Fundi i një kontraksioni deri në fund të kontraksionit tjetër
- C) Shpërthimi i kontraksionit deri në fund
- D) Shpërthimi i një kontraksioni deri në shpërthimin e kontraksionit tjetër

Infermieri Pyetje: 784

Në stadin e parë të lindjes shenja vendimtare që tregon për kontraksione uterine efektive është:

- A) Dilatacioni i cerviksit
- B) Ruptura e membranave amniotike
- C) Shfaqja e një sasive hemorragjie
- D) Zbritja e fetusit

Infermieri Pyetje: 785

Mamia i mëson gruas shtatzanë rreth karakteristikave të kontraksioneve të aktivitetit të vërtetë. Mamia vlerëson të arsyetuarit e gruas nëpërmjet instruksionit kur gruaja "do të përjetojë kontraksione të aktivitetit të vërtetë:

- A) Ato shkaktojnë diskomfort në pjesën e sipërme të uterusit
- B) Kontraksionet uterine do të bien kur unë do të ecë
- C) Vazhdojnë të jenë të çrregullta, por bëhen të forta.
- D) Vazhdojnë të jenë të forta edhe nëse unë relaxohem e bëj një dush

Infermieri Pyetje: 786

Infermierja është duke parë një grua që sapo ka bërë një test shtatzanie dhe rezulton pozitiv. Pas ekzaminimit vaginal infermierja bën shënime në kartelë. Cila nga gjetjet e mëposhtme është sinjifikative për këtë moshë shtatzanie :

- A) Zbutje të cerviksit
- B) Një zhurmë e lehtë që korrespondon me pulsën e nënës gjatë dëgjimit të uterusit
- C) Prezencën e HCG në urinë
- D) Prezencën e lëvizjeve fetale

Infermieri Pyetje: 787

Cila nga pikat e mëposhme nuk bën pjesë në nënfazat e stadi të parë të aktivitetit të lindjes?

- A) Faza aktive
- B) Faza e expulsionit
- C) Faza e tranzicionit
- D) Faza latente

Infermieri Pyetje: 788

Cila fazë e aktivitetit të lindjes është më e gjatë?

- A) Dytë
- B) Katërt
- C) Parë
- D) Tretë

Infermieri Pyetje: 789

Faza e dytë e lindjes nis me:

- A) 1 - 2 orët e para pas daljes së placentës
- B) Dilatacionin komplet dhe përfundon me lindjen e infantit
- C) Fillimin e hapjes dhe zbutjes së cerviksit
- D) Lindjen e infantit dhe përfundon me lindjen e placentës

Infermieri Pyetje: 790

Faza e tretë e lindjes nis me :

- A) 1-2 orët e para pas lindjes
- B) Dilatacionin komplet
- C) Lindjen e infantit
- D) Me përfundimin e fazës aktive

Infermieri Pyetje: 791

Në njësinë e paralindjes mamia po ndjek një grua primigravida. Ajo do ta lejojë gruan të shterzojë kur dilatacionin i qafës së mitrës të jetë:

- A) 10cm
- B) 5 cm
- C) 7cm
- D) 8cm

Infermieri Pyetje: 792

Infermierja shoqëron ekspulsionin e placentës duke administruar oxytocinë për:

- A) Lehtësimin e dhimbjeve
- B) Lehtësuar qëndrimin dhe relaximin
- C) Prevenimin e infeksionit
- D) Parandalimin e e hemoragjise pas lindjes

Infermieri Pyetje: 793

Cilat nga pikat e mëposhtme nuk i tregojnë mamisë shkolitjen e placentës?

- A) Kontraksionet uterine
- B) Ndryshime të TA dhe pulsit
- C) Ndryshimi i formës së uterusit
- D) Shtim i një sasive hemorragjie

Infermieri Pyetje: 794

Një grua duhet të marrë në konsideratë këshillimin gjenetik nëse në kohën që do të mbetet shtatzanë është :

- A) 30 vjeç ose më shumë
- B) 35 vjeç ose më shumë
- C) midis 25 vjeç dhe 30 vjeç
- D) nën 35 vjeç

Infermieri Pyetje: 795

Gjatë palpimit për të përcaktuar fundusin uterin tek një grua që sapo ka lindur, ju vini re se fundusi i saj është i fortë dhe tre gishtë gjëresë mbi umbelikus dhe i devijuar. Ju duhet të:

- A) Kontrolloni për shtim të lohjeve
- B) Masazhoni uterusin e fortë
- C) Matni presionin arterial
- D) Palponi për vezikë urinare të distenduar

Infermieri Pyetje: 796

Pritshmëria e mamisë lidhur me involucionin normal uterin në periudhën post partumit do të ishte, zbritja e uterusit :

- A) 1 cm në ditë
- B) 1 cm në dy ditë
- C) 1 cm në tre ditë
- D) 1 cm në javë

Infermieri Pyetje: 797

Dhimbja e fortë e kokës në tremestrin e tretë të shtatzanisë, mund të jetë shenjë paralajmëruese për:

- A) Dehidratim
- B) Hypertension
- C) Lodhje
- D) Pamjaftueshmëri ushqimi

Infermieri Pyetje: 798

Eklampsia është:

- A) Hipertensioni i zhvilluar menjëherë pas lindjes
- B) Prania e hipertensionit para 20 javësh gravidancë
- C) Prania e hipertensionit pas 20 javësh gravidancë
- D) Preeklampsi plus konvulsione, koma ose të dyja

Infermieri Pyetje: 799

Znj. X ka eklampsi. Detyra e parë e mamisë është:

- A) Administrimi i O₂ me maskë
- B) Aspirimin e përmbajtjes së gojës për të parandaluar kalimin në rrugën e frymëmarrjes
- C) Të fusë ajër në rrugë orale
- D) Të qëndrojë me pacienten dhe të telefonojë për ndihmë

Infermieri Pyetje: 800

Znj. X shtrohet në spital për të stimuluar lindjen për arsye të HT të induktuar nga barra. Analizat laboratorike tregojnë vlerën e trombociteve 90.000, rritje të transaminazave, dhe ulje të hematokritit. Infermeria njofton mjekun se rezultatet laboratorike

- A) HELLP sindrom
- B) K.I.D.
- C) Preeklampsi
- D) Trombocitopeni idiopatik

Infermieri Pyetje: 801

Infermierja po merr anamnezën e znj. X gjatë vizitës së parë prenatale kur gruaja rezultoi 10 javë me barrë. Cila prej pikave të mëposhtme tregon që znj. X është në rrezik për zhvillimin e diabetit gestacional gjatë kësaj barre:

- A) Ajo është 28 vjeçe
- B) Fëmija i parë i saj ka lindur me seksio
- C) Në anamnezën familjare rezultoi diabet i tipit të I-rë
- D) Pësha e fëmijës së fundit në lindje ka qënë 4530gr.

Infermieri Pyetje: 802

Gjatë instruksionit në lidhje me nivelet e dëshiruara të glukozës kur flitet për diabet gestacional, infermierja shpjegon nivelet e glukozës si p.sh. para ushqimit të cilat janë:

- A) 60-90 mg/dl
- B) 90-120 mg/dl
- C) 110-150 mg/dl
- D) 150-180 mg/dl

Infermieri Pyetje: 803

Konsultimi për konceptimin është i rëndësishëm për përfundimin e shtatzanisë tek gruaja me diabet, sepse kontrolli jo i mirë i glicemisë para dhe në periudhën e hershme të barrës shoqërohet me:

- A) Anomali kongjenitale të fetusit
- B) Episode të shpeshta të hipoglicemisë amtare
- C) Hiperemesis gravidarum
- D) Polihidramion

Infermieri Pyetja: 804

Zonja D. është 13 javë shtatzanë. Ajo ankon për dhimbje në fund të barkut dhe hemorragji. Gjatë ekzaminimit vaginal, mjeku konstaton se gruaja ka shkurtim të qafës së mitrës dhe dilatacion të saj. Cili lloj aborti është ky?

- A) Abort i paevitueshëm ose progredient
- B) Abort inkomplet
- C) Mised abort
- D) Rrezik aborti

Infermieri Pyetja: 805

Gruaja është në javën e tetë të shtatzanisë. Gjatë ekzaminimit me ultrasaund mjeku nuk arrin të kapë RZF. Në këtë rast kemi të bëjmë me:

- A) Abort habitual
- B) Abort inkomplet
- C) Abort të paevitueshmëm
- D) Mised abort

Infermieri Pyetja: 806

Një grua 10 javë shtatzanë merr në telefon shërbimin prenatal dhe i referon se ajo ka hemoragji vaginale. Cila duhet të jetë përgjigjia fillestare e infermieres?

- A) Ndoshta ju keni abortuar. Sill me vete të gjitha garzat apo lineset dhe hajde në klinikë tani.
- B) Përshkruaj sasinë e hemoragjisë, karakteristikat dhe kohën e gjakrrjedhjes (sa kohë ka zgjatur hemoragjia)
- C) Të rrijë regjim shtrati dhe nëse hemoragjia vazhdon të lajmërojë menjëherë
- D) Të vijë në klinikë sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim që të vizitohet

Infermieri Pyetja: 807

Një grua gravide 8 javëshe paraqet rrezik aborti. Kush është trajtimi i duhur për këtë lloj aborti:

- A) Përgatitja e gruas për t'ju bërë dilatacioni e kyretazhi
- B) Vendosja e gruas rregjim shtrati për disa ditë dhe rivlerësimi i saj
- C) Përgatitja e gruas për ekzaminim ekografik për të parë integritetin e sakusit gestacional
- D) Qetësimi i gruas duke i treguar asaj që edhe n.q.se e humbet këtë fëmijë ajo mund të ngelet përsëri shtatzane pas një muaji.

Infermieri Pyetja: 808

Testet e përdorura për të zbuluar SGA (I vogël për moshën e shtatzanisë) janë :

- A) Palpimi abdominal
- B) Lartësia fundale
- C) Biometria ekografike
- D) Testet biofizike për të diagnostikuar SGA/IUGR

Infermieri Pyetja: 809

Kur vendoset forcepsi dilatacioni duhet të jetë:

- A) 6 - 7 cm
- B) 7 - 8 cm
- C) 10 cm
- D) Mbi 10 cm

Infermieri Pyetja: 810

Barra serotine është shtatzania që zgjat:

- A) 36 - 38 javë
- B) 38 - 40 javë
- C) 40 - 41 javë
- D) Mbi 42 javë

Infermieri Pyetje: 811

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 41 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

Infermieri Pyetje: 812

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 38 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

Infermieri Pyetje: 813

Nëse gruaja ka një lindje para javës së 36 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të konsiderohet:

- A) Pretermë
- B) Termë
- C) Postermë
- D) Gestacinale

Infermieri Pyetje: 814

Shënja që një grua shtatzane ka aktivitet të parakohshëm lindje mund të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë, konstante dhe lokalizohet në pjesën e sipërme të barkut, në fundusin uterin
- B) Kontraksionet uterine zgjasin të paktën 20 minuta
- C) Kontraktimet uterine të cilat ndodhin me një frekuencë prej katër kontraksionesh në 1 orë
- D) Shkurtimi qafës së mitrës deri në 80% edhe dilatacioni 2 cm.

Infermieri Pyetje: 815

Një grua shtatzanë, në javën e 32 të shtatzanisë është përcaktuar të jetë me rrisht për lindje pretermë. Një shenjë, që të ndodhë lindja pretermë do të jetë:

- A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë dhe konstate
- B) Dilatacioni cervikal është më shumë se 1 cm
- C) Kontraksionet uterine i kemi me një frekuencë, 4 kontraksione në një orë
- D) Përgatitja e qafës mitrës (zbutja) dhe shkurtimi i saj 25%

Infermieri Pyetje: 816

Një grua e hospitalizuar për aktivitet të parakohshëm po merr MgSO₄ i/v. Rezultati i priturb për këtë trajtim do të jetë n.q.s.:

- A) Ataket eklamptike nuk do të ndodhin
- B) Kontraksionet uterine ndalohen
- C) Mushkrittë e të porsalindurit fillojnë prodhojnë surfaktant
- D) Nuk ndodh plasja e parakohshme e membranave

Infermieri Pyetje: 817

Zonja X është 23 javë shtatzanë. Ajo ju telefonon dhe ju thotë se mendon që ka rrjedhje të ujrave nga vagina.ju do ti thoni asaj:

- A) Hajdeni menjëherë në klinikë
- B) Më telefono pas 2 h dhe më trego nëse ka ndryshime të rrjedhjeve
- C) Ne mund të presim deri në vizitën tjetër të radhës
- D) Për sa kohë që bebi lëviz ju mos u shqetësoni

Infermieri Pyetje: 818

Kur gruas i plasin membranat amniotike parakohe mamia duhet të vlersojë T° çdo:

- A) 1 orë
- B) 4 orë
- C) 6 orë
- D) 8 orë

Infermieri Pyetje: 819

Gruaja paraqitet në klinikë dhe ankton për dhimbje (kontraksione). Mami mendon që gruaja i ka filluar aktivitetin e lindjes, kur kontraksionet janë:

- A) 30 minuta dhe zgjasin 90 sekonda
- B) çdo 5 minuta dhe zgjasin 30 sekonda
- C) të çrregullta në intervale të ndryshme kohore
- D) të çrregullta, por të forta

Infermieri Pyetje: 820

Znj X është 36 javë shtatzanë. Ajo referon se ka dhimbje shpine, si dhe dhimbje me forcim të barkut. Infermiera në këtë rast vlerëson kontraksionet uterine për rreth:

- A) 5min
- B) 10 min
- C) 15 min
- D) 30 min

Infermieri Pyetje: 821

Kur infermiere-mamia bënte planifikimin e kujdesit për gruan të cilës i kanë plasur membranat amniotike parakohe, ajo arsyeton që gruaja është e riskuar për:

- A) Hemorragji
- B) Hipotension në pozicion shtrirë me shpinë
- C) Infeksion intrauterin
- D) Lindje precipitoze

Infermieri Pyetje: 822

Menjërherë pas lindjes, gjatë vlersimit që infermiera i bën gruas vë re që fundusi uterin është i squllur dhe ka gjakrrjedhje të madhe. Etiologjia më e mundshme e kësaj gjakrrjedhje është.

- A) Atonia e uterusit
- B) Hematoma vaginale
- C) Inversioni uterin
- D) Laceracioni vaginal

Infermieri Pyetje: 823

Hemoragjitë e vona të post partumit shkaktohen nga:

- A) Atonia uterine
- B) Mbetjet e fragmenteve placentare
- C) Multipariteti i madh
- D) Zgjatje e aktivitetit të lindjes

Infermieri Pyetje: 824

Pas lindjes, gjatë ekzaminimit të zonjës X ju konstatojnë se brenda 15 min linesi i saj arrin të saturohet plotësisht. Veprimi i parë infermier që ju ndërmerrni është:

- A) Kontrolloni shënjat vitale
- B) Lajmëroni mjekun
- C) Palponi fundusin uterin
- D) Rrisni marrjen e likideve i/v

Infermieri Pyetje: 825

Simptomat e mëposhtme janë karakteristike për distakon e placentës së inseruar normalisht përveç:

- A) Dhimbja konstante (abdominale) uterine
- B) Hemorragjia vagjinale me gjak të errët
- C) Uterusi i kontraktuar, i dhimbshëm, hipertonic
- D) Mungesë e hemorragjisë

Infermieri Pyetje: 826

Pas lindjes gruaja ka hemoragji të vazhdueshme në sasi të pakët, fundusi uterin i kontraktuar. Kjo vjen si pasojë e:

- A) Atonisë së uterusit
- B) Laçeracionit të columit
- C) Mbetjeve të fragmenteve placentare
- D) Mbetjeve të membranave amniotike

Infermieri Pyetje: 827

Hemoragjia e hershme e postpartumit (hemoragjia që ndodh brenda 24 orëve të para të pas lindjes) ka më pak gjasa të ndodhë si rezultat i :

- A) Atonin uterine
- B) Formacioneve të hematomeve
- C) Laceracionet e labieve, perineumit, vagjinës ose cerviksit
- D) Subinvolucionin e uterusit

Infermieri Pyetje: 828

Shkaqet më të shpeshta të subinvolucionit janë:

- A) Barra multiple dhe hemorragjia postpartum
- B) Hemorragjia postpartum dhe infeksioni
- C) Kontraksion persistent dhe mbidozim me oxytocinë
- D) Mbetje e fragmenteve placentare dhe infeksioni

Infermieri Pyetja: 829

Një grua shtatzanë për herë të parë lind dy binjakë në javën e 37 të shtatzanisë.

Përshkrimi korrekt i anamnezës obstetrikale të gruas do të jetë:

- A) Multigravida, multipara
- B) Multigravida, primipara
- C) Primigravida, multipara
- D) Primigravida, primipara

Infermieri Pyetja: 830

Amniotomia është:

- A) Marrja e likidit amniotik për vlerësim
- B) Plasja artificiale e membranave
- C) Plasja spontane e membranave
- D) Studimi citologjik i likidit amniotik

Infermieri Pyetja: 831

Në metodat diagnostikuese jo-invazive në obstetrikë NUK bën pjesë:

- A) Ekografia
- B) Stress test
- C) Amniocenteza
- D) Profili biofizik

Infermieri Pyetja: 832

Zonja X ka zgjedhur metodën kalendarike për të kontrolluar kontracepsionin. Gjatë procesit të vleresimit, më e rëndësishme për infermieren është:

A) Ekzaminimi i pigmentacionit të lëkurës dhe cilesise së flokëve për ndryshime hormonale

B) Marrja e anamnezës menstruale për 6- 12 muajt e fundit

C) Njohja e experiencës së mëparshme të gruas për të kontrolluar lindjen

D) Përcaktimi i shtimit dhe humbjes në peshë

Infermieri Pyetja: 833

Zonja X është duke përdoruar temperaturën bazale trupore si metodë kontrceptive. Ajo shkon për kontroll në klinikë dhe i tregon infermieres "periodat e mia janë paksuar dhe temperatura nuk është rritur" përgjigja më e përshtatshme e mamisë duhet të jetë:

A) Ju keni qënë e sëmure këte muaj

B) Ju ndoshta nuk patët ovulacion këtë muaj

C) Kjo ndoshta nënkupton që ju jeni shtatzanë

D) Mos u mërzitni ndoshta kjo nuk është asgjë

Infermieri Pyetja: 834

Sifilia shkaktohet nga :

A) Clamidia trakomatis

B) Herpesi simpleks

C) Neiseria gonorrhoea

D) Treponema pallidum

Infermieri Pyetja: 835

Substancat spermicide veprojnë me anë të:

A) Barrierave mekanike

B) Duke frenuar ovulacionin

C) Duke shtuar rritjen e epitelit vaginal.

D) Shkatërrimit të spermës

Infermieri Pyetja: 836

Cili tip i pilulave kontraceptive konsiderohet i përshtatshëm për gjashtë javët e para pas lindjes kur është në ushqyerje me gji?

- A) pilulat kontraceptive të kombinuara
- B) pilulat kontraceptive trifazike
- C) pilulat me dozë të lartë estrogeni
- D) pilula vetëm me progesterone

Infermieri Pyetja: 837

Çrregullimet e shikimit dhe ato cerebrale janë karakteristike për:

- A) Diabetin e shtatzanisë
- B) Aneminë e shtatzanisë
- C) Preeklampsinë e rëndë
- D) Asnjë nga këto

Infermieri Pyetja: 838

Kondomët duhet të përdoren gjatë shtatzanisë:

- A) Asnjëherë
- B) Nga gratë me rrezik për kandida
- C) Nga gratë me rrezik të lartë për SST
- D) Nga të gjitha gratë shtatzana

Infermieri Pyetja: 839

Një grua e re vjen në klinikë dhe ju shpjegon që një natë më parë gjatë marëdhënies seksuale kondomi u çua. Në konsultë me këtë kliente ju e këshilloni atë që kontracepsioni post koital (kontracepsioni i urgjencës) ul rrezikun e një shtatzanie dhe është shumë efektiv kur:

- A) Ajo merret në çdo kohë përpara ciklit
- B) Doza e parë merret sa më shpejt që të jetë e mundur
- C) Doza e parë mund të merret pas 72 orëve
- D) Mund të merret dhe pas tre ditësh

Infermieri Pyetja: 840

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë partnerë. Ajo dëshiron një metodë kontraceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja me e përshtatëshme e ma

- A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST
- B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual
- C) Përqindja e barrave është më e lartë me D.I.U.
- D) Rreziku i SIP është më i madh për ju

Infermieri Pyetja: 841

Zoti dhe Zonja X po kalojnë momente të vështira për pamundësinë e tyre për të krijuar shtatzanësi. Ata duan të dinë se çfarë mund të bëjnë për të ruajtur ekuilibrin e tyre emocional. Përgjigja më e përshtatëshme nga ana e mamisë është :

- A) T'i tregojnë gjithë shokëve të tyre dhe familjeve
- B) Të bisedojnë me homologët e tyre infertil
- C) Të kërkojnë mbështetje nga grupet e specializuara për këtë problem
- D) Të fillojnë procedurat e menjëherëshme për adoptim

Infermieri Pyetja: 842

Një grua është duke përdorur diafragmën në mënyrë jo korrekte nëse ajo:

- A) Aplikon spermicid brenda kupës dhe rreth buzëve të diafragmës
- B) E lan atë me sapun të butë dhe ujë pas përdorimit dhe më pas e pudros atë me niseshte
- C) Lëviz atë brenda 2 orëve pas aktit të fundit të koitusit
- D) Vendos diafragmën 6 orë para marrëdhënies

Infermieri Pyetje: 843

Zonja X. sapo ka patur abort në tremestrin e I-rë dhe është dërguar në shtëpi duke i dhënë kontraktivë orale për tu mbrojtur nga një barrë, ajo është këshilluar të :

- A) Të fillojë kontraktivët orale që ditën e kryerjes së abortit
- B) Të mënjanojë kontaktin seksual deri sa të pushojë hemorragjia
- C) Të përdorë kondom dhe shkurmbë për javën e parë
- D) Të përdorë një metodë tjetër kontraktive për një cikël të plotë

Infermieri Pyetje: 844

Procedura e sterilizimit në meshkuj është:

- A) Lidhja e tubave
- B) Spermicitet
- C) Spermatostatikë
- D) Vasektomia bilaterale

Infermieri Pyetje: 845

Metoda më e frekuentë për kontrollin e lindjeve e përdorur nga femrat 15-19 vjeçare është:

- A) Depo-Provera
- B) DIU-ja
- C) Kontraktivët orale
- D) Norplanti

Infermieri Pyetja: 846

Zonja X është diagnostikuar dhe trajtuar për sindromin e shokut toksik. Ajo në ndonjë rast të marrdhënieve seksuale ka përdorur kontraktivë të marrë vetë në farmaci. Bazuar në anamnezën e saj, çfarë kontraktivësh, nuk duhet të përdorë ajo dhe partner

- A) Diafragmat
- B) Kondom vaginal.
- C) Kondomi
- D) Sfungjerët

Infermieri Pyetja: 847

IST që transmetohen më shpesh janë:

- A) C. Trachomatis
- B) N. Gonorrhea
- C) Sifilizi
- D) Vulvovaginal candidosis

Infermieri Pyetja: 848

Në efektet anësore të DIU (dispozitivi intrauterin) përfshihen:

- A) Depresioni
- B) Gjendja e ankthit
- C) Nauzeja dhe dhimbja e kokës
- D) Menstruacione më të rënda

Infermieri Pyetja: 849

Cilat nga pikat e mëposhtme sugjeron infermierin që gruaja mund të ketë vaginitis monialis?

- A) Ankesë për kuarje vulvare irrituese
- B) Dhimbje mesi të padurueshme
- C) Sekrecine të ujshme në ngjyrë të verdhë
- D) Temperaturë

Infermieri Pyetja: 850

Kur një femer konsultohet për dismenorrhea primare, cila nga ndërhyrjet e më poshtme jo farmakologjike do të përdoret:

- A) Mos bërja e ushtrimeve gjatë periudhës menstruale
- B) Përdorimi i kompresave të ngrohta për të lehtësuar crampet
- C) Shmagia e marrdhënieve seksuale gjatë ditës së parë të menseve
- D) Shmangia e kafeinës gjatë periudhes menstruale

Infermieri Pyetja: 851

Me amenorre kuptojmë:

- A) Fluksi i pakët menstrual
- B) Fluksi i shtuar menstrual
- C) Menstruacione të dhimbshme
- D) Mungesë e menseve

Infermieri Pyetja: 852

Dhimbja e fortë, akute jo menstruale lidhet me:

- A) Cisti ovarial i rupturuar
- B) Dismenorrheanë primare
- C) Dispozitivin Intra- Uterin
- D) Sëmundjet malinje të ovareve

Infermieri Pyetja: 853

Dhimbja menstruale rekurente dhe në mënyrë periodike lidhet me:

- A) Cistet ovariale
- B) Dismenorrhea (primare, sekondare)
- C) Sëmundjet inflamatore pelvike akute
- D) Sëmundjet malinje të uterusit

Infermieri Pyetje: 854

Gjatë intervistës me një zonjë 31 vjeçare, mamia përpara ekzaminimit rutinë, mbledh të dhëna rreth ciklit të fundit menstrual. Ajo duhet të mbledhë informacion shtesë, në rastin kur gruaja përshkruan:

- A) rrjedhje shumë të shtuara
- B) sasi të vogël spottingu mes periodave
- C) Gjatësinë e ciklit menstrual nga 26 deri 29 ditë
- D) Rrjedhje menstruale më pak se 5-6 ditë

Infermieri Pyetje: 855

Terapia me rreze ultraviolette përdoret në pacientët me:

- A) tendinit të muskulit biceps në fazën akute
- B) ne traumat e freskëta
- C) ne limfedemat e komplikuara
- D) ne patologjitë degenerative në fazën kronike

Infermieri Pyetje: 856

Pas një endoproteze të artikulacionit koksofemoral pozicionimi i kundërrindikuar i artikulacionit është?

- A) Fleksion, abduksion i artikulacionit koksofemoral
- B) Ekstension dhe abduksion i artikulacionit koksofemoral
- C) Ekstrarotacion dhe aduksion i artikulacionit koksofemoral
- D) Fleksion dhe intrarotacioni artikulacionit koksofemoral

Infermieri Pyetje: 857

Kur duhet të vertikalizohet një pacient pas një operacioni kardiak?

- A) menjëherë pas operacionit
- B) një javë pas operacionit
- C) ditën e dytë ose të tretë pas operacionit
- D) sipas dëshirës së pacientit

Infermieri Pyetja: 858

Rehabilitimi i pacientit është:

- A) Punë individuale e fizioterapistit
- B) Proces pasiv
- C) Punë multidisiplinare
- D) Punë inividuale për infermierin

Infermieri Pyetja: 859

Ushtrimet aktive janë të rëndësishme për:

- A) rritjen e forcës muskulare
- B) përmirësimin e kapacitetit respirator
- C) përmirësimin e qarkullimit të gjakut
- D) të gjitha alternativat e sipërpërmendura

Infermieri Pyetja: 860

Vendosja e objekteve në dhomat e pacientëve hemiparezë duhet të jetë:

- A) Çdo objekt duhet të vendoset në anën e shëndetshme
- B) Objektet duhet të vendosen në anën me parezë
- C) Nuk është e rëndësishme vendosja
- D) Vendosja e objekteve varet nga dëshira e pacientit

Infermieri Pyetja: 861

Elektrostimulimi është terapi fizike që përdoret për të stimuluar:

- A) muskulin e inervuar dhe nervat periferike
- B) muskulin e denervuar dhe nervat periferike
- C) muskulin e inervuar dhe muskulin e denervuar
- D) nervat periferike dhe palcën e kurrizit

Infermieri Pyetje: 862

T.E.N.S është terapi antalgjike që e ul dhimbjen nëpërmjet:

- A) stimulimit të prodhimit të dopamines
- B) sistemit të kontrollit të portës në palcën e kurrizit
- C) bllokimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të madh
- D) shtimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të vogël

Infermieri Pyetje: 863

Sipas parimit të Arkimedi trupi i zhytur në një teren ujor:

- A) peshon më shumë
- B) peshon më pak
- C) nuk i ndryshon pesha
- D) pëson deformime të formës

Infermieri Pyetje: 864

Në tendinitin e kalçifikuar modaliteti i tepapise fizike më efikas është:

- A) krioterapia
- B) ultratigujt
- C) lazerterapia
- D) T.EN.S

Infermieri Pyetje: 865

Presoterapia është kundër:

- A) dhimbjes
- B) limfedemes
- C) kalçifikimeve
- D) hemoragjise

Infermieri Pyetje: 866

Hidrokinëzi terapia gjen kundërindikacion absolute në:

- A) hemipleçji
- B) parapleçji
- C) spondiloartrozë
- D) në dermatitin purulent

Infermieri Pyetje: 867

Ushtrimet pasive mund të kryhen:

- A) në pacientët pas një kraniotraumë
- B) në pacientët në gjendje "shoku"
- C) në të gjithë pacientët e hospitalizuar
- D) në pacientët e hospitalizuar pas kontrollit dhe aprovimit të mjekut përgjegjës

Infermieri Pyetje: 868

Përpara fillimit të seancës së rehabilitimit me një pacient me hemipleçji rekomandohet banje me:

- A) ujë të ngrohtë
- B) parafinë
- C) ujë të ftohtë
- D) hidromasazh

Infermieri Pyetje: 869

Terapia me rreze ultraviolete indikohet në:

- A) pelagra
- B) lupusin eritematoz
- C) sarkoidozë
- D) akne

Infermieri Pyetje: 870

Terapia me rreze ultraviolete kunderindikohet në:

- A) mundesën e vitaminës D
- B) sinuzit
- C) psoriazis
- D) hipertiroidizem

Infermieri Pyetje: 871

Ushtrimet aktive dhe pasive nuk kryhen në rastet kur:

- A) pacienti është në gjendje febrile
- B) pacienti ka vështirësi në kryerjen e ushtrimeve
- C) pacienti është i hospitalizuar në reanimacion
- D) të gjitha alternativat e sipërpërmendura

Infermieri Pyetje: 872

Ultratingujt në reabilitim, përveç efektit antalgjik i përdorim dhe për efektin:

- A) nxirës të lëkurës
- B) termik
- C) masazhues
- D) stimulim të nervave

Infermieri Pyetje: 873

Akulli në qoftë se vendoset direkt në lëkure jep:

- A) vazodilatacion
- B) rritje të permeabilitetit kapilar
- C) zbehje të lëkurës
- D) djegie

Infermieri Pyetje: 874

Ushtrimet pasive të pacientëve të hospitalizuar duhet të kryhen:

- A) vetëm një herë në ditë
- B) dy herë në ditë
- C) çdo një orë
- D) asnjëherë

Infermieri Pyetje: 875

Terapia me ultratinguj gjen indikacion në:

- A) tumore
- B) osteoporozë
- C) limfedemë me fibrozë
- D) në bursit të kalçifikuar

Infermieri Pyetje: 876

Llambat me rreze ultraviolette bëjnë pjesë në termoterapi me:

- A) konduksion
- B) konveksion
- C) skanim
- D) rrezatim

Infermieri Pyetje: 877

Banjot kontraste gjejnë indikacion :

- A) në distrofi muskulare
- B) në infarkt të miokardit
- C) në vaskulopati periferike
- D) artritin reumatoid

Infermieri Pyetja: 878

Jonoforeza është modalitet terapeutik që realizon përshejtimin e medikamenteve me anë të:

- A) fushës manjetike
- B) rrymës elektrike të alternative
- C) vibrimeve akustike
- D) rrymës elektrike të vazhduar

Infermieri Pyetja: 879

Ushtrimet pasive te pacientët e hospitalizuar bëhen për arsyet:

- A) Për të parandaluar vetëm kontrakturat artikulare
- B) Për të ruajtur gjendjen aktuale të pacientit
- C) Për të rritur forcën muskulare
- D) Për të parandaluar plagët e shtratit

Infermieri Pyetja: 880

Tufa e rrezeve lazer ka keto karakteristika:

- A) njëngjyreshe, paralele, koherente
- B) një ngjyreshe, paralele, jokoherente
- C) shumë ngjyreshe paralele, koherente
- D) shumë ngjyreshe paralele, jokoherente

Infermieri Pyetja: 881

Drita Lazer nuk perdoret në :

- A) kirurgji
- B) dermatologji
- C) fizioterapi
- D) gjinekologji

Infermieri Pyetje: 882

Pozicionimi i saktë i pacientit në shtrat është i nevojshëm për:

- A) parandalimin e plagëve të shtratit (dekubitus)
- B) përmirësimin e qarkullimit të gjakut
- C) përmirësimin e përqëndrimit dhe orietimit në ambient
- D) të gjitha alternativat e sipërpërmendura

Infermieri Pyetje: 883

Cila është arsyeja që pacienti i hospitalizuar duhet të ulet për disa orë në karrige?

- A) Përmirësimi i gjendjes emocionale
- B) Përmirësimi i frymëshkëmbimit dhe qarkullimit të gjakut
- C) Përmirësimi i drenimit postural
- D) Të gjitha alternativat e mësipërme

Infermieri Pyetje: 884

Cilat janë zonat më të rrezikuara për tu shfaqur një dekubitus?

- A) occipitum, sacrum, spina scapulae
- B) occipitum, spina scapulae, klavikula
- C) os sacrum, thembrat, regioni lombal
- D) asnjë nga alternativat

Infermieri Pyetje: 885

Modaliteti më i përdorur dhe efikas i terapisë me ultratinguj është me:

- A) me kontakt direkt
- B) me lëvizje rrotulluese të kokës
- C) me lëvizje perpendikulare
- D) me lëvizje gjatësore të kokës

Infermieri Pyetje: 886

Terapia me ultratinguj kunderindikohet në:

- A) çrregullime të sensibilitetit
- B) kalçifikime
- C) tendinite
- D) borsite

Infermieri Pyetje: 887

Sonoforeza është terapi përshpejtimi medikamentesh me anë të:

- A) rrymës elektrike
- B) mikrovalëve
- C) ultratingujve
- D) lazerit

Infermieri Pyetje: 888

Infiamacioni karakterizohet nga këto shenja:

- A) dolor, kalor, tumor, rubor, funksioneza
- B) dolor, rubor, kalor, tumor, nekroza
- C) kalor, tumor, dolor, hiperplazia, nekroza
- D) hiperplazia, nekroza, dolor

Infermieri Pyetje: 889

Në dhimbjen e artikulationit tempo-mandibular modalitetet terapeutike që përdoren janë:

- A) mikrovalët, lazeri, ultratingujt
- B) TENS, radarterapi, korente interferenciale
- C) presoterapi, radarterapi, korente interferenciale
- D) ultratingujt, TENS, lazer

Infermieri Pyetje: 890

Trigger point janë pika:

- A) të padhimbshme të trupit
- B) të agopunturës
- C) shumë të dhimbshme
- D) ku vendosen elektodat e TENS

Infermieri Pyetje: 891

Rrymat diadinamike janë rryma:

- A) galvanike
- B) alternative retangolare
- C) sinusoidale me frekuencë të ulët
- D) të kombinuara

Infermieri Pyetje: 892

Efektet fiziologjike të rrymave diadinamike nuk lidhen me :

- A) shtimin e vazokonstriksionit
- B) shtimin e vazodilatacionit
- C) rritjen e permeabilitetit të membranës qelizore
- D) rritjen e ngacmueshmërisë së fibrave nervore me kalibër të madh

Infermieri Pyetje: 893

Pozicioni i pacientit të hospitalizuar në shtrat ndryshohet:

- A) 1 herë në ditë
- B) çdo 7-8 orë
- C) çdo 2-3 orë
- D) sa herë të dëshirojë pacienti

Infermieri Pyetje: 894

Teste përgatitese për provimin e licencës për studentët e infermierisë
<https://gjithcka.al>

Elektrodat më komode në përdorim gjatë elektroterapisë janë:

- A) plastike
- B) metalike
- C) sfungjerore
- D) autoaderente

Infermieri Pyetje: 895

Manjeto terapia indikohet:

- A) osteoporozë
- B) hemiplegji
- C) paraplegji
- D) hypotoni

Infermieri Pyetje: 896

Llampat ultraviolette nuk japin:

- A) djersitje
- B) vazodilatacion
- C) vazokonstriksion
- D) ulje të dhimbjes

Infermieri Pyetje: 897

Terapia fizike :

- A) ka vetëm efekt placebo
- B) nuk përdoret vitet e fundit në rehabilitim
- C) përdoret gjerësisht në rehabilitim
- D) përdoret gjithmone e kombinuar me terapinë medikamentozë

Infermieri Pyetje: 898

Teste per gatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise
<https://gjithcka.al>

Për ulcerën peptike janë të verteta pohimet e mëposhtme përveç:

- A) Etiopatogjeneza ka lidhje me prishjen e ekuilibrit ndërmjet faktorëve agresiv dhe atyre mbrojtës të mukozës
- B) Në etiopatogjenezë ka rol helicobacter pilori
- C) Prek vetëm doudenin
- D) Preparatet Antiinflamatorë josteroidë kanë rol të rëndësishëm në shkaktimin e ulcerës

Infermieri Pyetja: 899

Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:

- A) femrat me moshen e riprodhimit
- B) meshkujt
- C) grate ne menopauze
- D) meshkujt ne pubertet

Infermieri Pyetja: 900

Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:

- A) Femrat e bardha
- B) Femrat me ngjyre
- C) Meshkujt e bardhe
- D) Meshkujt me ngjyre

Infermieri Pyetja: 901

Per Lupusin Eritematoz Sistemik jane te gjitha te verteta pervec:

- A) Semundja mund te preki cdo organ apo sistem
- B) Fillon me shenja te pergjithshme : dobesi, temperature subfebrile, lodhje
- C) Semundja ka shfaqje ne lekure
- D) Nuk shoqerohet me alterime hematologjike

Infermieri Pyetja: 902

Lupusi Medikamentoz nuk:

- A) Eshte nje sindrome me shfaqje klinike dhe imunologjike te ngjashme me Lupusin Eritematoz Sistemik
- B) Shkaktohet nga prokainamidi, hidralazina, izoniazidi, metildopa, klorpromazina
- C) Jane te rralla prekja e SNQ dhe demtimet renale
- D) Demtimet ne organet e brendshme jane te parikthyeshme

Infermieri Pyetja: 903

Antikorpet antinuklear:

- A) Perbejne nje shenje laboratorike kryesore ndonese jo specifike per Lupusin Eritematoz Sistemik
- B) Behen ne çdo ekzaminim laboratorik rutinë
- C) Shikohen ne mikroskop te zakonshem
- D) Nuk perbehen nga nentipa antikorpesh

Infermieri Pyetja: 904

Artriti Reumatoid eshte nje semundje per te cilen jane te verteta te gjitha pervec:

- A) Prek afersisht 0.8% te popullates
- B) Femrat preken me shume se meshkujt
- C) Semundja eshte me shpeshte ne dekadën e pare dhe te dyte te jetes
- D) Karakterizohet nga prania e sinoviteve inflamatore persistentete

Infermieri Pyetja: 905

Artralgjia ne Artritin Reumatoid eshte:

- A) Jo simetrike
- B) Pa rritje te ndjeshmerise gjate palpimit dhe enjtje te artikulacioneve te prekura
- C) Preken me shume artikulacionet e vogla te gishtave
- D) Inflamacioni per kohe te gjate nuk shkakton deformim artikulacionesh

Infermieri Pyetja: 906

Shfaqet ekstrartikulare të Artritit Reumatoid përfshijnë të gjitha përveç:

- A) Prekje pulmonare
- B) Çrregullime hematologjike
- C) Çrregullime okulare
- D) Praninë e hiperkeratozës dhe atrofisë së lekurës

Infermieri Pyetja: 907

Sklerodermia:

- A) Patogjeneza e semundjes eshte e sqaruar plotesisht
- B) Nuk eshte e lidhur me faktore nderveprues gjenetik dhe mjedisor
- C) Karakteristike per semundjen eshte prania e fibrozës së lekures
- D) Semundja prek me teper meshkujt se femrat

Infermieri Pyetja: 908

Per mjekimin e Artritit Reumatoid perdorën Të gjitha përveç:

- A) Anti inflamatorët jo steroid
- B) Glukokortikosteroidet intrartikular dhe sistemik
- C) Metformina
- D) Sulfazalazina

Infermieri Pyetja: 909

Sklerodermia difuze

- A) Karakterizohet vetem nga prekja e anesive distale e proksimale
- B) Nuk preken organet e brendeshme
- C) Ka prognoze te mire
- D) Ka hipomotilitet ezofageal dhe hipofunksion gastrointestinal

Infermieri Pyetje: 910

Dermatomioziti dhe polimioziti:

- A) Nuk janë sëmundje autoimune
- B) Nuk shkaktojnë dobësi dhe dhimbje muskuljsh
- C) Paraqesin alterime të CPK, SGOT, SGPT
- D) Nuk kanë autoantikorpë karakteristike

Infermieri Pyetje: 911

Rashi ngjyres lejla rreth syve është tipik për :

- A) Dermatomiozitin
- B) Polimiozitin
- C) Sindromin Sjogren
- D) Sklerodermine

Infermieri Pyetje: 912

Te sëmuret me miopati kanë:

- A) Dobësi të muskuljeve distale
- B) Dobësi të muskuljeve proksimale
- C) Dobësi të qafes
- D) Nuk kanë shqetësime të lokalizuara

Infermieri Pyetje: 913

Mjekimi në dermatomiozitin:

- A) Efekti i tij vlerësohet përmes ndryshimit të vlerave të CPK (kreatin fosfokinazës)
- B) Përdoret metformina dhe antiinflamtorët jo steroidë
- C) Mjekohet me ACE inhibitor dhe beta bllokues
- D) Nuk shtetë i nevojshëm mjekimi sepse sëmundja është e përkohshme

Infermieri Pyetja: 914

Klasifikimi i vaskuliteve paresore bazohet ne:

- A) Agresivitetin e semundjes
- B) Permasat e vazave te prekura
- C) Ekzistojne dy klasa vaskulitesh
- D) Nuk ka ndryshuar gjate viteve

Infermieri Pyetja: 915

Granulomatoza Wegener eshte:

- A) Vaskulit i vazave te medha
- B) Eshte vaskulit granulomatoz i aparatit respirator i shoqeruar dhe me glomerulonefrit
- C) Te semuret nuk kane demtime otojatrike
- D) Eshte vaskulit i vazave mesatare

Infermieri Pyetja: 916

Spondiliti ankilozant eshte semundje:

- A) e femrave ne dhjete-vjecarin e katert e te peste te jetes
- B) e meshkujve ne dhjete-vjecarin e dyte dhe te trete te jetes
- C) e grave ne menopauze
- D) infektive

Infermieri Pyetja: 917

Spondiliti ankilozant eshte semundje inflamatore qe prek:

- A) Kryesisht artikulationet e anesive
- B) Nuk fillon me shenjate e sakroileitit
- C) Prek zakonisht shtyllen kurrizore dhe artikulationet sakroiliake
- D) Dekursi natyror i semundjes nuk perfundon ne invalidizim te plote

Infermieri Pyetja: 918

Ankesat e te semurit me spondilit ankilozant :

- A) Rendohen nga aktiviteti fizik
- B) Nuk ndikohen nga aktiviteti fizik
- C) Ngurtesimi mengjezor zgjat 15 min
- D) Ankesat e te semurit rendohen ne mengjes dhe permiresohen gjate aktivitetit fizik

Infermieri Pyetja: 919

Spondiliti ankilozant mjekohet :

- A) Me terapi medikamentoze dhe terapi fizike
- B) Vetem me terapi medikamentoze
- C) Vetem me terapi fizike
- D) Nuk ka nevoje per mjekim shume te gjate pothuajse gjithë jeten

Infermieri Pyetja: 920

Cili nga pohimet e mëposhtme është i saktë për acidin urik:

- A) Prodhimi i tij nuk lidhet ngushtë me metabolizmin e purinave
- B) Hiperuricemia është karakteristike e goutes
- C) Në goute acidi urik në plazëm dhe lëngun jashtëqelizor është në vlera normale
- D) Hiperuricemia është rezultat i vetëm një çrregullimi

Infermieri Pyetja: 921

Podagra fillon zakonisht ne :

- A) Artikulacionin e gjurit
- B) Artikulacionet e gishtave te duarve
- C) Artikulacionin e qafes
- D) Gishtin e madh te kembes

Infermieri Pyetja: 922

Diagnostikimi i podagres:

- A) Mbështetet vetem ne te dhenat klinike
- B) Është i nevojshem analizimi i lengut sinovial
- C) Janë te mjaftueshme vetem te dhenat laboratorike
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetja: 923

Insuficenca renale akute klasifikohet ne :

- A) Ne dy kategori : prerenale dhe postrenale
- B) Ne IRA residuale dhe jo residuale
- C) Ne IRA prerenale, intrinseke, dhe postrenale
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetja: 924

Insuficenca renale akute është nje sindrome klinike e karakterizuar nga :

- A) Renia e shpejtë e filtrimit glomerular, rritje e metejshme e nivelit te kreatinines dhe azotemise
- B) Renia e shpejtë e filtrimit glomerular, ulje e metejshme nivelit te kreatinines dhe azotemise
- C) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, ulje e metejshme nivelit te kreatinines dhe azotemise
- D) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, rritje e metejshme nivelit te kreatinines dhe azotemise

Infermieri Pyetje: 925

Kemi infeksion urinar kur:

- A) Është e pranishme bakteriuria me $> 10,000$ baktere për ml
- B) Është e pranishme bakteriuria me < 10 baktere për ml
- C) Nuk ka baktere në urinë
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetje: 926

Cistitet janë :

- A) Infeksione të rrugëve të sipërme urinare
- B) Infeksione të rrugëve të poshtme urinare
- C) Janë infeksione të veshkës
- D) Nuk shoqërohen me djegje gjatë urinimit

Infermieri Pyetje: 927

Infeksionet e rrugëve urinare:

- A) Infeksionet e rrugëve urinare janë shkak i përgjithshëm i sepsisit
- B) Infeksionet urinare nuk shoqërohen me dhimbje e djegje gjatë urinimit
- C) Nuk shoqërohen me crregullime të aktit të urinimit
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetje: 928

IRA prerrenale shkakohet nga Të gjitha përveç:

- A) Diarresë masive
- B) Hemorragjia e brendshme dhe e jashtme
- C) Humbjet në lëkurë (djegjet)
- D) Prania e osteoartritit

Infermieri Pyetje: 929

Nekroza tubulare akute është shkaku më i shpësthtë i :

- A) IRA prerrenale
- B) IRA intrinseke
- C) IRA postrenale
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetje: 930

Studimi i sedimentit urinar jep të dhëna të rëndësishme për cilën kategori të IRA :

- A) IRA prerrenale
- B) IRA intrinseke
- C) IRA postrenale
- D) Asnjërën prej tyre

Infermieri Pyetje: 931

Të gjitha janë të vërteta për mjekimin e llojeve të ndryshme të insuficiencës renale akute (IRA) përveç:

- A) Shumica e rasteve me IRA zgjidhen me masa konservative
- B) Në IRA prerrenale nga humbja e lëngjeve duhet bërë korigjimi i këtyre humbjeve
- C) Në rastet e IRA me pielonefrit përdoren antibiotikë
- D) Nuk merret asnjëherë në konsideratë hemodializa

Infermieri Pyetje: 932

Glomerulonefriti akut poststreptokoksik :

- A) Nuk është një nga format më të shpeshta të glomerulonefriteve
- B) Përben shkaktun më të shpësthtë të glomerulonefriteve tek fëmijet
- C) Nuk ka lidhje me infeksionet e shkaktuara nga streptokoku beta hemolitik i grupit A
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetja: 933

Faktorë risku për infeksionet e rrugëve urinare janë Të gjitha përveç:

- A) Shtatzania
- B) Diabeti
- C) Aktiviteti seksual
- D) Prania e osteoartritit bashkëshoqërues

Infermieri Pyetja: 934

Pamja radiologjike e shkopit të bambuse është tipike për cilën patologji:

- A) Lupus Eritematoz Sistemik
- B) Artrit Reumatoid
- C) Polimiozit
- D) Morbus Bekteriev

Infermieri Pyetja: 935

Sakroileiti është shenjë fillestare e ciles prej këtyre patologjive :

- A) Sklerodermi
- B) Artrit reumatoid
- C) Osteoartrit
- D) Morbus Bekteriev

Infermieri Pyetja: 936

Me ane të bronkoskopisë realizohen Të gjitha përveç :

- A) Mundeson vlerësimin e anomalive endobronkiale
- B) Vlerësimin e rrugëve percjellese të ajrit
- C) Marrjen e biopsisë
- D) Ndhomon në venien e diagnozës së embolisë pulmonare

Infermieri Pyetje: 937

Ne astmen bronkiale :

- A) Obstruksioni i rrugëve të ajrit është episodik dhe reversibel
- B) Reaktiviteti i rrugëve të ajrit ndaj stimulëve specifike dhe jo specifike është normal
- C) Te sëmurët nuk kanë anamnezë prani të sëmundjeve të tjera alergjike
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetje: 938

Bronkiti kronik është :

A) Një sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale të shoqëruara me kolle e sputum për të paktën 3 muaj deri në 1 vit.

B) Një sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale të shoqëruara me kolle e sputum për të paktën 3 javë.

C) Një sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i sekrecioneve mukozale trakeobronkiale të shoqëruara me kolle e sputum për të paktën 1 muaj.

D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetje: 939

Etiopatogjeneza e bronkitit kronik mendohet të lidhet me shkaktarët e mëposhtëm përveç:

- A) Me thymin e duhanit
- B) Ekspozimi ndaj pluhurave profesionale
- C) Infeksione të shkaktuara nga mykoplazma pneumonie
- D) Ndotja atmosferike

Infermieri Pyetja: 940

Pneumonia është :

- A) Pakesim i elasticitetit te rrugeve te ajrit ne nivel te bronkiolave terminale
- B) Shkaktohet nga ekspozimi ndaj pluhurave profesional
- C) Nje infeksion i parënkimes pulmonare i shkaktuar nga lloje te ndryshme bakteriesh, virusesh, myqesh
- D) Asnjë prej pohimeve nuk është i saktë

Infermieri Pyetja: 941

Pneumoni shkaktone te tera përveç:

- A) Shigella dysantheriae
- B) Klamidia
- C) Rikeciet
- D) Mykoplazma

Infermieri Pyetja: 942

Rol te rëndësishëm ne vendosjen e diagnozes se pneumonise ka:

- A) Radiografia pulmonare
- B) Torakocenteza dhe biopsia e pleures
- C) Shintigrafia
- D) Testet kutane

Infermieri Pyetje: 943

Ekzaminimi i sekrecioneve të një të semuri me pneumoni tregon:

- A) Nese në preparatin e përgatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë të pranishme < 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni është i përhapur
- B) Nese në preparatin e përgatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë të pranishme > 25 qeliza polimorfonukleare dhe < 10 qeliza epiteliale inflamacioni është i përhapur
- C) Nese në preparatin e përgatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë të pranishme < 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni nuk është i përhapur
- D) Të gjitha janë të pasakta

Infermieri Pyetje: 944

Kolesteroli total duhet mbajtur në këto vlera:

- A) nën 460 mg/dl
- B) nën 200 mg/dl
- C) nën 500 mg/dl
- D) nën 50 mg/dl

Infermieri Pyetje: 945

Faktor madhor rrishtës për sëmundje të Arterive Koronare janë të tërë, përveç

- A) Dislipidemia
- B) Niveli i lartë i kolesterolit
- C) Mosmarrja me sporte
- D) Anamneza familjare

Infermieri Pyetja: 946

Ne IRA prerenale, dëmtimi renal është rezultat i Të gjithave përveç:

- A) Humbje e volumit nga trakti gastrointestinal
- B) Humbje kutaneale e volumit (djegjet)
- C) Humbje e volumit si rezultat i hemoragjise interne dhe ekstrene
- D) Dëmtimit strukturor i nefroneve

Infermieri Pyetja: 947

Oliguria percaktohet si sekretimi i:

- A) me pak se 400 ml/ urinë ne ditë
- B) me pak se 200 ml/ urinë ne ditë
- C) me shume se 3 l/ urinë ne ditë
- D) me pak se 100 ml/urinë ne ditë

Infermieri Pyetja: 948

Anuria percaktohet si sekretimi i:

- A) me pak se 300 ml/ urinë ne ditë
- B) me pak se 400 ml/ urinë ne ditë
- C) me shume se 2 l/ urinë ne ditë
- D) me pak se 100 ml/urinë ne ditë

Infermieri Pyetja: 949

Ne crregullimet e ritmit bëjnë pjesë Të gjitha përveç :

- A) Takikardia sinusale
- B) Bradikardia sinusale
- C) Flateri atrial
- D) Infarkti i miokardit

Infermieri Pyetje: 950

Takikardia paroksizmale supraventrikulare me rihyrje pa parangacim është :

- A) Crregullim i ritimit sinusal
- B) Crregullim i ritimit atrial
- C) Crregullim i ritimit junkSIONAL
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetje: 951

Crregullimet e ritimit sinusal përfshijnë Të gjitha përveç:

- A) Takikardia sinusale
- B) Bradikardia sinusale
- C) Fibrilacioni atrial
- D) Aritmi sinusale dhe disfunkcion të nyjes sinusale.

Infermieri Pyetje: 952

Polakiuria është urinim:

- A) naten
- B) me djegje
- C) i shpështë
- D) i dhimbshëm

Infermieri Pyetje: 953

Enuresis nocturna është urinim:

- A) i dhimbshëm
- B) me djegje
- C) i shtuar
- D) naten



Infermieri Pyetja: 954

Tiroidja normale:

- A) Është e palpueshme
- B) Nuk është e palpueshme
- C) Është e palpueshme vetem tek meshkujt
- D) Është e palpueshme vetem tek femrat

Infermieri Pyetja: 955

Karakteristike per fazen akute te tirotoksikozes është prania e:

- A) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH te ulët
- B) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH e lartë
- C) T3 dhe T4 te ulta dhe TSH te ulët
- D) Asnjëra prej tyre



Infermieri Pyetja: 956

Per mjekimin e morbus Graves perdorën Të gjitha përveç :

- A) Karbimazoli
- B) Metimazoli
- C) Indometacina
- D) Propiltiuracili

Infermieri Pyetja: 957

Tiroidit Hashimoto i perkasin Të gjitha, përveç :

- A) Është inflamacion kronik me natyre autoimune i tiroides
- B) Gusha mund te paraqitet asimetrike
- C) Nuk janë te pranishme Asnjë lloj autoantikorpesh
- D) Pothuajse gjithmone janë te pranishme antikorpet antimikrozomiale



Infermieri Pyetja: 958

Shkaktare te hipertiroidizmit janë Të gjitha përveç:

- A) Sëmundjet autoimune
- B) Patologjitë tumorale
- C) Patologjitë inflamatorë
- D) Atireoza

Infermieri Pyetja: 959

Morbus Basedov:

- A) Prek me shpesh femrat e moshës 30 deri ne 50 vjeç
- B) Mungon ekzoftalmia
- C) Funkzioni kardiak është normal
- D) Mungon osteoporozia

Infermieri Pyetja: 960

Rreziqet e hipotiroidizmit janë Të gjitha përveç:

- A) Koma miksedematoze
- B) Aksidentet kardiake
- C) Prania e astenise
- D) Nervoziteti

Infermieri Pyetja: 961

Është i pranishem diabeti kur glicemia esell ne dy dozime është me e lartë se:

- A) 2.40 g/l
- B) 1.40 g/l
- C) 0.20 g/l
- D) 0.10 g/l

Infermieri Pyetje: 962

Ne komplikacionet metabolike akute të diabetit hyjen të gjitha përveç:

- A) Acidoketoza
- B) Koma hiperosmolare
- C) Mikroangiopatia diabetike
- D) Hipoglicemite

Infermieri Pyetje: 963

Diabeti i tipit të parë mjekohet me :

- A) Daonil
- B) Metformine
- C) Insuline
- D) Dietë hiperkalorike

Infermieri Pyetje: 964

Diabeti i tipit të dytë mjekohet me:

- A) Daonil, metformine
- B) Insuline
- C) Diete hiperkalorike
- D) Kufizim i aktivitetit fizik

Infermieri Pyetje: 965

Presion arterial normal konsiderohen vlerat e mëposhtme:

- A) Sistoliku me i vogël se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogël se 90 mmhg
- B) Sistoliku me i madh se 140 mmhg dhe diastoliku me i madh se 90 mmhg
- C) Sistoliku ndërmjet 160-180 mmhg dhe diastolike 90-120 mmhg
- D) Sistoliku me i madh se 190 mmhg dhe diastoliku me i madh se 100 mmhg

Infermieri Pyetja: 966

Hipertension arterial pragu konsiderohet :

- A) Me shume se 180 mmhg dhe/ose me shume se 105
- B) Sistolike 140-180 mmhg dhe/ose diastolike 90-105
- C) Sistoliku 140-180 mmhg dhe/ose diastoliku 90-95
- D) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90 mmhg

Infermieri Pyetja: 967

Mjekimi i hipertensionit arterial perfshin Të gjitha përveç :

- A) Aktivitetin fizik
- B) Shtimin ne peshë
- C) Kufizimin e kripes
- D) Lenien e alkolit

Infermieri Pyetja: 968

Mjekimi farmakologjik i hipertensionit arterial perfshin Të gjitha përveç :

- A) Metotreksat
- B) Betablokues
- C) Ace inhibitorë
- D) Antagoniste te kalciumit

Infermieri Pyetja: 969

Panusi është strukture histologjike qe vihet re tek te sëmurët me :

- A) Lupus Eritematoz Sistemik
- B) Sklerodermi difuze
- C) Artrit Reumatoid
- D) Dermatomiozit



Infermieri Pyetja: 970

Manifestimi me i zakonshem dhe nga me te hershmit qe vihet re ne Morbus Bekteriev është :

- A) Rashi malar ne forme fluture
- B) Artriti simetrik i artikulacioneve Të vogla te duarve
- C) Sakroileiti
- D) Polifagi dhe polidipsi

Infermieri Pyetja: 971

Pielonefriti:

- A) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te sipërme urinare
- B) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te poshtme urinare
- C) Nuk është i dhimbshem
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetja: 972

Hipotiroidizmi shfaqet me simptomat e meposhtme përveç:

- A) Krampe muskulare
- B) Tolerance ndaj te ftohtit
- C) Konstipacion
- D) Gjendje te pergjumur

Infermieri Pyetja: 973

Cili nga medikamentet konsiderohet si linja e parë e mjekimit ne depresionin madhor dhe crregullimin obsesiv kompulsiv?

- A) Inhibitorët selektive te rikapjes se serotoninës
- B) Antidepresantet triciklike
- C) Stabilizuesit e humorit
- D) Benzodiazepinat



Infermieri Pyetja: 974

Cila prej përgjigjeve tregon pranimin e tolerancës ndaj opioideve?

- A) Për të kontrolluar dhimbjen nevojiten doza më të mëdha opioidesh krahasuar me atë që mjaftonte javët e para
- B) Duhet dhënë stimulantë për të balancuar efektet sedative të opioideve
- C) Pacienti bëhet anksioz kur kujton orën kur duhet të marrë opioidet
- D) Pacienti nuk ka konstipacion pas marrjes së dozave të zakonshme të opioideve

Infermieri Pyetja: 975

Një pacient 53 vjeçar, i cili mjekohet me ibuprofen 400mg dy herë në ditë për të kuruar dhimbjen kronike të mesit krijon edemë e ekstremiteteve të poshtme. Infermierja që kujdeset për të mendon se edema është rezultat i :

- A) Uljes të funksionit renal
- B) Uljes së nivelit të kreatinines
- C) Rritje të filtrimit glomerular
- D) Rritje të nivelit të proteinave plazmatike

Infermieri Pyetja: 976

Cila prej sëmundjeve të mëposhtme muskulo-skeletike karakterizohet nga prania e nyjeve të Heberdenit?

- A) Lupusi eritematoz sistemik
- B) Artriti reumatoid
- C) Sclerodermia
- D) Osteoporoza

Infermieri Pyetja: 977

Sindroma Kushing :

A) Është sëmundje qe vjen si pasoje e zvoglimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra mbiveshkorë

B) Është sëmundje qe vjen si pasoje e shtimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra mbiveshkorë

C) Është sëmundje qe karakterizohet nga dhimbja e mesit dhe ngurtesimi mengjezor

D) Ne kete sëmundje mungojne shenjat e virilizmit si depozitimi i dhjavit ne regjionet ndermje shpatullave

Infermieri Pyetja: 978

Karakteristike per sindromen Kushing është prania e Të gjithave, përveç :

A) Hiperkalemise

B) Alkalozës metabolike

C) Prodhimit ektojik të ACRH

D) Artriti simetrik i artikulacioneve interfalangeal proksimale

Infermieri Pyetja: 979

Terapia e spondilitit ankilozant perfshin:

A) Vetem terapi medikamentoze

B) Terapi medikamentoze dhe fizike

C) Levotiroskine dhe deksametazon

D) Desmopresine dhe indometacine

Infermieri Pyetja: 980

Te sëmurët me poliarterit nodoz kutan kanë:

A) Renie ne peshë

B) Temperature

C) Dëmtime ne organe

D) Noduse subkutane

Infermieri Pyetja: 981

Ne sklerodermine e lokalizuar ka dëmtime vetem:

- A) te miokardit
- B) renale
- C) gastrointestinale
- D) te anesive

Infermieri Pyetja: 982

Arteriti Takayasu:

- A) Eshtë inflamacion granulomatoz i arterive ë vogla
- B) Eshtë inflamacion granulomatoz i arterieve të mëdha
- C) Eshtë inflamacion granulomatoz i arterieve të mesme
- D) Nuk është inflamacion granulomatoz

Infermieri Pyetja: 983

Ne mjekimin e pneumonise perdorën me shpesh preparatet e meposhtme përveç:

- A) Ampicilina
- B) Ceftazidina
- C) Eritromicina
- D) Metotreksati

Infermieri Pyetja: 984

Cirroza e mëlçisë mund te shkaktohet nga faktorët e meposhtem përveç:

- A) Hepatitit B
- B) Hepatitit C
- C) Alkolit
- D) Hepatitit A

Infermieri Pyetja: 985

Ne hepatitin alkolik

- A) Vlerat e aspartat aminotransferazes (GPT) janë ne norme
- B) Vlerat a aspartat amiontransferazes (GPT) janë thujse dy here me te larta se ato te alanin aminotransferazes (GOT)
- C) Bilirubina është ne norme
- D) Pacienti nuk ka ndryshime te orëksit

Infermieri Pyetja: 986

Mjekimi i cirrozës alkoholike përfshin Të gjitha përveç :

- A) Diete
- B) Nderprerje te marrjes e alkolit
- C) Vitamin terapi
- D) Voltaren ne doze te lartë

Infermieri Pyetja: 987

Osteoporoza mjekohet me :

- A) Bifosfonate
- B) Kripra te arit
- C) D- penicilamine
- D) Azatioprine

Infermieri Pyetja: 988

Osteoartriti është: semundje:

- A) inflamatorë muskuloskeletike
- B) degjenerative muskuloskeletike
- C) endokrine
- D) gjenetike

Infermieri Pyetja: 989

Glukokortikosteroidet e injektueshem ne artikulacione indikohen te perdorën ne patologjite muskuloskeletike :

- A) Inflamatorë

- B) Mekanike
- C) Ne prani te osteoporozes
- D) Ne prani te frakturave

Infermieri Pyetja: 990

Pneumonia atipike karakterizohet nga keto shenja perveç:

- A) Dobesi trupure
- B) Dhimbje koke
- C) Kolle e thate
- D) Melena

Infermieri Pyetja: 991

Të gjitha sa me poshte janë te vërteta per IRA postrenale përveç:

- A) Është mjaft e shpështë ndermjet te semureve ambulatorë
- B) Prek me shume burrat sesa gratë
- C) Ne shumicen e rasteve i detyrohet bllokimit uretral.
- D) Shkaktohet nga medikamente qe reduktojne filtrimin glomerular

Infermieri Pyetja: 992

Cili incision lejon nje nderhyhet ne te njejten kohe ne kavitetin torakal dhe abdominal?

- A) Sternotomia
- B) Toraco-freno-laparotomik
- C) Median
- D) Bisubcostal

Infermieri Pyetja: 993

Fijet e polipropilenit janë fije:

- A) Natyrale
- B) Artificiale
- C) Sintetike

D) Vegjetale



Infermieri Pyetja: 994

Sonda Sengstaken -Blakemorë perdorët per:

- A) Kateterizimin e vezikes urinare
- B) Hemostazen e variceve te ezofagut
- C) Tharjen e sekrecioneve gastrike
- D) Enteroklizma

Infermieri Pyetja: 995

Dreni Kehr perdorët per drenimin e:

- A) Rrugeve biliare/biles
- B) Kolonit/duodenit
- C) Toraxit
- D) Abceseve



Infermieri Pyetja: 996

Skleroterapia ne endoskopi perdorët ne:

- A) Heqjen e trupave te huaj
- B) Zgjerimin e stnozave te aparatit tretes
- C) Hemostazen endoskopike
- D) ERCP pankreato-kolangiografia retrograde endoskopike

Infermieri Pyetja: 997

Cila nga keto nuk është komplikacion i menjehershem pas operacionit?

- A) Obstruksioni i rrugeve te ajrit
- B) Nauze dhe te vjella
- C) Infeksioni i plagës
- D) Ankthi dhe dhimbja





Infermieri Pyetja: 998

Ne reaksionin e alarmit, pergjigja neuronale realizohet nga:

- A) Hormonet
- B) Riekuilibri hidro-elektrolitik
- C) Katekolaminat
- D) Reaksionet hemodinamike

Infermieri Pyetja: 999

Solucionet e glukozes 10%, 20% dhe 33% injektohen ne sistemet:

- A) venoze periferike
- B) venoze qendrorë
- C) arteriale periferike
- D) arteriale qendrorë



Infermieri Pyetja: 1000

Cila nga keto nuk është komplikacion I menjehershem i nderhyrjeve venoze qendrorë?

- A) Hematoma lokale
- B) Pneumotoraksi
- C) Ndryshimet kardiake
- D) Infeksionet



Infermieri Pyetje: 1001

Cila nga këto nuk është shenjë klinike e embolizimit me gaz?

- A) Insuficienca kardiocirkulatorë/ cianoza
- B) Polipnea
- C) Hiperglicemi
- D) Dhimbja

Infermieri Pyetje: 1002

Cila nga këto nuk është komplikacion i mëvonshëm i ndërhyrjeve venoze qendrore?

- A) Infeksioni
- B) Thyerja e kateterit
- C) Hematoma lokale
- D) Tromboza e thellë venoze

Infermieri Pyetje: 1003

Këto janë ndryshimet në qarkullimin venoz në ulçerat venoze të këmbës përveç njëres:

- A) Mungesa e valvulave të thella
- B) Bllokimi i venave të thella
- C) Fistula arterio-venoze
- D) Hipotensioni arterial

Infermieri Pyetje: 1004

Cila nga këto nuk është shkak i krijimit të ulçerave diabetike?

- A) Mikro/makro angiopatia
- B) Dëmtimet trofike nga pakesimi i qarkullimit të gjakut
- C) Bllokimet e venave të thella
- D) Prirja për infeksione

Infermieri Pyetje: 1005

Sindromat e imobilizimit kanë të bëjnë me ulcerat:

- A) nga dekubituset
- B) arteriale
- C) diabetike
- D) neuropatike

Infermieri Pyetje: 1006

Këto janë kushtet e zhvillimit të infeksionit në plagët kirurgjikale përveç njërit:

- A) Vaskularizimi i keq
- B) Prania e trupave të huaj dhe nekrozave
- C) Flora polimikrobiale
- D) Lloji i antibiotikut të përdorur

Infermieri Pyetje: 1007

Këto janë faktorët e përgjithshëm që vonojnë shërimin e plagëve, përveç:

- A) Dehidrimi i të sëmurit
- B) Mosha e madhe
- C) Hipoproteinemia
- D) Prania e trupave të huaj në plagë

Infermieri Pyetje: 1008

Këto janë faktorët lokalë që vonojnë shërimin e plagëve, përveç:

- A) Infeksioni bakterial i plagës
- B) Defiçitet e vitaminave
- C) Hematomat
- D) Indet e devitalizuara

Infermieri Pyetje: 1009

Një plagë quhet e kontaminuar kur kalojnë se paku:

- A) 1-2 orë
- B) 4 orë
- C) 8 orë
- D) 16 orë

Infermieri Pyetje: 1010

Matja e nivelit të albuminës në gjak lidhet me cilin nga parametrat e vlerësimit të ushqyerjes së një pacienti?

- A) Klinike
- B) Antropometrik
- C) Biohumorale
- D) Imunologjike

Infermieri Pyetje: 1011

Sa është BMI (Body mass index) në njerëzit normale?

- A) 15-20 kg/m²
- B) 20-25
- C) 25-30
- D) 30-35

Infermieri Pyetje: 1012

Cila nga keto nuk është patologji e menjehershme dhe fillestare e stomakut të aparatit tretës?

- A) Pezmatimi i lëkurës
- B) Fistula
- C) Hemorragjia
- D) Edema

Infermieri Pyetje: 1013

Cila nga këto nuk është patologji e vone të stomakut (gojezave) të aparatit tretës?

- A) Terheqja, mbledhja e gojezës
- B) Granuloma
- C) Fistula
- D) Hernie

Infermieri Pyetje: 1014

Cila nga patologji është shkak i abdomenit akut JO-Kirurgjikal?

- A) Apendisiti akut
- B) Keto-acidoza diabetike
- C) Divertikuliti (divertikuli i zorrës së hollë/trashë)
- D) Infarkti intestinal

Infermieri Pyetje: 1015

Cila nga këto patologji është shkak i abdomenit akut Kirurgjikal?

- A) Patologji të metabolike dhe endokrine
- B) Sëmundjet reumatizmale dhe të kolagjenit
- C) Insuficienca mbiveshkore
- D) Sindromi okluziv nga invaginacioni i zorrës

Infermieri Pyetje: 1016

Cili nuk është shkak i dhimbjes në abdomenin akut kirurgjikal?

- A) Hemoragjia peritoneale
- B) Tranziti intestinal
- C) Bllokimi i tranzitit
- D) Ischemia/infarkti intestinal

Infermieri Pyetje: 1017

Karakteret dhe shkallat e ndryshimeve që ndodhin në organizmin e të operuarit, të varen nga këto faktorë përveç njerit:

- A) Nga lloji i anesteziës
- B) Nga lloji i analizave dhe ekzaminimeve preoperatorë
- C) Nga përgatitja preoperatorë
- D) Nga gjendja e të sëmurit para operacionit

Infermieri Pyetje: 1018

Pneumotoraksi nuk shkaktohet nga:

- A) traumat
- B) një patologji neoplazike e pulmonit
- C) aplikimi i sistemeve totalisht të qëndrueshme
- D) hipertensioni

Infermieri Pyetje: 1019

Ka kapsul piogjene:

- A) Abscesi
- B) Flegmona
- C) Celuliti
- D) Forunkula

Infermieri Pyetje: 1020

Nuk është e vërtetë për obezitetin:

- A) Haset shpesh
- B) Gjendet me shumë në meshkujt
- C) Faktore predispozues mund të jete rritja e estrogenëve në gjak
- D) Lidhet me nënshqyerjen

Infermieri Pyetje: 1021

Nuk është sëmundje kirurgjikale:

- A) Ulcera e përforuar
- B) Kanceri i stomakut
- C) Ulcera stenozante grada IV
- D) Diabeti melitus

Infermieri Pyetje: 1022

Përben urgjencë kirurgjikale:

- A) Kalkuloza e kolecistit
- B) Akalazia e ezofagut
- C) Hernia strangulative
- D) Noduli i ftohtë i tiroidës

Infermieri Pyetje: 1023

Kanceri i gjirit prek më shpesh kuadrantin:

- A) medial të sipërm
- B) medial të poshtëm
- C) lateral të sipërm
- D) lateral të poshtëm

Infermieri Pyetje: 1024

Përdorimi i garzave hyn në:

- A) Antiseptikën fizike
- B) Antiseptikën kimike
- C) Antiseptikën mekanike
- D) Antiseptikën biologjike

Infermieri Pyetje: 1025

Në pozicionimin e pacientit në tavolinën e operacionit duhet pasur parasysh të gjitha të poshtëshënuara përveç:

- A) Të evitohet komprimimi abdominal i tejzgjatur
- B) Të përdoren metodat që parandalojnë dekubituset
- C) Të evitohet aplikimi për kohë të gjatë në gjymtyrë i lakut hemostatik
- D) Të pozicionohet pacienti si ndihet më mirë

Infermieri Pyetje: 1026

Sindromi Dumping është komplikacion i kirurgjisë së:

- A) duodenit
- B) stomakut
- C) kolecistës
- D) heparit

Infermieri Pyetje: 1027

Nuk është urgjencë ekstreme kirurgjikale:

- A) Ruptura e lienit
- B) Ruptura kataklizmike e barrës ekstrauterine
- C) Embolia arteriale mezenteriale
- D) Kolecistiti akut kalkuloz

Infermieri Pyetje: 1028

Defibrilatori nuk është:

- A) Një pajisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të kontrolluar për të ndërprerë një aritmi
- B) Një pajisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të pakontrolluar për të ndërprerë një aritmi
- C) Një pajisje që ushqehet me bateri të karikueshme ose rrjet i vazhdueshëm tensioni
- D) Një pajisje që realizon shkarkesën të pacientit me anë të dy elektrodave

Infermieri Pyetje: 1029

Salla e operatorëve është vendi ku:

- A) trajtohen kirurgjikalisht të sëmurët
- B) shtrohen për trajtim pacientët
- C) shtrohen për trajtim pacientët kirurgjikal
- D) trajtohen intensivisht të sëmurët kirurgjikal

Infermieri Pyetje: 1030

Është parimi më i rëndësishëm në ndarjen në dhoma të të sëmurëve kirurgjikal:

- A) Moshë
- B) Seksi
- C) Asepsia
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 1031

Nuk është karakteristike në ileusin mekanik:

- A) Stop i fecëve dhe gazrave
- B) Nauze e të vjella
- C) Dhimbja abdominale
- D) Mungesa e hidroniveleve në radiografi

Infermieri Pyetje: 1032

Agjenti më i vlefshëm i përdorur si sterilizues në autoklav është:

- A) Ajri ujor nën presion
- B) Forma e autoklavit
- C) Koha
- D) Nxehtësia

Infermieri Pyetje: 1033

Cila nga të mëposhtmet nuk është komplikacion i ulçerës gastrike:

- A) hemorragjia
- B) stenoza
- C) degjenerim neoplazik
- D) refluksi i lëngut biliar

Infermieri Pyetje: 1034

Divertikuli i Zenkerit ka të bëjë me:

- A) zgjerimin në pikën e bashkimit të faringut me ezofagun
- B) zgjerim në bifurkacionin e trakesë
- C) zgjerim në pjesën fundore të ezofagut
- D) mungesë e lirit të sfinkterit të poshtëm ezofageal

Infermieri Pyetje: 1035

Nuk është karakteristike e fazës akute të infeksionit :

- A) Dhimbja
- B) Temperatura
- C) Leukopenia
- D) Hiperemia

Infermieri Pyetje: 1036

Është inflamacion i gjendrave limfatike:

- A) Limfadeniti
- B) Celuliti
- C) Furunkuli
- D) Limfangoidi

Infermieri Pyetje: 1037

Nuk është e vërtetë për ushqimin parenteral që:

- A) Është ushqim artificial i pacientit kirurgjikal
- B) Merret me rrugë venoze
- C) Merret me rrugë arteriale
- D) Merret kur ushqimi oral ose enteral janë të pamundura

Infermieri Pyetje: 1038

Cila nga këto plagë është e pastër?

- A) plagë traumatike e bërë brenda 8 orëve të para
- B) plagë nga djegiet
- C) plagë operatore
- D) plagë traumatike nga mjete prerëse sterile

Infermieri Pyetje: 1039

Portagia është instrument kirurgjikal që përdoret:

- A) për të suturuar
- B) për të diveriguar
- C) për të mbajtur agen
- D) për të mbajtur lamën

Infermieri Pyetje: 1040

Kirurgji mini-invazive quhet:

- A) Lapartomia
- B) Torakotomia
- C) Laparoskopia
- D) Endoskopia

Infermieri Pyetja: 1041

Nuk  sht  urgjence kirurgjikale:

- A) Hemorragjia digjестive
- B) Ulcer bulbi duodeni e p rforuar
- C) Kalkuloza e kolecistes
- D) Apendiciti akut

Infermieri Pyetja: 1042

Antiseptik n nuk e ndajm  n :

- A) Fizike
- B) Kimike
- C) Biologjike
- D) Vaskulare

Infermieri Pyetja: 1043

Fluktuacioni  sht  karakteristik p r:

- A) Flegmon n
- B) Limfangoidin
- C) Abscesin
- D) Celulitin

Infermieri Pyetja: 1044

Fibrogastroskopia mund te jete mjet trajtimi p r:

- A) Hemorragjine digjестive
- B) P rforacionin e ulcers duodenale
- C) Stenozen pylorike
- D) P ritonitin post ulceres se p rforuar

Infermieri Pyetje: 1045

Nuk ndodh në hemorragji gastrointestinale:

- A) Melena
- B) Hemoptizia
- C) Hematemeza
- D) Anemia

Infermieri Pyetje: 1046

Janë karakteristike në ileusin mekanik përveç:

- A) Stop i feçeve dhe gazrave
- B) Nauze e të vjella
- C) Prania e hidroniveleve në radiografi
- D) Diarre masive

Infermieri Pyetje: 1047

Nuk është komplikacion i nderhryjeve venoze qendrore:

- A) Pneumotoraksi
- B) Nenushqyerjai
- C) Limforrea
- D) Embolia

Infermieri Pyetje: 1048

Janë karakteristike të fazës akute të infeksionit përveç:

- A) Dhimbja
- B) Temperatura
- C) Leukocitoza
- D) Cianoza

Infermieri Pyetje: 1049

Nuk është e vërtetë për abscesin:

- A) Prania e kapsulës piogjene
- B) Prania e fluktuacionit
- C) Mund të jetë i nxehtë/i ftohtë
- D) Ndodh vetëm nën lëkurë

Infermieri Pyetje: 1050

Është inflamacion i gjendrave të djersës:

- A) Adeniti
- B) Celuliti
- C) Hidroadeniti
- D) Furunkuli

Infermieri Pyetje: 1051

Infeksioni rrugëve limfatike quhet:

- A) Mastit
- B) Limfadenit
- C) Limfangoid
- D) Furunkul

Infermieri Pyetje: 1052

Tiroidja prodhon:

- A) Serotonine
- B) Kalcitonine
- C) Histamine
- D) Glukagon

Infermieri Pyetja: 1053

Kalcitonina ben:

- A) Uljen e Kalciumit ne lengun jashteqelizor
- B) Rritjen e kalciumit ne lengun jashteqelizor
- C) Uljen e depozitimit te kalciumit ne kocka
- D) Rritjen e kalciumit ne urine

Infermieri Pyetja: 1054

Origjina etiologjike e tiroiditit akut eshte:

- A) Virale
- B) I panjohur
- C) Infektive
- D) Autoimmune

Infermieri Pyetja: 1055

Tiroiditi kronik sklerotik Riedel jep keto shenja klinike pervec:

- A) Dispne
- B) Disfoni
- C) Hipotiroidizem
- D) Tetani

Infermieri Pyetja: 1056

Cila nga keto nuk eshte komplikacion i kirurgjise se tiroideve (tiroidektomise)?

- A) Disfoni
- B) Tetani
- C) Infeksion, sepsis
- D) Krize tirotoksike

Infermieri Pyetja: 1057

Karakteristikat klinike te morbus Basedow jane keto pervec:

- A) Takikardi
- B) Ekzoftalmi
- C) Shqetesime/pagjumesi
- D) Shtim ne peshe

Infermieri Pyetja: 1058

Hemotoraksi shkaktohet nga keto gjendje pervec:

- A) Infarkt pulmonar
- B) Infeksion
- C) Trauma
- D) Neoplazi

Infermieri Pyetja: 1059

Cila nga keto nuk eshte shenje e nje mediastiniti akut?

- A) Dhimbje
- B) Hemotoraks
- C) Kolle
- D) Disfagi

Infermieri Pyetja: 1060

Mezotelioma eshte tumor i:

- A) Bronkeve
- B) Parenkimes pulmonare
- C) Mediastinit
- D) Pleures

Infermieri Pyetja: 1061

Mastopatia fibrocistike prek grate e moshes:

- A) 20-25 vjec
- B) 25-45 vjec
- C) 40-50 vjec
- D) 50-60 vjec

Infermieri Pyetja: 1062

Dhimbja si shenjë e kancerit të stomakut është:

- A) E hershme
- B) Gjatë zhvillimit të sëmundjes
- C) E vonshme
- D) Gjatë gjithë kohës

Infermieri Pyetja: 1063

Akalazia e ezofagut është:

- A) Zgjerim i ezofagut në formë trastëzash
- B) Mungesa e lirimit të sfinkterit të poshtëm ezofageal
- C) Zhvendosja e stomakut në kraharor nëpërmjet hiatusit diafragmatik
- D) Mungesa e lirimit të sfinkterit të sipërm ezofageal

Infermieri Pyetja: 1064

Cili nga këto është shkak i divertikulit të traksionit në ezofag?

- A) Rritja e presionit intraluminal
- B) Djegiet e ezofagut
- C) Ulcerat e ezofagut
- D) Proceset cikatrizuese trakeobronkiale të puthitura me ezofagun

Infermieri Pyetje: 1065

Biliomat janë pasoja të traumës së:

- A) Stomakut
- B) Duodenit
- C) Heparit
- D) Rrugeve biliare të jashtme

Infermieri Pyetje: 1066

Këto janë shkaqet e abscesit hepatic përveç:

- A) Stenoza biliare
- B) Hipertensioni portal
- C) Kalkuloza biliare
- D) Infeksion i përgjithshëm

Infermieri Pyetje: 1067

Pasojat e kolangitit sklerotizues janë këto përveç:

- A) Cirroza
- B) Hipertensioni portal
- C) Kalkuloza e kolecistës
- D) Variçet e ezofagut

Infermieri Pyetje: 1068

Ikteri nga deficitet enzimatike (semundja Crigler-Mayor) ka natyrë:

- A) Prehepatike
- B) Hepatike
- C) Post hepatike
- D) Idiopatik

Infermieri Pyetja: 1069

Cila nga keto nuk eshte nderlikim pas kolecistektomise (heqjes kirurgjikale te kolecistes)
?

- A) Fistul biliare
- B) Hemoragji
- C) Demtim i rrugeve biliare
- D) Gure ne rruget biliare

Infermieri Pyetja: 1070

Cila nga keto nuk eshte nderlikim i litiazes se kolecistes?

- A) Fistula biliare
- B) Pezmatimi
- C) Kalkuloza intrahepatike
- D) Hemobilia

Infermieri Pyetja: 1071

Incizioni ne piken Mc Burney kryhet per:

- A) Kolecistektoni
- B) Apendektomi
- C) Hernie te paretit abdominal
- D) Kalkuloze biliare

Infermieri Pyetja: 1072

Cili nga keto nuk eshte nderlikim postoperator i hernies inguinale ?

- A) Hematoma e sakusit scrotal
- B) Atrofi testikulare
- C) Përforacion i zorreve
- D) Ileusi

Infermieri Pyetje: 1073

Cili nga këto nuk klasifikohet në tumore retroperitoneale?

- A) Tumori renal
- B) Lipoma
- C) Leiomioma
- D) Hemangiosarkoma

Infermieri Pyetje: 1074

Cila nga këto nuk është klinike e fibrozës retroperitoneale?

- A) Ikteri
- B) Tromboflebitet
- C) Diarre
- D) Dhimbje

Infermieri Pyetje: 1075

Cila nga këto nuk është shenjë e neoplazive retroperitoneale?

- A) Hemoragji gastrointestinale
- B) Ikteri
- C) Tromboza venoze
- D) Dizuria

Infermieri Pyetje: 1076

Cila nga këto nuk është shenjë e insulinomes?

- A) Hipoglicemia
- B) Halucinacione
- C) Cefale
- D) Ikter

Infermieri Pyetja: 1077

Vipoma (sekretimi i peptidit vazokativ intestinal) nuk shoqerohet me cilen?

- A) Diarre
- B) Hipokalemi
- C) Hipobilirubinemi
- D) Hipokloremit

Infermieri Pyetja: 1078

Cila nga këto nuk është komplikacion i cistektomise?

- A) Hemoragjia
- B) Tromboza venoze e thelle
- C) Laparocela
- D) Retensioni urinar

Infermieri Pyetja: 1079

Cila nga këto nuk është komplikacion i prostatektomise?

- A) Hemoragjia
- B) Sepsisi abdominal
- C) Inkontinenca (mosmbajtja e urinës)
- D) Anemia

Infermieri Pyetja: 1080

Cila nga këto nuk është shkak i hidronefrozes?

- A) Litiaza (guret) ne sistemin urinar
- B) Keqformimet
- C) Fibroza retropëritonela
- D) Dizuria

Infermieri Pyetja: 1081

Deri ne çfarë stadi sipas klasifikimit te Leriche-Fontaine te stenozes ateromatoze te pjeses iliako-femorale merret ne considerate terapia medikamentoze?

- A) Stadi I
- B) Stadi II a
- C) Stadi II b
- D) Stadi III

Infermieri Pyetja: 1082

Kirurgjia ne aneurizmen abdominale merret ne konsiderate kur aneurizmi ka diameter:

- A) > 2cm
- B) >3 cm
- C) > 5 cm
- D) > 7 cm

Infermieri Pyetja: 1083

Cila nga këto nuk është simptome e tromboembolise arteriale?

- A) Dhimbje
- B) Mungese pulsi
- C) Zbehtesi
- D) Hemoragji

Infermieri Pyetja: 1084

Gjaku rrjedh ne venat e kembes i shtyre nga këto faktore përvec njëres:

- A) Presioni arterial
- B) Kontraksionet e muskujve te kembes
- C) Shtyrja nga valvulat e venave
- D) Aspiracioni kardio torakal

Infermieri Pyetje: 1085

Aneurizma është:

- A) Semundje degjeneruese me grumbullimin e qelizave me prejardhje nga indi lidhor, lipide etj
- B) Zgjerim i vazhdueshëm e i qëndrueshëm i një arterie për shkak të ndryshimeve në muret e saj
- C) Bllokim akut i një arterie ardhur nga trombet në arteriet me demtime të shtresës intime
- D) Çarje gjatësore e tunike media të arteries

Infermieri Pyetje: 1086

Cila nga këto nuk bën pjesë në etiopatogjenezën e tromboflebitëve sipërfaqësorë?

- A) Hipërkoagulabiliteti
- B) Demtimet parietale
- C) Hipotensioni arteria
- D) Shtjellat e rrjedhës së gjakut

Infermieri Pyetje: 1087

Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm:

- A) Rreth moshës 3-4 vjeç
- B) Rreth moshës 4-5 vjeç
- C) Rreth moshës 6-7 vjeç
- D) Rreth moshës 8-9 vjeç

Infermieri Pyetje: 1088

Quhet fëmijë prematur:

- A) Fëmija i lindur para 37 javësh moshë shtatzënie
- B) Fëmija që lind para 37 javësh moshë shtatzënie dhe me peshë nën 2500 g
- C) Fëmija i lindur pas 42 javësh moshë shtatzënie
- D) Fëmija që lind ndërmjet 37 dhe 42 javësh moshë shtatzënie

Infermieri Pyetje: 1089

Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Kushtet social-ekonomike
- B) Klima tropikale
- C) Sëmundjet kronike pas lindjes
- D) Faktorët gjenetikë

Infermieri Pyetje: 1090

Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 10 muaj
- C) 8 muaj
- D) 5 muaj

Infermieri Pyetje: 1091

Vitamina D merr pjesë në:

- A) Mineralizimin e kockës
- B) Aktivitetin nervor
- C) Pjekurinë seksuale
- D) Hematopoezë

Infermieri Pyetje: 1092

Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:

- A) 8 muaj
- B) 12 muaj
- C) 1.5 vjeç
- D) 2 vjeç

Infermieri Pyetje: 1093

Gjatësia e fëmijës në lindje është rreth:

- A) 60 cm
- B) 50 cm
- C) 40 cm
- D) 30 cm

Infermieri Pyetje: 1094

Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:

- A) Hormonet seksuale
- B) Kushtet social-ekonomike
- C) Hormonet e tiroides
- D) Hormoni somatotrop

Infermieri Pyetje: 1095

Encefalopatia bilirubinike tek një fëmijë në term shfaqet kur vlera e bilirubinës serike arrin vlera:

- A) më të larta ose të barabarta me 20 mg/dl
- B) më të larta ose të barabarta me 18 mg/dl
- C) më të larta ose të barabarta me 15 mg/dl
- D) më të larta ose të barabarta me 10 mg/dl

Infermieri Pyetje: 1096

Për infeksionin nga Rubeola Kongenitale janë të vërteta të gjitha me përjashtim të:

- A) Prek fetusin me rrugë transplacentare
- B) Shkakton vonesë në rritjen intrauterine dhe anemi tek bebi
- C) Ka në përdorim metoda parandalimi.
- D) Është një nga shkaqet e prematurancës

Infermieri Pyetje: 1097

Infeksioni neonatal nuk ka:

- A) Hipotermi
- B) Hipoglicemi
- C) Hipobilirubinemi
- D) Ulje të frekuencës kardiake

Infermieri Pyetje: 1098

Apgari është:

- A) Sëmundje ngjitëse e neonatit
- B) Keqformim i lindur
- C) Sëmundje e sistemit kardiorëspirator
- D) Sistem vlerësues i shenjave të neonatit

Infermieri Pyetje: 1099

Përbëjnë kundërrindikacion absolut për ushqyerjen me gji të gjitha me përjashtim të:

- A) HIV i nënës
- B) Insuficiencë kardiake e dekompenzuar e nënës
- C) TBC aktiv i nënës
- D) Ragadeti e gjirit të nënës

Infermieri Pyetje: 1100

Fëmija katërfishon peshën e lindjes në moshën:

- A) 1 vjeç
- B) 1.5 vjeç
- C) 2 vjeç
- D) 5 vjeç

Infermieri Pyetje: 1101

Proteina C reaktive është e rritur në të gjitha rastet, me përjashtim të:

- A) Meningjitit
- B) Sepsisit
- C) Pneumonisë
- D) Hipoksisë nga një lindje e vështirë

Infermieri Pyetje: 1102

Tetanozi neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Shkakton sepsis
- B) Shkakton kontraktura muskulare
- C) Shkakton fraktura të kockave
- D) Shkakton trismus

Infermieri Pyetje: 1103

Për fototerapinë janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Vepron duke zbërthyer bilirubinën kutane
- B) Ndhmon në uljen e nivelit të bilirubinës së palidhur
- C) Nuk ekziston një vlerë e përcaktuar e nivelit të bilirubinës tek të gjithë neonatët për fillimin e fototerapisë
- D) Përdorimi i saj nuk e parandalon shfaqjen e encefalopatisë bilirubinike

Infermieri Pyetje: 1104

Fëmijë postmatur quhet i linduri:

- A) përpara 37 javësh moshë shtatzënie
- B) me peshë nën 2500 g
- C) pas javës 42 të shtatzënisë
- D) nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie

Infermieri Pyetje: 1105

Infeksioni neonatal ka të gjitha shenjat klinike të mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Temperaturë e lartë
- B) Rash kutan (njolla të kuqe në lëkurë)
- C) Ikter
- D) Hiperglicemi

Infermieri Pyetje: 1106

Mekonium quhet:

- A) Qumështi i ditëve të para pas lindjes
- B) Një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal
- C) Një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna
- D) Jashtëqitja e parë e bebit

Infermieri Pyetje: 1107

Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin:

- A) Frekuencën kardiake
- B) Tonusin muskular
- C) Frekuencën respiratorë
- D) Reflekset primare

Infermieri Pyetja: 1108

Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të:

- A) Rubeola kongenitale
- B) Toksoplazmoza kongenitale
- C) CMV kongenital
- D) Hepatiti b kongenital

Infermieri Pyetja: 1109

Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të:

- A) Hipotermisë
- B) Hiperglicemisë
- C) Hepatosplenomegalisë
- D) Bombimit të fontanelës

Infermieri Pyetja: 1110

Kern ikteri shkaktohet nga:

- A) Fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunorë
- B) Fillimi i parakohshëm i ablaktacionit
- C) Anemia nga mungesa e hekurit
- D) Ikteri nga qumështi i gjirit

Infermieri Pyetja: 1111

Gjatësia e fëmijës në fund të vitit të parë është rreth:

- A) 1 m
- B) 85 cm
- C) 75 cm
- D) 50cm

Infermieri Pyetja: 1112

Ikteri tek neonati bëhet i dukshëm në lëkurë kur niveli serik i bilirubinës është:

- A) 2-4 mg/dl
- B) 5-7 mg/dl
- C) 8-9 mg/dl
- D) 10 mg/dl

Infermieri Pyetja: 1113

Terapia rehidruese orale është trajtim i zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me përjashtim të:

- A) Të vjella dhe temperaturë e lartë,
- B) Koma ose shok,
- C) Shigelozë,
- D) Helmim ushqimor

Infermieri Pyetja: 1114

Favorizojnë malnutricionin të gjitha, me përjashtim të:

- A) Infeksionet kronike
- B) Përdorimi pa kriter i antibiotikëve
- C) Rrezatim i tepruar nga rrezet e diellit
- D) Kushtet e këqija social-ekonomike

Infermieri Pyetja: 1115

Mjekimi i zgjedhur në Giardiazë është:

- A) Amikacina
- B) Mebendazoli
- C) Piperazina
- D) Metronidazoli

Infermieri Pyetje: 1116

Ndërlëkimi më i shpeshtë i Salmonelozës është:

- A) Prolapsi rektal
- B) Anemia
- C) Dehidrimet e tipeve të ndryshme
- D) Meningiti

Infermieri Pyetje: 1117

Kwashiorkor-i karakterizohet nga të gjitha shenjat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Anamnezë për mosmarrje të mjaftueshme të proteinave, por marrje relativisht e mjaftueshme e kalorive
- B) Fëmija është ushqyer vetëm me gji gjashtë muajt e parë të jetës
- C) Edema
- D) Hipoalbuminemi

Infermieri Pyetje: 1118

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë?

- A) Koprokultura
- B) Hemokultura
- C) Kërkimi për pus e gjak në feçe
- D) Gjak komplet

Infermieri Pyetje: 1119

Hymenolepsis nana transmetohet nga:

- A) Pleshti
- B) Miza
- C) Njeriu
- D) Këpusha

Infermieri Pyetja: 1120

Masat e mëposhtme duhen marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë, përveç?

- A) Lirimi i rrugëve të frymëmarrjes
- B) Oksigjenimi
- C) Përdorimi i adrenalinës
- D) Antibiotikoterapi

Infermieri Pyetja: 1121

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për dermatitin atopik?

- A) Është sëmundje me predispozitë të qartë trashëguese
- B) Lidhet me praninë e parazitëve intestinalë,
- C) Prek kryesisht adoleshentët,
- D) Lë imunitet të përjetshëm

Infermieri Pyetja: 1122

Në dehidrimin hiperton vuan më shumë:

- A) Sistemi kardiovaskular
- B) Sistemi nervor
- C) Trakti tretës
- D) Sistemi limfatik

Infermieri Pyetja: 1123

Oliva pilorike është nje mase qe palpohet

- A) Ne regjionin epigastrik
- B) Ne regjionin inguinal te majte
- C) Ne regjionin inguinal te djathte
- D) Ne Asnjërën

Infermieri Pyetje: 1124

Diarrea nga Shigella karakterizohet klinikisht nga të gjitha simptomat e mëposhtme përveç:

- A) Diarre me mukus dhe gjak
- B) Temperaturë e lartë
- C) Dhimbje barku
- D) Dhimbje koke

Infermieri Pyetje: 1125

Spazmofilia paraqitet klinikisht me shenjat e mëposhtme, përveç:

- A) Konvulsione parciale
- B) Konvulsione të gjeneralizuara
- C) Konvulsione të dukshme ose që provokohen
- D) Diarre

Infermieri Pyetje: 1126

Kraniotabes është shenjë klinike e:

- A) Rakitit
- B) Hipovitaminozës A
- C) Te dyjavë
- D) Asnjëres

Infermieri Pyetje: 1127

Kraniotabesi evidentohet duke:

- A) Marrë anamnezën e të sëmurit
- B) Shtypur kockat në regjionin oksipital
- C) Auskultuar me stetoskop
- D) Asnjërin

Infermieri Pyetja: 1128

Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është:

- A) 2 mg/kg për çdo marrje,
- B) 5 mg/kg për çdo marrje,
- C) 15 mg/kg për çdo marrje,
- D) 50 mg/kg për çdo marrje,

Infermieri Pyetja: 1129

Infiltrati eozinofilik Löffler në pulmone mund të haset në:

- A) Enterobiozë (oksiuriasë),
- B) Teniazë,
- C) Askaridozë,
- D) Sepsis nga salmonella

Infermieri Pyetja: 1130

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stnozën hipertrofike të pilorit?

- A) Të vjella që në lindje
- B) Ekziston një interval pa shenja klinike ndërmjet lindjes dhe çrregullimeve të para
- C) Ka prani të bilës në të vjella
- D) Ka humbje të orëksit

Infermieri Pyetja: 1131

Shkaktojnë çrregullime malabsorbitive të gjitha, me përjashtim të:

- A) Alergjia nga proteinat e qumështit të lopës,
- B) Dermatiti atopik,
- C) Malnutricioni proteino-kalorik,
- D) Lambliaza

Infermieri Pyetje: 1132

Sa është sasia e Tresolit që përdoret për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë?

- A) 10 mg/kg peshë
- B) 20 mg/kg peshë,
- C) 50 mg/kg peshë,
- D) 100 mg/kg peshë

Infermieri Pyetje: 1133

Tetania në fëmijët e vegjël është pasojë e:

- A) Rritjes së glicemisë,
- B) Uljes së kalciumit të jonizuar në gjak,
- C) Uljes së glicemisë,
- D) Rritjes së kalcemisë

Infermieri Pyetje: 1134

Shkaku më i shpeshtë i urtikarive është:

- A) Alergjia ushqimorë,
- B) Infeksionet virale,
- C) Alergjia medikamentoze,
- D) Idiopatik- i pa njohur

Infermieri Pyetje: 1135

Prania e leukociteve në feçe vihet re në diarrenë nga:

- A) Shigella,
- B) Viruset,
- C) Gabimet në ushqyerje,
- D) Helmimet ushqimorë

Infermieri Pyetja: 1136

Provokimi i të vjellave ka kundërrindikacion absolut në helmimet:

- A) Ushqimorë,
- B) Nga marrja e lëndëve kaustike,
- C) Nga paracetamoli,
- D) Nga valiumi

Infermieri Pyetja: 1137

Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të:

- A) Matja e presionit arterial,
- B) Thellimi i syve,
- C) Dhimbja e kokës,
- D) Niveli i fontanelës së madhe

Infermieri Pyetja: 1138

Trajtimi i stenozaës hipertrofike të pilorit:

- A) Nuk është urgjencë mjekësorë
- B) Është urgjence mjekësorë
- C) Nuk ka nevoje per ekzaminime paraprake
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetja: 1139

Shkaktarët më të shpeshtë të diarresë në fëmijë (rreth 70% e diarreve) janë:

- A) Viruset
- B) Bakteret
- C) Mykrat
- D) Asnjëri

Infermieri Pyetja: 1140

Teniat janë:

- A) Viruse,
- B) Baktere,
- C) Krimba,
- D) Myke

Infermieri Pyetja: 1141

Disa komplikacione afatgjata të diabetit janë të gjitha të poshtëshënuarat, përveç:

- A) Dëmtimi i shikimit
- B) Dëmtimi i funksionit renal
- C) Ulçera trofike kryesisht në këmbë
- D) Konvulsione

Infermieri Pyetja: 1142

Shenja Trousseau lidhet me:

- A) Hipokalceminë,
- B) Hipovitaminozën A
- C) Hipovitaminozën K
- D) Shokun anafilaktik

Infermieri Pyetja: 1143

Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është:

- A) 0.1 mg për çdo 10 kg peshë,
- B) 0.5 mg për çdo 10 kg peshë,
- C) 1 mg për çdo 10 kg peshë,
- D) 10 mg për çdo 10 kg peshë

Infermieri Pyetje: 1144

Vlerësimi i moshës kockorë bëhet më mirë me radiografinë e:

- A) Gjurit,
- B) Artikulacionit radiokarpal,
- C) Kaviljes,
- D) Bërrylit

Infermieri Pyetje: 1145

Për hipotiroidizmin kongenital janë karakteristike të gjitha, me përjashtim të:

- A) Fontanela anteriorë e posteriorë shumë të mëdha,
- B) Vonesë në pjekurinë skeletike,
- C) Ikter,
- D) Hipertension arterial

Infermieri Pyetje: 1146

Problemi nutricional më kritik i moshës parashkollorë në të gjithë botën është:

- A) i karbohidrateve,
- B) i yndyrnave,
- C) proteinik,
- D) i mineraleve

Infermieri Pyetje: 1147

Shenja Trousseau lidhet me:

- A) Hiperkalceminë,
- B) Hiponatreminë,
- C) Hipokalceminë,
- D) Hipotiroidizmin

Infermieri Pyetje: 1148

Lavazhi gastrik është i kundërlinduar në marrjen e:

- A) Aspirinës,
- B) Valiumit,
- C) Lëndëve acide,
- D) Vitaminave,

Infermieri Pyetje: 1149

Në dehidrimin e rëndë, në 2-3 orët e para të rehidrimit nuk jepet solucion:

- A) Ringer Lactat
- B) bikarbonat natriumi [NaHCO₃]
- C) fiziologjik [NaCl 0.9%]
- D) klorur kaliumi [KCl 7.5%]

Infermieri Pyetje: 1150

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigeloze?

- A) Koprokultura,
- B) Hemokultura,
- C) Ekzaminimi i feçeve për gjak e pus,
- D) Elektrolitët dhe ekuilibri acidobazik,

Infermieri Pyetje: 1151

Thithja e kalciumit në zorrë varet nga:

- A) Hormonet e tiroides,
- B) Insulina,
- C) Vitamina D,
- D) Përqëndrimi në gjak i vitaminës C,

Infermieri Pyetje: 1152

Njëra nga shenjat e mëposhtme dëshmon për stenoze hipertrofike të pilorit:

- A) Të vjellat biliare,
- B) Anorëksia,
- C) Diarrea,
- D) Të vjellat ushqimore pas ushqyerjes,

Infermieri Pyetje: 1153

Diabeti melitus karakterizohet nga keto shenja klinike, përveç:

- A) Poliuri,
- B) Polifagi,
- C) Polidipsi
- D) Shtim në peshë

Infermieri Pyetje: 1154

Diarrea infektive shkaktohet vetëm nga :

- A) Bakteret
- B) Viruset
- C) Mykrat
- D) Parazitët

Infermieri Pyetje: 1155

Çfarë vë në dukje koprokultura?

- A) Viruset
- B) Myket
- C) Bakteret
- D) Protozoarët

Infermieri Pyetje: 1156

Rakiti është sëmundje e:

- A) Skeletit të fëmijës
- B) Aparatit tretës
- C) Aparatit urinar
- D) Aparatit gjeneral

Infermieri Pyetje: 1157

Rakiti karakterizohet nga të gjitha të poshtshenuarat, përveç:

- A) Mosmineralizimi i skeletit të fëmijës
- B) Dobësi
- C) Deformim i kockave
- D) Shtim në peshë

Infermieri Pyetje: 1158

Kwashiorkor:

- A) Është sëmundje infektive bakteriale,
- B) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e yndyrnave,
- C) Shkaktohet nga krimbat e rrumbullakët intestinalë,
- D) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e proteinave, e shoqëruar me marrje disi

të mjaftueshme të kalorive

Infermieri Pyetje: 1159

Në diarrenë akute me mukus e gjak përdorën:

- A) Antidiarrikët,
- B) Antiemetikët,
- C) Antibiotikët,
- D) Opiatet

Infermieri Pyetje: 1160

Dhënia e vitaminës K tek i porsalinduri duhet të jetë:

- A) Sistematike-e detyrueshme për çdo të porsalindur
- B) E këshillueshme,
- C) E panevojshme tek fëmija që ushqehet me gji,
- D) Vetëm në rast hemorragjie të jashtme

Infermieri Pyetje: 1161

Në rakit është karakteristike:

- A) Hipokalcemia,
- B) Proteinuria,
- C) Anemia,
- D) Hiperglicemia

Infermieri Pyetje: 1162

Sa është sasia e likideve për mbushjen e shtratis vaskular në dehidrimin e mesëm?

- A) 10 ml/kg peshë,
- B) 20 ml/kg peshë,
- C) 50 ml/kg peshë,
- D) 90 ml/kg peshë

Infermieri Pyetja: 1163

Hipotiroidizmi kongenital mjekohet me:

- A) Hormonin e rritjes,
- B) L-tyroksine,
- C) Kortizonikë,
- D) Insulinë

Infermieri Pyetja: 1164

Për stenozen hipertrofike të pilorit janë të vërteta të gjitha, përveç:

- A) Është më e shpeshtë në meshkuj,
- B) Fillimisht të vjellat janë gojë-gojë, pastaj presioni shtohet,
- C) Të vjellat janë biliare,
- D) Rritja e fëmijës dëmtohet nga kjo patologji

Infermieri Pyetja: 1165

Cili nga çrregullimet e mëposhtme është i pranishëm në shokun hipovolemik?

- A) Edemat e shprehura,
- B) Hiperglicemia
- C) Hiperalbuminemia
- D) Acidoza metabolike

Infermieri Pyetja: 1166

Janë shenja të rakitit të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kraniotabes,
- B) Ngadalësimi të rritjes,
- C) Sulkusit tëi harrisonit,
- D) Skorbuti

Infermieri Pyetja: 1167

Çrregullimet alergjike mund të mjekohen me sukses me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Mënjanimit të kontaktit me alergjenin
- B) Mjekimi adekuat farmakologjik [adrenalinë, anihistaminikë],
- C) Përdorimi i barnave antimikrobike,
- D) Përdorimi i bronkodilatatorëve

Infermieri Pyetja: 1168

Karboni aktiv përdoret për trajtimin e:

- A) Intoksikacioneve në fëmijë
- B) Hipokalcemisë,
- C) Diarresë dhe/ose të vjellave,
- D) Hipokalcemisë,

Infermieri Pyetja: 1169

Diarrea infektive nga Shigella karakterizohet klinikisht nga shenjat e mëposhtme, përveç:

- A) Diarre e pakët me mukus e gjak
- B) Dhimbje të forta barku
- C) Temperaturë e lartë
- D) Konstipacion

Infermieri Pyetja: 1170

Cili është medikamenti që përdoret për korrigjimin e acidozës metabolike?

- A) Sol. Bikarbonat Na 8.4%
- B) Sol. Ca glukonat
- C) Sol. klorur kaliumi
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 1171

Koha e rikolorimit (rimbushjes kapilare në normë është më pak se :

- A) 1 sekonda
- B) 3 sekonda
- C) 6 sekonde
- D) 9 sekonda

Infermieri Pyetje: 1172

Sindromi Reye lidhet me përdorimin e:

- A) Aspirinës
- B) Aminofilinës
- C) Amfetaminës
- D) Antibiotikëve

Infermieri Pyetje: 1173

Doza e paracetamolit për uljen e temperaturës në fëmijë është:

- A) 2 mg/kg në një marrje
- B) 5mg/kg në një marrje
- C) 15 mg/kg në një marrje
- D) 20 mg/kg në një marrje

Infermieri Pyetje: 1174

Serumi antidifteritik:

- A) Lidh toksinën që qarkullon në gjak
- B) Shkrin membranat e formuara në fyt
- C) Pengon shumimin e mikroorganizmit
- D) Përdorët si profilaksi kundër difterise

Infermieri Pyetje: 1175

Për paralizat e poliomielitit njëri nga pohimet nuk është i vërtetë:

- A) Janë flakside
- B) Janë simetrike
- C) Janë të përherëshme
- D) Janë proksimale

Infermieri Pyetje: 1176

Paraliza e nervit glosofaringeal, me dalje të lëngjeve nga hunda, mund të vihet re në:

- A) Rubeolë
- B) Sinuzit
- C) Difteri
- D) Askaridozë

Infermieri Pyetje: 1177

Njollat e Koplik-ut janë karakteristike të:

- A) Rubeolës
- B) Varicelës
- C) Fruthit
- D) Skabiesit

Infermieri Pyetja: 1178

Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

Infermieri Pyetja: 1179

Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet për:

- A) Rubeolë
- B) Varicelë
- C) Fruth
- D) Skarlatinë

Infermieri Pyetja: 1180

Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të:

- A) Qelbëzimi i elementeve kutane
- B) Sindromi Reye
- C) Glomerulonefriti
- D) Herpes Zoster

Infermieri Pyetja: 1181

Fenobarbitali (Luminali) përdoret për trajtimin e:

- A) Giardia lamblia
- B) Laringitit akut
- C) Statusit konvulsiv
- D) Skarlatinës

Infermieri Pyetje: 1182

Në varicelë nuk duhen përdorur:

- A) Antihistaminikët
- B) Aspirina
- C) Antibiotikët
- D) Solucionet rehidruese

Infermieri Pyetje: 1183

Shenja madhorë e glomerulonefritit akut është:

- A) Proteinuria
- B) Hematuria
- C) Hipertensioni arterial
- D) Anemia

Infermieri Pyetje: 1184

Është e dobishme të përdorën për pertusin të gjitha të poshtshenuarat, përveç:

- A) Oksigjenoterapi
- B) Diazepam
- C) Inhalacion me bronkodilatatorë
- D) Suplemente me hekur

Infermieri Pyetje: 1185

Gjuha si manaferra të kuqe është karakteristike e:

- A) Rubeolës
- B) Parotitit
- C) Skarlatinës
- D) Fruthit

Infermieri Pyetje: 1186

Njëra nga shenjat e mëposhtme nuk bën pjesë në kriteret madhorë të Ethes

Reumatizmale Akute:

- A) Carditis
- B) Poliartiritis
- C) Bradikardia
- D) Chorëa minor

Infermieri Pyetje: 1187

Shkakton anemi ferriprive:

- A) Hemofilia
- B) Talasemia
- C) Papajtueshmëria nga faktori Rh
- D) Nënushqyerja

Infermieri Pyetje: 1188

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është karakteristike e Sindromit Nefrotik Idiopatik?

- A) Hipoproteinemia
- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Proteinuria

Infermieri Pyetje: 1189

Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile?

- A) Tek i porsalinduri
- B) Nga muaji i parë në muajin e pestë të jetës
- C) 6 muaj - 5 vjeç
- D) Pas moshës 12 vjeç

Infermieri Pyetje: 1190

Bronkioliti nuk ka :

- A) Takipne
- B) Tirazh
- C) Wheezing
- D) Dispne inspiratore

Infermieri Pyetje: 1191

Diagnoza etiologjike e faringotonsilitit streptokoksik beta-hemolitik të grupit A bëhet me:

- A) Hemokulturë
- B) Kulturë fyti
- C) Urokulturë
- D) Gjak komplet

Infermieri Pyetje: 1192

Karakteristikat klinike të infeksionit nga Hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të:

- A) Periudha e inkubacionit është 15-50 ditë
- B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike
- C) Transmetimi është fekal-oral
- D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe të bilirubinës

Infermieri Pyetje: 1193

Toksina difteritike parapëlqen:

- A) Indin renal
- B) Miokardin
- C) Timusin
- D) Tiroiden

Infermieri Pyetje: 1194

Doza e diazepamit për trajtimin e një krize konvulsive është:

- A) 0.1 mg/kg në një marrje
- B) 0.5 mg/kg në një marrje
- C) 5 mg/kg në një marrje
- D) 10mg/kg në një marrje

Infermieri Pyetje: 1195

Kolla lehtë është karakteristikë e:

- A) Tonsilitit
- B) Pertusit
- C) Astmës bronkiale
- D) Laringitit

Infermieri Pyetje: 1196

Cila nga sëmundjet e mëposhtme nuk shkaktohet nga Streptokoku beta-hemolitik ose nuk është pasojë e tij?

- A) Ethja reumatizmale
- B) Skarlatina
- C) Hepatitis
- D) Angina folikulare

Infermieri Pyetje: 1197

Paraliza Landry mund të vihet re në:

- A) Poliomielit
- B) Difteri
- C) Laringit
- D) Meningit

Infermieri Pyetje: 1198

Rash rozë, temperaturë subfebrile, limfadenopati cervikale - flet për:

- A) Skarlatinë
- B) Rubeolë
- C) Fruth
- D) Varicelë

Infermieri Pyetje: 1199

Herpes zoster shkaktohet nga virusi:

- A) herpes simplex
- B) i varicelës
- C) i hepatitit
- D) HIV

Infermieri Pyetje: 1200

Komplikacioni më i shpeshtë i varicelës është:

- A) Bronkopneumonia
- B) Qelbëzimi i elementeve kutane
- C) Meningoencefaliti
- D) Laringotrakeobronkiti

Infermieri Pyetje: 1201

Maska e Filatov-it është karakteristikë e:

- A) Fruthit
- B) Rubeolës
- C) Skarlatinës
- D) Varicelës

Infermieri Pyetje: 1202

Meningiti i latantit ka të pranishme të gjitha shenjat e mëposhtme klinike, me përjashtim të:

- A) Bombim të fontanelës
- B) Konvulsione
- C) Hipotermi
- D) Fotofobi

Infermieri Pyetje: 1203

Cila prej shenjave mund të lidhet me hepatitin akut?

- A) Stridori laringeal
- B) Urtikaria e gjeneralizuar
- C) Temperatura septike
- D) Konvulsionet

Infermieri Pyetje: 1204

Për astmën janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të:

- A) Kriza e astmës mund të shpërthejë nga një infeksion viral, sforcim fizik, emocion
- B) Është sëmundje inflamatorë kronike
- C) Prania e wheezing është e përhershme
- D) Sëmundja karakterizohet nga dispne e tipit inspirator

Infermieri Pyetje: 1205

Krimbat e rrumbullakët mjekohen me:

- A) Metronidazol (Flagyl)
- B) Mebendazol (Vermox)
- C) Manitol
- D) Makrolidë

Infermieri Pyetje: 1206

Shenjë madhorë e insuficiencës renale kronike është:

- A) Oligoanuria
- B) Edema
- C) Poliuria
- D) Hematuri

Infermieri Pyetje: 1207

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme rekomandohet të kryhet në një fëmijë me urtikarie?

- A) Urinë komplet
- B) Urokulturë
- C) Koprokulturë
- D) Feçe parazit

Infermieri Pyetje: 1208

Sindroma Reye është komplikacion i:

- A) Skarlatinës
- B) Variçelës
- C) Pertusit
- D) Poliomielitit

Infermieri Pyetje: 1209

Nuk transmetohen me rrugë fekal-orale:

- A) Poliomieliti
- B) Hepatiti viral B
- C) Hepatiti viral A
- D) Hepatiti viral E

Infermieri Pyetje: 1210

Diagnoza e drepanocitozës bëhet me:

- A) Të dhënat e gjakut komplet
- B) Elektroforzën e hemoglobinës
- C) Matjen e nivelit të bilirubinës në gjak
- D) Matjen e hekurit në gjak

Infermieri Pyetje: 1211

Parandalimi dhe trajtimi i tonsilofaringitit nga Streptokoku beta-hemolitik i grupit A parandalon:

- A) Miokarditin
- B) Ethen reumatizmale
- C) Skarlatinën
- D) Infeksionin e rrugëve urinare

Infermieri Pyetje: 1212

Tonsiliti akut shkaktohet nga, dhe mjekohet me:

- A) Escherichia coli; Gentamicinë
- B) Hymenolepsis nana; Cefalosporina
- C) Streptococcus beta-hemolyticus; Penicilinë
- D) Staphylococcus aureus; Gentamicinë

Infermieri Pyetje: 1213

Doza e ibuprofenit për trajtimin e etes në fëmijë është:

- A) 0.1 mg/kg në një marrje
- B) 0.5 mg/kg në një marrje
- C) 1 mg/kg në një marrje
- D) 10 mg/kg në një marrje

Infermieri Pyetje: 1214

Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë për shokun anafilaktik?

- A) Klinika varet nga rruga e futjes së antigjenit
- B) Është situatë urgjente që prek shumë organe e sisteme
- C) Trajtimi i zgjedhur është ultrakorteni ose prednisoloni i/v ose i/m
- D) Seksi femës preket më tepër

Infermieri Pyetje: 1215

Shenjë madhore e sindromit nefrotik është:

- A) Oligoanuria
- B) Hematuria
- C) Hiperlipidemia
- D) Proteinuria masive

Infermieri Pyetje: 1216

Forma më e rëndë e differisë është differia:

- A) faringeale
- B) nazale
- C) e konjuktivës
- D) laringeale

Infermieri Pyetje: 1217

Chorëa e Sydenham është karakteristike në:

- A) Encefalopatitë kongenitale
- B) Konvulsionet febrile
- C) Veset e zemrës me cianoze
- D) Ethen reumatizmale

Infermieri Pyetje: 1218

Talasemia major nuk ka:

- A) Splenomegali
- B) Qeliza me shenjë
- C) Hbf të rritur
- D) Pakësim të nivelit të hekurit në gjak

Infermieri Pyetje: 1219

Meningiti bakterial nuk ka karakteristike në LCS:

- A) Rritjen e neutrofileve
- B) Rritjen e numrit të qelizave
- C) Uljen e glukozës
- D) Uljen e proteinave

Infermieri Pyetje: 1220

Për Hemofilinë A nuk është vërtetë se :

- A) Vjen nga mungesa e faktorit VIII
- B) Karakterizohet nga hemartroza
- C) Është sëmundje autozomale recesive
- D) Mund të ketë hemorragji intrakraniale

Infermieri Pyetje: 1221

Nuk është shenjë e insuficiencës kardiake:

- A) Takipnea
- B) Kardiomegalia
- C) Hepatomegalia
- D) Poliuria

Infermieri Pyetje: 1222

Karakteristikat klinike të infeksionit nga hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të:

- A) Periudha e inkubacionit është 15-25 ditë
- B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike
- C) Transmetimi është fekal-oral
- D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe bilirubinës

Infermieri Pyetje: 1223

Cila nga enzimata e mëposhtme rritet në parotit?

- A) Fosfataza alkaline
- B) Transaminazat
- C) Amilaza
- D) Lipaza

Infermieri Pyetje: 1224

Janë të vërteta për Hemofilinë B të gjitha me përjashtim të:

- A) Nuk dallohet klinikisht nga hemofilia A
- B) Niveli i faktorit IX është i ulur
- C) Shfaqet klinikisht vetëm tek vajzat
- D) Trashëgohet në mënyrë autozomale recesive

Infermieri Pyetje: 1225

Në rastin e epiglottitit duhet shmangur:

- A) Matja e temperaturës
- B) Oksigjenimi
- C) Shikimi i fytit me spatul
- D) Aerosoloterapia me adrenalinë

Infermieri Pyetje: 1226

Hb që gjendet në sasi më të madhe tek i porsalinduri është:

- A) Hba
- B) Hba2
- C) Hbf
- D) Hbs

Infermieri Pyetje: 1227

Cila nga sëmundjet e mëposhtme shkaktohet nga një gjën i lidhur me seksin?

- A) Talasemia
- B) Anemia ferriprive
- C) Hemofilia
- D) Drepanocitoza

Infermieri Pyetje: 1228

Mjekimet e mëposhtme janë të dobishme në laringotrakeobronkitin akut, me përjashtim të:

- A) Rritja e lagështisë së mjedisit
- B) Aerosoloterapia me adrenalinë
- C) Oksigjenoterapia
- D) Antitusivët (frenuesit e kollës)

Infermieri Pyetje: 1229

Cilën nga shenjat e mëposhtme nuk e gjejmë në infeksionet e rrugëve të sipërme respiratorë?

- A) Kollë
- B) Ethe
- C) Polipne
- D) Wheezing

Infermieri Pyetja: 1230

Shkaktarë të anginës purulente janë:

- A) Viruset
- B) Streptokoku
- C) Mykoplazma
- D) Ndotësit ambientalë

Infermieri Pyetja: 1231

Ethja në fëmijë trajtohet me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të:

- A) Ibuprofen
- B) Paracetamol
- C) Aspirinë
- D) Kompresa

Infermieri Pyetja: 1232

Në trajtimin e bronkiolitit akut kanë vlerë të gjitha, me përjashtim të:

- A) Inhalacionit me bronkodilatatorë
- B) Mjekimit me antibiotikë
- C) Oksigjenoterapisë
- D) Trajtimin të ethes me antipiretikë

Infermieri Pyetja: 1233

Orkiti është komplikacion i:

- A) Skarlatinës
- B) Parotitit
- C) Varicelës
- D) Fruthit

Infermieri Pyetja: 1234

Në një fëmijë me purpur trombocitopenike autoimune i gjejmë të gjitha, me përjashtim të:

- A) Petekie dhe ekimoza
- B) Anemi
- C) Numri i trombociteve i ulur
- D) Hepatosplenomegali

Infermieri Pyetja: 1235

Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile?

- A) Tek i porsalinduri
- B) Pas moshës 12-vjeçare
- C) Nga 6 në 12 vjeç
- D) Nga 6 muaj në 5 vjeç

Infermieri Pyetja: 1236

Shenja Brudzinski është pozitive në:

- A) Parotit
- B) Miokardit
- C) Meningit
- D) Hepatit

Infermieri Pyetja: 1237

Fruthi ka shenjë patognomonike:

- A) Maskën e Filatovit
- B) Dermografizmin e bardhë
- C) Njollat e Koplikut
- D) Shenjën Trousseau

Infermieri Pyetja: 1238

Një i porsalindur klasifikohet si SGA kur:

- A) Pësha është nën 3% percentilë
- B) Gjatesia është nën 3% percentilë
- C) Perimetri i kokës është nën 3 % percentilë
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetja: 1239

Një i porsalindur klasifikohet si LGA kur

- A) Pësha është mbi 97% percentilë
- B) Gjatesia është mbi 97 % percentilë
- C) Perimetri i kokës është mbi 97 % percentilë
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetja: 1240

Ikteri fiziologjik shfaqet:

- A) Ditën e parë të jetës
- B) Ditën e tretë të jetës
- C) Ditën e dhjetë të jetës
- D) Muajin e parë të jetës

Infermieri Pyetja: 1241

Ikteri nga papjtueshmëria e rrezusit shfaqet:

- A) Ditën e parë të jetës
- B) Ditën e tretë të jetës
- C) Ditën e dhjetë të jetës
- D) Muajin e parë të jetës

Infermieri Pyetja: 1242

Kernikter ose ikteri nuklear prek:

- A) Aparatin gastro-intestinal
- B) Aparatin lokomotor
- C) Berthamat nukale te trurit
- D) Aparatin kardio-respirator

Infermieri Pyetja: 1243

E vjella ne refluxin gastro-ezofageal ndodh:

- A) Menjehere pas ushqyerjes
- B) Para ushqyerjes
- C) Rreth 1-2 ore pas ushqyerjes
- D) Asnjera

Infermieri Pyetja: 1244

E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit ndodh:

- A) Menjehere pas ushqyerjes
- B) Para ushqyerjes
- C) Rreth 1-2 ore pas ushqyerjes
- D) Asnjera

Infermieri Pyetja: 1245

Neonati nuk vendoset ne gji kur nena eshte e semure nga:

- A) Rubeola
- B) Meningiti
- C) HIV-aids
- D) Tetanozi

Infermieri Pyetje: 1246

Oftalmi është shenja me e zakonshme dhe me e shpëstë e;

- A) Tetanozit
- B) Gonorëse
- C) Sifilizit
- D) Drubeoles

Infermieri Pyetje: 1247

Ushqyerja ekskluzive me gji duhet të vazhdohet:

- A) Dy muaj pas lindjes
- B) Kater muaj pas lindjes
- C) Gjashtë muaj pas lindjes
- D) Deri në vitin e parë të jetës

Infermieri Pyetje: 1248

Në sallën e lindjes veprimi që duhet bërë gjithmone është:

- A) Vendos bebin mbi barkun e nënes
- B) Largoje në një dhomë me vetë
- C) Mbaje larg nga ambienti ku rri nëna
- D) Mos i jep informacion nënes

Infermieri Pyetje: 1249

Në ekzaminimin e parë të bebit gjithmone duhet parë:

- A) Kalueshmeria anale
- B) Kalueshmeria nazale
- C) Kalueshmeria ezofago-gastrike
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetja: 1250

Ne sallën e lindjes Asnjëhere nuk duhet te mungoje:

- A) Burimi i oksigjenit
- B) Ngrohësi i ambjentit
- C) Pelenat e ngrohta
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetja: 1251

Ne sallën e lindjes ekipi neonator duhet te njoftohet:

- A) 30 minuta para lindjes
- B) Ne momentin e lindjes
- C) Pas lindjes
- D) Nuk është e nevojshme te jene ne salle

Infermieri Pyetja: 1252

Nje i porsalindur klasifikohet si serotin kur lind:

- A) Para javes se 37-te të shtatzanisë
- B) Pas javes se 42 -te të shtatzanisë
- C) Midis 37-41 javështatzanie
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetja: 1253

E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit është:

- A) Permbajtje qumeshti
- B) Qumesht I prere si hirre
- C) Me permbajtje bile
- D) Asnjëra



Infermieri Pyetje: 1254

Bebi i porsalindur vendoset në gji:

- A) Menjehere pas lindjes
- B) Ditën e parë pas lindjes
- C) Tre ditët e para të lindjes
- D) Javën e parë pas lindjes

Infermieri Pyetje: 1255

Cilën nga sëmundjet e mëposhtme shfaq më shpejt fëmija prematurë?

- A) Papjekuri të sistemit respirator
- B) Papjekuri të sistemit lokomotor
- C) Papjekuri të sistemit nervor
- D) Papjekuri të sistemit tretës



Infermieri Pyetje: 1256

Hipotermia ose temperatura e ulët është karakteristike e:

- A) Bebit prematur
- B) Bebit hipotrof
- C) Bebit serotin
- D) Asnjërit

Infermieri Pyetje: 1257

Perpara një femije premature cilën do të vlerësosh më shumë:

- A) Vështirësinë në frymëmarrje
- B) Hypoglicemine
- C) Hypotermine
- D) Të gjitha



Infermieri Pyetje: 1258

Pikezimi i Apgarit kryhet:

- A) Në minutë të parë të jetës
- B) Në minutë 0 të jetës
- C) 30 minutat e para
- D) Ditën e parë të lindjes

Infermieri Pyetje: 1259

Anomalitë e bashkelindura janë me tepër karakteristike e:

- A) Femijëve të lindur në term
- B) Femijëve të lindur SGA
- C) Femijëve të lindur LGA
- D) Asnjërit

Infermieri Pyetje: 1260

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme laboratorike tregon nivelin e ikterit:

- A) Bilirubinemia
- B) Azotemia
- C) Glicemia
- D) Sedimenti

Infermieri Pyetje: 1261

Cfare duhet të bëjmë para një femije të sëmurë?

- A) Të trajtojmë problemin imediat
- B) Të gjejmë pse femija është sëmurur dhe të trajtojmë shkakun
- C) Të monitorojmë çdo faktor rreziku
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetje: 1262

Mortaliteti infantral nënkupton vdekshmëri neonatale;

- A) brenda vitit të parë të jetës
- B) në muajin e parë të jetës
- C) në javën e parë të jetës
- D) në ditën e parë të jetës

Infermieri Pyetje: 1263

Konjuktiviti bakterial:

- A) Shkaktohet nga viruset
- B) Ka papilla të zmadhuara
- C) Ka prani të folikujve
- D) Ka sekrecione mykoide

Infermieri Pyetje: 1264

Në ankesat subjektive nuk bëjnë pjesë:

- A) Ulja e të parit
- B) Dhimbja
- C) Lotimi i shtuar
- D) Skuqja

Infermieri Pyetje: 1265

Në uvea nuk bëjnë pjesë:

- A) Irisi
- B) Trupi ciljar
- C) Choroidea
- D) Retina

Infermieri Pyetja: 1266

Trupi qelqor:

- A) Ka mbaresa nervore
- B) Ka pigment
- C) I jep formen syrit
- D) Ushqen retinen

Infermieri Pyetja: 1267

Konjuktivitetet virale:

- A) Jane te shpeshta ne cdo stine
- B) Kane sekrecione purulente
- C) Ka folikuj ne konjuktive
- D) Ka zmadhim te papilave

Infermieri Pyetja: 1268

Mjekimi i konjuvitit viral:

- A) Antiviral
- B) Antibiotik
- C) Antimykotik
- D) Kalon pa mjekim

Infermieri Pyetja: 1269

Ne ankesat objektive nuk ben pjese:

- A) Ulja e te parit
- B) Skuqja
- C) Crrregullimi I pozicionit te syrit
- D) Tumoret

Infermieri Pyetja: 1270

Nuk ben pjese ne shtresat e kornese:

- A) Membrana e Bawmanit
- B) Stroma
- C) Konet
- D) Endoteli

Infermieri Pyetja: 1271

Fuqja perthyese e syrit eshte:

- A) 60 dioptri
- B) 58 dioptri
- C) 62 dioptri
- D) 50 dioptri

Infermieri Pyetja: 1272

Ne keratite dallojme gjithe keto pervec:

- A) Infiltrate korneale
- B) Hypopion
- C) Turbullim I vitrozit
- D) Edeme korneale

Infermieri Pyetja: 1273

Keratokonusi mjekohet me:

- A) Antibiotik
- B) Syze
- C) Lente e fort kontakti
- D) Kortizonike

Infermieri Pyetja: 1274

Makrokornea eshte:

- A) Semundje inflamatore e kornese
- B) Diametri I kornese > 12mm
- C) Dhome e perparme e thelle
- D) Diameter <10 mm

Infermieri Pyetja: 1275

Keratokonius eshte:

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Dalje ne forme koni e kristalinit
- C) Semindje inflamatore
- D) Ka sekrecione purulente

Infermieri Pyetja: 1276

Cila forme e keratitit shfaqet me heret?

- A) dentritik
- B) punktat
- C) vezikular
- D) stromal

Infermieri Pyetja: 1277

Keratiti mykotik:

- A) Shfaqet ne dimer
- B) Ka aftesi te perseritet shpesh
- C) Shfaqet nga perdorimi I gjate I kortizonikeve
- D) Mjekohet me antibiotike

Infermieri Pyetja: 1278

Ametropia eshte:

- A) Anomalia e retines
- B) Anomali e kornese
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Anomali e perthyerjes se drites

Infermieri Pyetja: 1279

Ne hipermetropi shembellimi bie:

- A) ne retine
- B) pas retines
- C) para retine
- D) ne pika te ndryshme ne retine

Infermieri Pyetja: 1280

Keratiti mykotik mjekohet :

- A) Antivirale
- B) Antibiotike
- C) Antimykotike
- D) Kortizonikle

Infermieri Pyetja: 1281

Emetropia eshte:

- A) Anomali e refraksionit
- B) Anomali e kornese
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Shembellimi bie para retines

Infermieri Pyetja: 1282

Ne miopi shembellimi bie:

- A) ne retine
- B) para retines
- C) pas retines
- D) ne pika te ndryshme te retines

Infermieri Pyetja: 1283

Astigmatizimi:

- A) Eshte anomali e kornese
- B) Eshte anomali e kristalinit
- C) Shembellimi bie ne retine
- D) Eshte demtim i akomodimit

Infermieri Pyetja: 1284

Syzet e lugeta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukone

Infermieri Pyetja: 1285

Shkollitje retinal mund te kemi ne:

- A) Hipermetropi alta
- B) Astigmatizem
- C) Miopi alta
- D) Asnjera

Infermieri Pyetja: 1286

Sfinkter dhe dilatators pupile ndodhen ne:

- A) Iris
- B) Trupin ciliar
- C) Choroidea
- D) Retine

Infermieri Pyetja: 1287

Fenomeni tindal vihet re ne:

- A) Uveite te perparme
- B) Uveite te pasme
- C) Konjuktivite
- D) Glaukome

Infermieri Pyetja: 1288

Syzet e myseta perdoren:

- A) Miopi
- B) Hipermetropi
- C) Astigmatizem
- D) Glaukome

Infermieri Pyetja: 1289

Akomodimi realizohet nga:

- A) Retina
- B) Kristalini
- C) Kornea
- D) Trupi qelqor

Infermieri Pyetja: 1290

Fenomeni tinald eshte:

- A) Anomali e perthyerjes se drites
- B) Anomali e kristalinit
- C) Turbullim I dhomes se perparme
- D) Turbullim I vitrozit

Infermieri Pyetja: 1291

Hypopion eshte:

- A) Grumbullim pusi ne dhomen e perparme
- B) Turbullim I dhomes se perparme
- C) Turbullim I trupit qelqor
- D) Inflamacion I konjuktives

Infermieri Pyetja: 1292

Sinecy anterior eshte ngjitje e:

- A) kornese me kristalinin
- B) irisit me kornene
- C) irisit me kristalinin
- D) kristalinit me vitrozin

Infermieri Pyetja: 1293

Cila shenje i perket uveiteve posteriore?

- A) Turbullime te vitrozit
- B) Turbullime ne kamera anterior
- C) Skuqje ciliare
- D) Dhimbje

Infermieri Pyetja: 1294

Synecy posterior eshte ngjitje e:

- A) kornese me kristalinin
- B) irisit me kornene
- C) irisit me kristalinin
- D) kristalinit me vitrozin

Infermieri Pyetja: 1295

Cili mjekim eshte kryesor ne uveite?

- A) Atropina
- B) Kortizoniket
- C) Antiviralet
- D) Antibiotiket

Infermieri Pyetja: 1296

Glaukome eshte:

- A) Tension I larte I syrit
- B) Semundje e nervit optic
- C) Anomali refraksioni
- D) Shtremberim I syrit

Infermieri Pyetja: 1297

Lengu uxor I syrit eleminohet nga:

- A) Trabekulat
- B) Trupi qelqor
- C) Kristalini
- D) Kornea

Infermieri Pyetje: 1298

Tensioni normal i syrit është:

- A) 10 -20 mmhg
- B) 11-22 mmhg
- C) 11-21 mmhg
- D) 10-22mmhg

Infermieri Pyetje: 1299

Cili ilaç nuk përdoret në uje?

- A) Antivirale
- B) Kortikosteroidet
- C) Antibiotikët
- D) Atropina

Infermieri Pyetje: 1300

Strabizmi është:

- A) Shtremberim i kapakëve
- B) Shtremberim i syve
- C) Rritje e tensionit të syrit
- D) Turbullim i vizionit

Infermieri Pyetje: 1301

Linguja e ujërave nuk eliminohet nga:

- A) Trabekulat
- B) Kanali i shqemimit
- C) Hapesirat e fontanës
- D) Kornea

Infermieri Pyetje: 1302

Ne glaukome nuk ndodh:

- A) Rritje e tensionit intraocular
- B) Demtim i n. Optic
- C) Ulja e pamjes
- D) Astigmatizmi

Infermieri Pyetje: 1303

Tensioni i syrit matet me

- A) Tonometer
- B) Ophthalmoskop
- C) Gonioskop
- D) Biomikroskop

Infermieri Pyetje: 1304

Timololi është:

- A) B-blokues
- B) A2-Agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE-inhibitor

Infermieri Pyetje: 1305

Azopti është:

- A) B-blokues
- B) A 2 agonist
- C) Prostaglandinë
- D) Inhibitor i anhidrazës karbonike

Infermieri Pyetja: 1306

Kendi i CA shihet me :

- A) Tonometer
- B) Biomikroskop
- C) Ophthalmoskop
- D) Gonioskop

Infermieri Pyetja: 1307

Travatani eshte:

- A) B-blokues
- B) A2-agoniste
- C) Prostaglandine
- D) ACE- inhibitor

Infermieri Pyetja: 1308

Muskujt e jashtem te syrit jane:

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 6

Infermieri Pyetja: 1309

Cili muskul i jashtem i syrit inervohet nga n. Abducent?

- A) M.rectus extern
- B) M. Rectus intern
- C) M.rectus superior
- D) M.rectus inferior

Infermieri Pyetje: 1310

Cila shenjë nuk është në krizën glaukumatoze?

- A) Iris bombe
- B) Sy I fortë si gur
- C) Dhoma e përparme e thellë
- D) Edeme korneale

Infermieri Pyetje: 1311

Cili muskul i jashtëm inervohet nga n. troklearis?

- A) M. obliquus inferior
- B) M. Rectus inferior
- C) M. obliquus superior
- D) M. rectus med

Infermieri Pyetje: 1312

Termi adenopati i referohet:

- A) Ënjtjes (zmadhimit) të nyjave limfatike
- B) Ënjtjes së zorrëve të mëdha
- C) Ënjtjes së fshikëzës së tëmthit
- D) Ënjtjes së stomakut

Infermieri Pyetje: 1313

Vjellja e gjakut është i njohur si:

- A) Hemorroide
- B) Hemostasis
- C) Hematemesis
- D) Melena

Infermieri Pyetje: 1314

Inflamacioni i mëlçisë njihet si:

- A) Cirrrozë
- B) Hepatit
- C) Bulimi
- D) Fistul

Infermieri Pyetje: 1315

Ndjesia e djegies retrosternale njihet si:

- A) Cardiosis
- B) Pyrosis
- C) Mostretje
- D) Meteorizëm

Infermieri Pyetje: 1316

Të vjellat e shtuara njihen si:

- A) Hyperpepsia
- B) Hyperemesis
- C) Hyperamnesia
- D) Hyperfagia

Infermieri Pyetje: 1317

Defekimi me feçe në ngjyrë të zezë quhet:

- A) Diarre
- B) Karcinozë
- C) Konstipacion
- D) Melena

Infermieri Pyetje: 1318

Inspektimi instrumental i pjesës fundore të zorrës së trashë është i njohur si:

- A) Colostomi
- B) Trakeostomi
- C) Sigmoidoskopi
- D) Tonsilektomi

Infermieri Pyetje: 1319

Cila nga të mëposhtmet nuk është patologji e pankreasit?

- A) Pancreatiti akut
- B) Kolecititi akut
- C) Fibroza cistike
- D) Kanceri pankreatik

Infermieri Pyetje: 1320

Disfagia është:

- A) Vështirësi në gëlltitje
- B) Vështirësi në tretje
- C) Pamundësi për të përtypur
- D) Vështirësi në defekim

Infermieri Pyetje: 1321

Stenoza e lindur e pilorit:

- A) Zakonisht paraqitet që në ditët e para të jetës
- B) Ndodh më shpesh në meshkuj se femra
- C) Paraqitet me të vjella me gjak
- D) Trajtohet me FPP

Infermieri Pyetje: 1322

Cirroza është:

- A) Sëmundje kronike degjenerative e mëlçisë
- B) Tumor i gojës
- C) Tumor i stomakut
- D) Prania e gurëve në fshikëzën e tëmthit

Infermieri Pyetje: 1323

Një pacient diagnostikuar me hbs Ag (+), propabikish ka:

- A) Një Hepatit B
- B) Koledokolitiazë
- C) Cirrozë biliare primare
- D) Kolangit sklerotizant primar

Infermieri Pyetje: 1324

Cili ekzaminim gjaku do të ishte më i dobishëm për të konfirmuar diagnozën e Cirrozës biliare primare?

- A) Antitrupa Antigliadinë
- B) Antitrupa Antimitokondrial (AMA)
- C) Antitrupa Antinuclear
- D) Niveli i amilazës në gjak

Infermieri Pyetje: 1325

Për cilin nga viruset e hepatitit ekziston vakcina?

- A) Për virusin A
- B) Për virusin B
- C) Për virusin C
- D) Për virusin D

Infermieri Pyetja: 1326

Faktori më i rëndësishëm për progresionin e nefropatisë është:

- A) Proteinuria
- B) Leukocituria
- C) Hematuria
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetja: 1327

Ndër shkaqet e Insuficencës Renale Kronike mund të jetë:

- A) Diabeti Mellitus
- B) Hipertensioni Sistemik
- C) Pielonefriti kronik
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetja: 1328

Në Insuficencën Renale Kronike të avancuar mund të vihen re këto lezime kutane:

- A) Pruritis
- B) Kalçifikime kutane dhe subkutane
- C) Dermatopati të fistulës arteriovenoze
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetja: 1329

Faktorë predispozues për Insuficencën Renale Akute mund të jetë:

- A) Moshë e avancuar
- B) Përdorimi i anti-inflamatorëve-josteroidal
- C) Përdorimi i anti-hipertensivëve ACE inhibitorë.
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetje: 1330

Indikacion absolut për fillimin e dializës është:

- A) Edema pulmonare
- B) Hiperkaliemia
- C) Perikarditi uremik
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetje: 1331

Hemisferat cerebrale janë:

- A) Identike me njëra-tjetrën;
- B) Thuajse identike me njëra-tjetrën
- C) Plotësisht të ndryshme nga njëra-tjetra
- D) Të pakrahasueshme

Infermieri Pyetje: 1332

Hemisferat dallojnë nga njëra-tjetra nga:

- A) Përmasat e lobit frontal;
- B) Përmasat e lobit temporal;
- C) Lokalizimi i zonës së të folurës;
- D) Përmasat e lobit oksipital

Infermieri Pyetje: 1333

Ndarja e hemisferave për arsye didaktike bëhet në:

- A) 2 lobe;
- B) 3 lobe;
- C) 4 lobe;
- D) 5 lobe.

Infermieri Pyetje: 1334

Korteksi cerebral përbëhet kryesisht nga:

- A) trupa qelizash nervore;
- B) zgjatimet e qelizave nervore;
- C) qeliza mbështetëse (jo neurone);
- D) trupa qelizore dhe zgjatime të qelizave nervore në sasi thuajse të barabarta.

Infermieri Pyetje: 1335

Afazia është crregullim i:

- A) vëmendjes
- B) të folurit
- C) nuhatjes
- D) shikimit

Infermieri Pyetje: 1336

Çrregullime të kujtesës janë:

- A) Afazi
- B) Agrafi
- C) Amnezi
- D) Disfagi

Infermieri Pyetje: 1337

Anosmia është shenjë e dëmtimit të nervave:

- A) olfaktorë
- B) facial
- C) glosofaringealë
- D) trigeminalë

Infermieri Pyetje: 1338

Hemianopsia është:

- A) Deficit motor
- B) Çrregullim sensitiv
- C) Deficit i fushës vizive
- D) Çrregullim i ekuilibrit

Infermieri Pyetje: 1339

Ptoza palpebrale haset në dëmtimet e nervit:

- A) olfaktor
- B) okulomotor
- C) trigeminal
- D) hypogloss

Infermieri Pyetje: 1340

Shenja e "Bell", haset në:

- A) Neuraljinë trigeminale
- B) Paralizën faciale centrale
- C) Paralizën faciale periferike
- D) Neuraljinë glosso-faringeale.

Infermieri Pyetje: 1341

Në dëmtimet e nervit glosso-faringeal kemi humbjen e shijes në:

- A) 1/3 e përparme të gjuhës;
- B) 1/3 e mesme të gjuhës;
- C) 1/3 e pasme të gjuhës;
- D) Gjithë gjuhën.

Infermieri Pyetje: 1342

Nervi hypogloss është:

- A) sensitiv;
- B) motor;
- C) miks (sensitivo-motor);
- D) me funksion parasimpatik.

Infermieri Pyetje: 1343

Në sindromat miastenike dëmtimi primar është në:

- A) Nervat periferikë;
- B) Fibrat muskulare;
- C) Pllakën neuro-muskulare;
- D) Sistemin nervor qendror.

Infermieri Pyetje: 1344

Në miopatië, dëmtimi primar është në:

- A) mekanizmin e kontraksionit muskular;
- B) funksionin muskul-nerv;
- C) nervat periferikë;
- D) harqet reflektore.

Infermieri Pyetje: 1345

Rezervat neuronale me glukozë janë të mjaftueshme për:

- A) 0.5 - 1 min;
- B) 1 - 1.5 min;
- C) 1.5 - 2 min;
- D) 2 - 3 min.

Infermieri Pyetje: 1346

Furnizimi arterial i trurit sigurohet nga 2 arteriet:

- A) cerebri anterior;
- B) cerebri media;
- C) comunicante anterior dhe 2 arteriet comunicante posteriore;
- D) karotis dhe 2 arteriet vertebrale.

Infermieri Pyetje: 1347

Patologjitë cerebrovaskulare karakterizohen nga deficite:

- A) subakute neurologjike, nga çrregullim metabolik;
- B) akute neurologjike, nga çrregullim i sistemit cerebro-vaskular;
- C) neurologjik me baze gjenetike;
- D) neurologjik nga intoksikacionet.

Infermieri Pyetje: 1348

Skleroza multiple është patologji:

- A) Dismielinizante hereditare;
- B) Dismielinizante e fituar;
- C) Demielinizante;
- D) Metabolike.

Infermieri Pyetje: 1349

M. Alzheimer është sëmundje:

- A) Demielinizante;
- B) Degjenerative progressive;
- C) Traummatike;
- D) Metabolike.

Infermieri Pyetje: 1350

Në morbus Alzheimer ndodh humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve:

- A) parietale e temporale;
- B) oksipitale e frontale;
- C) frontale e parietale;
- D) oksipitale e parietale.

Infermieri Pyetje: 1351

Skleroza laterale amiotrofike (SLA), karakterizohet nga humbje:

- A) progresive neuronale në korteksin frontal;
- B) neuronale në traktin pyramidal;
- C) neuronale në fashikujt posterior;
- D) neuronale në cornu anterior të medullës spinale.

Infermieri Pyetje: 1352

Atrofitë spinocerebellare janë patologji:

- A) demielinizante;
- B) metabolike;
- C) hereditare;
- D) vaskulare.

Infermieri Pyetje: 1353

Patologjitë metabolike të trashëguara të sistemit nervor shkaktohen nga defekte të:

- A) genit që kodon për një enzimë apo protein të rëndësishme;
- B) kontraksionit muskular;
- C) funksionit të harkut reflektor;
- D) funksionit të pllakës neuro-muskulare.

Infermieri Pyetje: 1354

Morbus Willson është pasojë e anomalisë së një proteine transportuese të:

- A) hekurit në organizëm;
- B) klorit në organizëm;
- C) azotit në organizëm;
- D) bakrit në organizëm.

Infermieri Pyetje: 1355

MMSE, është test i cili përdoret për të vlerësuar:

- A) forcën muskulare;
- B) funksionet e larta konjitive;
- C) sensibilitetin;
- D) ekuilibrin.

Infermieri Pyetje: 1356

Dëmtimet e motoneuroneve inferior shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hipërrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

Infermieri Pyetje: 1357

Dëmtimet e motoneuroneve superiore shkaktojnë:

- A) Reflekse të pandryshuara;
- B) Hipërrefleksi;
- C) Hyporefleksi;
- D) Arefleksi.

Infermieri Pyetje: 1358

Zona motore primare ndodhet në korteksin:

- A) motor;
- B) parietal;
- C) oksipital;
- D) temporal

Infermieri Pyetje: 1359

Dhimbje neuropatike është dhimbje që shkaktohet nga lezime:

- A) të korteksit cerebral;
- B) të radikseve nervore;
- C) muskulare;
- D) të fibrave nervore.

Infermieri Pyetje: 1360

Për të ekzaminuar sensibilitetin termik përdoren:

- A) Një epruvetë qelqi me ujë të ngrohtë;
- B) Një epruvetë qelqi me ujë të ftohtë;
- C) Dy epruveta qelqi, njëra me ujë të ngrohtë dhe tjetra me ujë të ftohtë;
- D) Një age sterile.

Infermieri Pyetja: 1361

Zona sensore primare ndodhet në korteksin:

- A) frontal;
- B) parietal;
- C) oksipital;
- D) temporal.

Infermieri Pyetja: 1362

Në sindromën hipotalamike (dëmtime të hipotalamusit), kemi:

- A) Hypoestezi dhe disestezi;
- B) Hipërestezi;
- C) Hypoestezi;
- D) Anestezi.

Infermieri Pyetja: 1363

Halucinacionet olfaktore kanë të bëjnë me:

- A) Mungesën e nuhatjes;
- B) Ekzagjerimin e nuhatjes;
- C) Mungesën e shijes;
- D) Përceptimin e aromave inekzistente.

Infermieri Pyetja: 1364

Ataksia statike është paaftësia për të:

- A) ruajtur ekuilibrin në pozicionin në këmbë;
- B) ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë hapur;
- C) ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë mbyllur;
- D) kryer provën index-nasi.

Infermieri Pyetje: 1365

Dismetria është paaftësia për:

- A) ruajtjen e ekuilibrit në ecje;
- B) arritjen në mënyrë korrekte një shenjë;
- C) kapjen e një objekti;
- D) ecjen me sytë mbyllur.

Infermieri Pyetje: 1366

Agnozia është çrregullim i:

- A) kuptimit të të folurës;
- B) orientimit në kohë dhe hapësirë;
- C) njohjes së objekteve në prani të sistemeve sensoriale intakte;
- D) sensibilitetit taktil.

Infermieri Pyetje: 1367

Elektroneurografia përcakton:

- A) Aktivitetin elektrik kortikal;
- B) Vijueshmërinë funksionale të harqeve reflektore;
- C) Funksionin e fibrave muskulare;
- D) Shpejtësinë e konduksionit nervor motor apo sensitiv;

Infermieri Pyetje: 1368

Epilepsia reflektore përbëhet nga atake epileptike që:

- A) Shpërthejnë pas një stimuli të caktuar;
- B) Janë të palidhura me stimuj të ndryshëm;
- C) Hasen më tepër në të rriturit;
- D) Janë me bazë gjenetike.

Infermieri Pyetje: 1369

EEG bën regjistrimin e :

- A) Funksionit të harqeve reflektore;
- B) Aktivitetit elektrik kortikal;
- C) Funksionit të fibrave muskulare;
- D) Funksionit të fibrave nervore.

Infermieri Pyetje: 1370

Aura e migrenës është:

- A) Faza e dhimbjes maksimale të kokës;
- B) Përuidha pas qetësimit të kësaj dhimbjeje;
- C) Simptomatologjia specifike që shfaqet para dhimbjes;
- D) Nuk ka lidhje me dhimbjen e kokës.

Infermieri Pyetje: 1371

Progesteroni prodhohet nga:

- A) Trupi i verdhe
- B) Uterusi
- C) Hypofiza
- D) Ovaret

Infermieri Pyetje: 1372

Parandalimi paresor ul:

- A) Prevalencën e një sëmundjeje
- B) Incidencën e një sëmundjeje
- C) Prevalencën e një handikapi
- D) Incidencën e një handikapi

Infermieri Pyetje: 1373

Për të evituar një shtatzani abstinohet nga dita:

- A) 8 deri në ditën e 14
- B) 6 deri në ditën e 14
- C) 8 deri në ditën e 18
- D) 6 deri në ditën e 12

Infermieri Pyetje: 1374

Pilula kontraceptive e urgjencës merret në:

- A) Mes të ciklit
- B) Fillim të ciklit
- C) Fund të ciklit
- D) Nuk ka rëndësi në çfarë momenti të ciklit

Infermieri Pyetje: 1375

Hormoni luteinizues prodhohet:

- A) Në hipofizë
- B) Në ovarë
- C) Në testikuj
- D) Në uterus

Infermieri Pyetje: 1376

Testosteroni është:

- A) Qeliza seksuale mashkullore
- B) Hormoni seksual femëror
- C) Hormoni seksual mashkullor
- D) Qeliza seksuale femërore

Infermieri Pyetje: 1377

Hormoni folikulo stimulus prodhohet nga:

- A) Hypofiza dhe hipotalamusi
- B) Ovarët
- C) Uterusi
- D) Testikujt

Infermieri Pyetje: 1378

Deproverat bëjnë pjesë në metodat:

- A) Orale
- B) Kirurgjikale
- C) Subdermale
- D) Injektable

Infermieri Pyetje: 1379

E vetmja metode kontraceptive që mbrojnë nga HIV/AIDS është:

- A) Metoda kirurgjikale
- B) Spërmicidet
- C) Kondomi
- D) Metodët hormonale

Infermieri Pyetje: 1380

Cilat metoda kontraceptive mund të mbrojnë nga IST?

- A) Metoda e ditëve kalendarike
- B) Metodët barriere
- C) Injektablet
- D) Metodët orale

Infermieri Pyetja: 1381

Vetinspektimi e vetekzaminimi behet ne:

- A) Kancerin e qafës se mitres
- B) Menopauze
- C) Ne rastin e një IST je
- D) Kancerin e gjirit

Infermieri Pyetja: 1382

PAP testi behet për te diagnostikuar:

- A) Kancerin e qafës se mitres
- B) Kancerin e gjirit
- C) HIV/AIDS
- D) Kancerin e ovarit

Infermieri Pyetja: 1383

Norplanti dhe implanon bejne pjese te metodat:

- A) injëktable
- B) orale
- C) barriere
- D) subdermale

Infermieri Pyetja: 1384

Kur kemi largim të kondileve femorale kontrolaterale nga njëri-tjetri dhe afrim të maleolave kontrolaterale me njëra-tjetrën, kemi të bëjmë me:

- A) Genus rekurvatum
- B) Genus varum
- C) Genus valgum
- D) Genus pronatum

Infermieri Pyetje: 1385

Në shenjat klinike të osteogenezës imperfekte vërejmë:

- A) Deformim të shtyllës kurrizore
- B) Ekzoftalmi
- C) Sklera blu
- D) Ptozë palpebrale

Infermieri Pyetje: 1386

Osteoporoza ka si karakteristikë:

- A) Mineralizim të pamjaftueshëm të kockës
- B) Pakësim i masës kockore
- C) Të dyja sa më sipër
- D) Asnjë prej tyre

Infermieri Pyetje: 1387

Në pes ekuinovarus kemi:

- A) Shkurtim të strukturave laterale
- B) Shkurtim të strukturave mediale
- C) Shkurtim të strukturave dorsale
- D) Nuk kemi shkurtim të asnjë strukture

Infermieri Pyetje: 1388

Në hallux valgus patologjia qëndron në:

- A) Artikulacionin metacarpo-falangeal
- B) Artikulacionin interfalangeal
- C) Artikulacionin talo-krural
- D) Artikulacionin metatarso-falangeal

Infermieri Pyetje: 1389

Kur kemi rrotullim të vertebrave në aksin e tyre dhe transmetim të këtij rrotullimi tek brinjët duke formuar gibus kifo-skoliotik kemi të bëjmë me:

- A) Skoliozë strukturale
- B) Skoliozë funksionale
- C) Kifoze
- D) Spondilolistezë

Infermieri Pyetje: 1390

Në luksacionin congenital koksofemoral kur fëmija fillon të ecë duke çaluar, kjo ndodh si pasojë:

- A) E shkurtesës së njërit femur
- B) E shkurtesës së të dy femureve
- C) E insuficencës së muskujve gluteale
- D) Asnjë prej sa më sipër

Infermieri Pyetje: 1391

Mielomeningocela shfaqet në kë nga këto diagnoza:

- A) Sakralizim të vertebrës së fundit lumbare
- B) Luksacion congenital kokso-femoral
- C) Skoliozë funksionale
- D) Spina bifida

Infermieri Pyetje: 1392

Në pes planus patologjia qëndron në:

- A) Pozicionimin e metatarsëve
- B) Harkun longitudinal dhe atë transversal
- C) Pozicionimin e kockës kuboide
- D) Tendinin e akilit

Infermieri Pyetja: 1393

Trajtimi i luksacionit kokso-femoral kongenital në moshën 3 muaj konsiston:

- A) Në vendosjen e jastëkut abduktor (Pavlik)
- B) Në imobilizimin me gips
- C) Në rikonstrukcion të acetabulit kirurgjikalisht
- D) Në reponim të hapur kirurgjikal

Infermieri Pyetja: 1394

Mjekimi i pes equinovarus tek të porsalindurit konsiston në:

- A) Ndërhyrje kirurgjikale
- B) Artrodezë
- C) E lëmë të autokorrigjohet deri në moshën 8 vjeç
- D) Redresime me gips

Infermieri Pyetja: 1395

Në coxa vara këndi cerviko-diafizar është:

- A) Më i ngushtë (vogël) se norma
- B) Më i gjerë (madh) se norma
- C) 180 gradë
- D) Këndi cerviko-diafizar nuk ndikohet nga coxa vara

Infermieri Pyetja: 1396

Fraktura e diafizës tibiale trajtohet:

- A) Duke imobilizuar gjithë anësinë superiore
- B) Duke imobilizuar vetëm bërrylin
- C) Duke imobilizuar artikulacionin Gleno-humeral
- D) Asnjë prej tyre

Infermieri Pyetja: 1397

Në frakturat e thjeshta të klavikulës pa komplikacione duhet kryer:

- A) Reponim dhe imobilizim në gips
- B) Reponim kirurgjikal dhe fiksime me vida
- C) Reponim e fiksime me bandazh në formë tete
- D) Reponim dhe fillim i lëvizjeve të lehta

Infermieri Pyetja: 1398

Në frakturën e diafizës humerale mund të kemi dëmtim të:

- A) arteries radiale
- B) arteries ulnare
- C) nervit radial
- D) nervit ulnar

Infermieri Pyetja: 1399

Luksacioni gleno-humeral reponohet sipas:

- A) metodës së Hipokratit
- B) metodës Kocher
- C) metodës së Hipokratit metodës Kocher
- D) kirurgjikalisht

Infermieri Pyetja: 1400

Nëse kemi frakturë ekstensore suprakondilare të humerusit, pas reponimit imobilizimi duhet të kryhet në:

- A) Fleksion
- B) Abduksion
- C) Ekstension
- D) Pronacion

Infermieri Pyetja: 1401

Fraktura e kondileve femorale ndodh:

- A) Në pjesën distal të femurit
- B) Në pjesën diafizare të femurit
- C) Në pjesën proksimale të femurit
- D) Në pjesën proksimale të humerit

Infermieri Pyetja: 1402

Luksacioni gleno-humeral mund të jetë të gjitha më poshtë përveç:

- A) Subklavikular
- B) Erehta
- C) Subakromial
- D) Submandibular

Infermieri Pyetja: 1403

Frakturë oblike është fraktura që e ndan kockën:

- A) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje horizontale
- B) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje të pjerrët
- C) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje ovale
- D) Në 3 ose më shumë pjesë

Infermieri Pyetja: 1404

Fraktura e ulnës dhe luksacioni i radiusit emërtohet:

- A) Locos tipica ose Colles
- B) Galeazzi
- C) Monteggia
- D) Jones

Infermieri Pyetja: 1405

Në konsolidimin kockor faza e dytë është:

- A) e kallusit primar
- B) e inflamacionit
- C) pseudoartroza
- D) asnjë prej tyre

Infermieri Pyetja: 1406

Një frakturë mund të jetë:

- A) komocionale
- B) kompartmentale
- C) spirale
- D) të gjitha sa më lart

Infermieri Pyetja: 1407

Implantet janë metoda kontracepsin hormonale

- A) Hormonale
- B) Jo hormonale
- C) Kimikate
- D) Asnjë nga keto

Infermieri Pyetja: 1408

Pilulat progestative kunderindikohen në;

- A) Gjashtë mujorin e parë të ushqyerjes me gji
- B) Gjashtë javët e para të ushqyerjes me gji
- C) Tre muajt e parë të ushqyerjes me gji.
- D) Asnjë nga keto

Infermieri Pyetja: 1409

DIU vendoset kur femra eshte:

- A) Shtatzane
- B) Ka nje infeksion puerperal
- C) Ka nje semundje inflamatore pelvike.
- D) Asnje nga opsionet

Infermieri Pyetja: 1410

Hormoni folikulo stimulus

- A) Provokon ovulacionin
- B) Mban trupin e verdhe
- C) Nxit rritjen dhe zhvillimin e folikulit ovarian
- D) Asnje nga opsionet

Infermieri Pyetja: 1411

Estradioli prodhohet nga:

- A) Hypofiza
- B) Ovaret
- C) Uterusi
- D) Asnje nga opsionet

Infermieri Pyetja: 1412

Kush e percakton tipin e pilulave te kombinuara:

- A) Doza e etinil estradiolit
- B) Doza e progesteronit
- C) Doza e te dyve
- D) Asnje nga keta

Infermieri Pyetja: 1413

Kontraceptivet oral jane metoda:

- A) Hormonale
- B) Jo hormonele
- C) Kimikate
- D) Asnje nga opsionet

Infermieri Pyetja: 1414

Menopauza natyrale eshte si rezultat i:

- A) Ndalimit te aktivitetit folikular ovarian
- B) Ablacionit kirurgjikal te ovareve
- C) Frenimit jatrogjen te funksionit te ovareve
- D) Te treja se bashku

Infermieri Pyetja: 1415

Nje mesazh duhet te jete:

- A) I gjate
- B) I shkurter
- C) Te mos perseritet
- D) Asnje nga opsionet

Infermieri Pyetja: 1416

Cfare eshte ovulacioni:

- A) Pjekja e vezes
- B) Dalja e vezes nga folikuli
- C) Pjekja dhe dalja e vezes nga folikuli
- D) Asnje nga opsionet

Infermieri Pyetja: 1417

Ne ciklin menstrual, duke nisur nga dita e pare e ciklit, dallohen tre faza. Tregoni cila nga alternativat e meposhtme i paraqet ne renditjen e rregullt:

- A) Luteale, ovalatore, folikulare
- B) Ovulatore, luteale, folikulare
- C) Folikulare, ovulatore, luteale
- D) Folikulare, luteale, ovulatore

Infermieri Pyetja: 1418

Sa shtresa dallohen ne strukturen e uterusit?

- A) Tre: mukoze, muskulare e seroze
- B) Dy: seroze dhe muskulare
- C) Dy: mukoza dhe muskulare
- D) Tre: dy mukoze dhe një muskulare

Infermieri Pyetja: 1419

Cili nga këto hormone nuk prodhohet nga placenta gjatë barrës?

- A) Gonadotropina korionike humane (hCG)
- B) Hormoni laktogjen placentar
- C) Prolaktina
- D) Progesteroni

Infermieri Pyetja: 1420

Cila është frekuenca e rrahjeve të zemres fetale RZF:

- A) 70-80/min
- B) 90-110/min
- C) 120-160/min
- D) > 160/min

Infermieri Pyetje: 1421

Cila nga këto mundësi nuk është e pranishme në javën e 12-të të shtatzanisë ?

- A) Amenorea
- B) Hormoni bhCG në gjak
- C) Rrahjet e zemrës fetale në ekografi
- D) Lëvizjet fetale të ndjera nga nena

Infermieri Pyetje: 1422

Difektet e tubit neural të fetusit mund t'i atribuohen mungesës së:

- A) hekurit
- B) folateve
- C) vitaminës A
- D) estrogenëve

Infermieri Pyetje: 1423

Kordoni umbilikal përmban:

- A) Dy vena dhe një arterie
- B) Dy arterie dhe dy vena
- C) Dy arterie dhe një venë
- D) Një arterie dhe një venë

Infermieri Pyetje: 1424

Volumi i gjakut në barrë rritet me

- A) 10-20 %
- B) 30-40 %
- C) 50-60 %
- D) 70-80 %

Infermieri Pyetje: 1425

Diametri më i madh i kokës fetale është:

- A) Subokspital
- B) Oksipito-mental
- C) Biparietal
- D) Oksipito-frontal

Infermieri Pyetje: 1426

Ekspulsioni i anekseve fetale (placentes dhe membranave) pas lindjes normalisht ndodh brenda:

- A) 2-3 minutave
- B) 10 minutave
- C) 15-30 minutave
- D) 60-90 minutave

Infermieri Pyetje: 1427

Puerperium quhet:

- A) Përiudha menjëherë pas lindjes deri në 4-6 javë pas lindjes
- B) Përiudha para fillimit të aktivitetit të lindjes
- C) Përiudha e aktivitetit të lindjes
- D) Asnjëra nga këto

Infermieri Pyetje: 1428

Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është përgjegjëse për prodhimin e qumështit të gjirit (laktogjenezen) ?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

Infermieri Pyetja: 1429

Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është përgjegjëse për rrjedhjen (daljen) e qumështit të gjirit ?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

Infermieri Pyetja: 1430

Cila nga substancat e mëposhtme është përgjegjëse për involucionin uterin?

- A) Estrogjeni
- B) Progesteroni
- C) Oksitocina
- D) Prolaktina

Infermieri Pyetja: 1431

Cila nga pohimet e mëposhtme është e saktë për kontracepsionin pas lindjes ?

- A) Duhet filluar menjëherë tek gruaja që nuk ushqen bebin me gji
- B) Nuk është i rëndësishëm tek gruaja që ushqen bebin me gji
- C) Nuk është i rëndësishëm deri në shfaqjen e menstruacioneve të para
- D) Nuk është i nevojshëm për një muaj pas Sectio Cezarea

Infermieri Pyetja: 1432

Cila nga këto paraqitje i referohet paraqitjes me koke të fetusit?

- A) Podalike
- B) Cefalike
- C) Oblike
- D) Transversus

Infermieri Pyetje: 1433

Cila nga indikacionet dietetike të mëposhtme NUK është e duhura për gruan shtatzënë?

- A) Ulja e përdorimit të kripës
- B) Shtesa e hekurit
- C) Shtimi i acidit folik
- D) Shtimi i të paktën 6 kg peshë në barrë

Infermieri Pyetje: 1434

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk është test i zakonshëm gjatë një barre pa komplikime ?

- A) Dozimi në serum i bhCG
- B) Hemoglobina
- C) Pap testi
- D) Grupi i gjakut dhe faktori Rh

Infermieri Pyetje: 1435

Cili nga kushtet e mëposhtme NUK lidhet me një shtim të riskut të sëmundshmërisë perinatale ?

- A) Kushtet e dobëta socioekonomike
- B) Moshë e nënës nën 20 vj
- C) Duhanpirja
- D) Ushtrimet fizike

Infermieri Pyetje: 1436

Barra me moshe më shumë se 42 javë quhet:

- A) preterm
- B) premature
- C) ne term
- D) serotine

Infermieri Pyetje: 1437

Sindroma e postmaturit (serotinit) përfshin gjithë mundësitë e mëposhtme, përveç:

- A) Rritja e trashësisë së indit adipoz subkutan
- B) Lekura e rrudhosur, që deskuamohet
- C) Gjurme mekoniumi mbi lekure, membrane e kordon
- D) Thonj të gjatë

Infermieri Pyetje: 1438

I porsalinduri nga nëna diabetike NUK rrezikohet nga:

- A) Hipoglicemia
- B) Hipërglicemia
- C) Hipocalcemia
- D) Makrosomia

Infermieri Pyetje: 1439

Cili është mbartesi natyral i Toksoplazmozës?

- A) Gjaku
- B) Macja
- C) Peshku i kontaminuar
- D) Femijet në moshe shkollore

Infermieri Pyetje: 1440

Prematur përkufizohet një neonat i lindur para javës:

- A) 24 të barrës
- B) 34 të barrës
- C) 36 të barrës
- D) 40 të barrës

Infermieri Pyetja: 1441

Ne metodat diagnostikuese joinvazive ne obstetrike NUK ben pjese:

- A) Ekografia
- B) Stress test
- C) Amniocenteza
- D) Profili biofizik

Infermieri Pyetja: 1442

Abort habitual quhet prania e njepasnjeshme e :

- A) Dy aborteve spontane
- B) Tre aborteve spontane
- C) Kater aborteve sponatene
- D) Me shume se 5 aborte spontane

Infermieri Pyetja: 1443

Placenta previa eshte vendosja e placentes ne:

- A) 1/3 e poshtme te kavitetit uterin
- B) 1/3 sipërme te kavitetit uterin
- C) Fundus uteri
- D) Murin e përpareshem uterin

Infermieri Pyetja: 1444

Cili nga organet apo lokalitetet anatomike nuk ben pjese ne organet e jashtme genitale?

- A) Vulva
- B) Vagina
- C) Mons pubis
- D) Përineumi

Infermieri Pyetje: 1445

Zgjatja mesatare e ciklit menstrual është:

- A) 22 ditë
- B) 25 ditë
- C) 28 ditë
- D) 35 ditë

Infermieri Pyetje: 1446

Ardhja e ciklit menstrual shkaktohet nga:

- A) Çlirimi i prolaktinës
- B) Çlirimi pulsatil i GnRH (hormoni lirues i gonadotropinave)
- C) Zgjatja e ndryshueshme e fazës folikulare
- D) Nga sinteza e progesteronit në corpus luteum

Infermieri Pyetje: 1447

Indikatori më i mirë që pararend ovulacionin është:

- A) Piku i estrogjenit
- B) Shtimi i sekretimit të FSH
- C) Fillimi i stimi të sekretimit të LH
- D) Shtimi preovulator i progesteronit

Infermieri Pyetje: 1448

Cila nga karakteristikat e mëposhteme NUK është tipike për fazën folikulare të ciklit ?

- A) Kohezgjatja e ndryshueshme
- B) Rritja dhe zhvillimi i folikujve ovariene
- C) Tempëratura bazale mbi 36,5
- D) Rritja vaskulare e endometrit

Infermieri Pyetja: 1449

Cila nga shënjat e më poshtme NUK takohet në rastin e barrës ektopike (GEU) ?

- A) Dhimbje në kuadrantet e poshtme të barkut
- B) Gjakrrjedhje vaginale ose spotting
- C) Amenorrea
- D) Proctoragjia (hemoragji rektale)

Infermieri Pyetja: 1450

Trajtimi i GEU (barrës ektopike) mund te behet me:

- A) Laparaskopi
- B) Laparatomy
- C) Methotroxate
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetja: 1451

Cilat nga patologjitë e mëposhteme NUK është pasojë e sëmundjes inflamatore pelvike ?

- A) Endometrioza
- B) Barra ektopike
- C) Aderencat pelvike
- D) Dispareunia

Infermieri Pyetja: 1452

Cila nga situatat e mëposhtme NUK shoqerohet me risk te shtuar për SIP?

- A) Fillimi i kontakteve seksuale 15 vj
- B) Nderprerje te vullnetshme te barrës
- C) Marrja e kontrceptiveve orale
- D) Përdorimi i DIU

Infermieri Pyetja: 1453

Diagnoza e endometrioze vendoset në baze të:

- A) Anamnezës
- B) Ekzaminimit objektiv
- C) Dozimi i CA 125
- D) Shikimi direkt i lezionit endometrioik dhe biopsia

Infermieri Pyetja: 1454

Terapia më e përshtatshme për një grua 35 vjece që i është nënshtruar interventit kirurgjikal radikal (hysterectomia totale cum adnesis) është:

- A) Danazoli
- B) Kontraktivet orale
- C) Antiinflamatorët jo steroidienë
- D) Terapia estrogenike zëvendësuese

Infermieri Pyetja: 1455

Cila nga pohimet e mëposhtmet NUK shërben si teori për endometriozen?

- A) Metaplazia e epitelit celomik
- B) Hipërplazia endometriale
- C) Menstruacioni retrograd
- D) Deficiti imunologjik

Infermieri Pyetja: 1456

Cila nga terapitë e mëposhtme NUK është e indikuar për trajtimin e endometrioze?

- A) Agonistët e hormonit lirues të gonadotropinave (GnRH)
- B) Progesteroni
- C) Kontraktivet orale
- D) Danazoli

Infermieri Pyetje: 1457

Parimet e trajtimit të gonorresë, ME PËRJASHTIM TE:

- A) Doza unike
- B) Trajtimi i partnerit
- C) Trajtimi spitalor
- D) Mjekimi i sëmundjeve bashkëshoqëruese

Infermieri Pyetje: 1458

Me cilat nga patologjitë e mëposhtme janë të lidhura me shpesh metrorragjitë disfunktionale?

- A) Polipet endometriale
- B) Anovulacioni
- C) Çregullimet e koagulimit
- D) Endometrioza

Infermieri Pyetje: 1459

Me çfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 100 ml dhe me ritëm cdo 35 ditë?

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea

Infermieri Pyetje: 1460

Me çfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 40 ml dhe ritëm cdo 35 ditë?

- A) Menometroragjia
- B) Menoragjia
- C) Polimenorea
- D) Oligomenorea

Infermieri Pyetje: 1461

Cila nga këto IST kalon nëpër tre stadi të njëpasnjëshme nëse lihet pa u mjekuar ?

- A) HPV
- B) Sifilizi
- C) Chlamidia tracomatis
- D) Gardnerella vaginalis

Infermieri Pyetje: 1462

Miomat submukoze mund të shoqërohen me këto shenja dhe simptoma, përveç:

- A) Anemi
- B) Infertilitet
- C) Menometroragji
- D) Qarkullim gjaku parazitar nga organet e tjera

Infermieri Pyetje: 1463

Miomat janë të lidhura me kushtet e mëposhtme klinike përveç se me:

- A) Aneminë
- B) Amenorenë
- C) Dismenorea
- D) Pielonefritin

Infermieri Pyetje: 1464

Cila nga ankesat e mëposhtme nuk lidhet me klinikën e fibromiomave uterine?

- A) Te vjellat
- B) Dhimbja
- C) Problemet riprodhuese
- D) Menometroragjia

Infermieri Pyetje: 1465

Fibromioma uterine gjatë barrës:

- A) I zvogelojnë përmasat
- B) I rrisin përmasat
- C) Pësojnë transformim malinj
- D) Nuk pësojnë ndryshime

Infermieri Pyetje: 1466

Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vlerësimin e kalueshmërisë tubare?

- A) Testi post-koital
- B) Histerosaplingografia
- C) Laparaskopia
- D) Spermograma

Infermieri Pyetje: 1467

Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vlerësimin e malformacioneve të kavitetit uterin ?

- A) Testi post-koital
- B) Histerosaplingografia
- C) Laparaskopia
- D) Biopsia e endometrit

Infermieri Pyetje: 1468

Cila nga situatat e mëposhtme NUK është treguese e ndodhjes së ovulacionit?

- A) Shtimi i temperaturës normale
- B) Barra
- C) Endometri i tipit sekretiv
- D) Menstruacioni

Infermieri Pyetje: 1469

Cila nga situatat e mëposhtme NUK flet për sterilitet femeror?

- A) Mungesa e kalueshmerise tubare
- B) Anovulacioni
- C) Kriptokirdia
- D) Insuficiencia e progesteronit ne fazen e dyte te ciklit

Infermieri Pyetje: 1470

Cila nga ekzaminimet e më poshtme NUK përdoret për identifikimin e infertilitetit mashkullor?

- A) Spermograma
- B) Testi post-coital
- C) Biopsia endometriale
- D) Antikorpjet anti-spërmatozoidike

Infermieri Pyetje: 1471

Për fillimin dhe mbajtjen e ciklit menstrual NUK është e nevojshme:

- A) Hormoni clirues i gonatropinave (GnRH)
- B) Një endometer i ndjeshëm ndaj hormonet steroide seksuale
- C) Kalueshmëria tubare
- D) Hormonet steroide seksuale me origjine ovariale

Infermieri Pyetje: 1472

Cili nga ekzaminimet hormonale është kryesor për përcaktimin e ndodhise se menopauzes?

- A) FSH
- B) LH
- C) Prolaktina
- D) Androgjenet

Infermieri Pyetje: 1473

Afshet e nxehura në menopauzë krijohen nga:

- A) Rritja e FSH
- B) Rritja e LH
- C) Rënia e estrogjeneve
- D) Rënia e progesteronit

Infermieri Pyetje: 1474

Trajtimi i keshilluar për osteoporozë në menopauzë i përfshin të gjitha PËRVEC:

- A) Estrogjen
- B) Progesterone
- C) Ushtrime fizike
- D) Kalcium

Infermieri Pyetje: 1475

Pasojat afatgjata të menopauzës janë:

- A) Anemia
- B) HTA dhe diabeti
- C) Osteoporozë dhe arterioskleroza
- D) Depresioni

Infermieri Pyetje: 1476

Cili nuk përbën një faktor rreziku për kancerin e qafës së mitres?

- A) Raporti i parë seksual në moshë shumë të re
- B) Partnere seksuale të shumta
- C) Duhëpirja
- D) Hipërkoesterolemia

Infermieri Pyetje: 1477

Gjatë laktacionit janë të lejuar kontraktivët oralë:

- A) Monofazikë të kombinuar
- B) Dyfazikë të kombinuar
- C) Trefazikë të kombinuar
- D) Vetëm me progesteron

Infermieri Pyetje: 1478

Metodat kontraktive afatgjata të rikthyeshme përfshijnë:

- A) DIU
- B) Spërmicidet
- C) Kondomi
- D) Diafragma

Infermieri Pyetje: 1479

Dizavantazhet e kontraktivëve progesteronike përfshijnë:

- A) Metroragji
- B) Amenore
- C) Nauze
- D) Humbje në peshë

Infermieri Pyetje: 1480

Diagnoza e menopauzës vendoset pas:

- A) 3 muaj amenore
- B) 6 muaj amenore
- C) 12 muaj amenore
- D) 18 muaj amenore

Infermieri Pyetje: 1481

Dispareunia është dhimbja:

- A) gjatë menstruacioneve
- B) gjatë kontakteve seksuale
- C) në mesin e ciklit (ovulatore)
- D) pelvike e papërcaktuar

Infermieri Pyetje: 1482

HPV është i lidhur me kancerin e :

- A) Gjirit
- B) Mitrës
- C) Vaginës
- D) Qafës së mitrës

Infermieri Pyetje: 1483

IST favorizohen nga:

- A) Menopauza
- B) Abstenenca seksuale
- C) Përdorimi i profilaktikëve
- D) Numri i lartë i partnerëve seksualë

Infermieri Pyetje: 1484

Nëntipat e HPV që përfshihen si onkoviruse me risk të lartë janë:

- A) 6, 11
- B) 16, 18
- C) 21, 23
- D) 52, 53

Infermieri Pyetja: 1485

Kush është ekzaminimi baze depistues për kancerin e qafës së mitres?

- A) Ekografia
- B) Vizita gjinekologjike
- C) Pap-testi
- D) Kultura e sekrecioneve vagjinale

Infermieri Pyetja: 1486

Kush përbën faktor parandalues për kancerin e gjirit?

- A) Menarka e herëshme
- B) Menopauza e vonëshme
- C) Nullipariteti
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetja: 1487

Menopauza artificiale nukupton të gjitha opsionet e mëposhtme, përveç:

- A) Ablacioni kirurgjikal i dy ovarëve
- B) Ndalimit natyral të aktivitetit folikular ovarian
- C) Kemioterapia
- D) Radioterapia

Infermieri Pyetja: 1488

Infeksioni vaginal i shoqëruar me leukore me erë si të peshkut të prishur shkaktohet nga:

- A) Chlamydia trachomatis
- B) Streptokoku B hemolitik
- C) Trichomonas vaginalis
- D) Gardnerella vaginalis

Infermieri Pyetje: 1489

Kur harrohet pilula kontraceptive, cili është qendrimi i duhur?

- A) Nderpritet paketa e filluar
- B) Merren dy pilula njëherazi
- C) Hidhet tableta e harruar dhe merret pasardhësja
- D) Merret pilula e harruar brenda 12 orëve dhe vazhdohet pilula e radhës

Infermieri Pyetje: 1490

Kateterizimi arterial:

- A) Nuk realizon një monitorim agresiv të presionit arterial
- B) Nuk mundëson marrjen e gjakut për analizë
- C) Përdoret shpesh për infuzionin e likideve dhe medikamenteve
- D) Përdoret për infuzionin e likideve dhe medikamenteve jovazoaktive vetëm në situata urgjente

Infermieri Pyetje: 1491

Presioni venoz central:

- A) Është një e dhënë që shpreh volumin e likideve që ndodhen në venat centrale
- B) Ulet kur ulet presioni arterial sistolik
- C) Është mbi 10 cm shtyllë ujë në shokun hipovolemik
- D) Merr vlera të larta kur kemi humbje të masës qarkulluese

Infermieri Pyetje: 1492

Monitorimi respirator behet:

- A) për të mbikëqyrur përfuzionin e organeve
- B) për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone
- C) nëpërmjet matjes së presionit arterial të gjakut
- D) nëpërmjet matjes së frekuencës kardiake

Infermieri Pyetje: 1493

Gjendja vegetative:

- A) është mungesë e funksionit cerebral me funksione vitale të ruajtura
- B) quhet ndryshe vdekje cerebrale
- C) është gjendja në të cilën pacienti kryen aktivitet intelektual dhe shqisor
- D) është gjendja në të cilën pacienti ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij

Infermieri Pyetje: 1494

Shenjat e arrestit kardiocirkulator janë:

- A) Pacienti është koshient
- B) Apnea, ose respiracion me gulçim
- C) Lëkurë e ftohtë, e zbehtë, e djersitur
- D) Mungesë e pulsit periferik

Infermieri Pyetje: 1495

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë:

- A) Ischemia cerebrale për më shumë se 5-7 minuta nuk jep dëmtime në sistemin nervor qendror
- B) Rezervat e ATP në tru konsumohen brenda 15 minutash në rast arresti kardiak
- C) Truri mund të ruhet edhe 15 minuta pas arrestit kardiak n.q.s. Fillohet menjëherë reanimimi kardiopulmonar
- D) Truri mund të ruhet edhe 15 minuta pas arrestit kardiak pavarësisht fillimit të reanimimit kardio-pulmonar

Infermieri Pyetje: 1496

Vdekja cerebrale:

- A) është humbje e parikthyeshme e funksionit të korteksit
- B) është humbje e rikthyeshme e funksionit të trungut të trurit
- C) është humbje e funksionit të korteksit, me funksion të rujtur trungut të trurit
- D) është gjendja ku pacienti ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij

Infermieri Pyetja: 1497

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë:

- A) Në pacientët që janë zgjuar, reflekset mbrojtëse të rrugëve të ajrit nuk parandalojnë aspirimin pulmonar të përmbajtjes gastrike
- B) Pacientët me një status mental të alteruar mund t'i humbasin reflekset mbrojtëse gjë që i ekspozon ata me riskun e rritur për pneumoni aspirative
- C) Intubimi trakeal me një tub me manshetë nuk e ul riskun për aspirim
- D) Intubimi trakeal me një tub me manshetë mund ta parandalojë plotësisht aspirimin e përmbajtjes gastrike

Infermieri Pyetja: 1498

Shkaqet më të zakonshme që shkaktojnë arrestin kardipulmonar janë:

- A) Hipovolemia nga humbjet e shpejta të gjakut
- B) Hipokapnia
- C) Alkaloza metabolike
- D) Hipertermia

Infermieri Pyetja: 1499

Vlerësimi i komës sipas shkallës GLASGOW:

- A) Nuk jep të dhëna për thellësinë e komës
- B) Nuk ndikohet nga përgjigja motore e pacientit
- C) Kryhet vetëm duke i folur pacientit
- D) Bën vlerësimin e përgjigjeve motore, verbale dhe lëvizjes së syve

Infermieri Pyetja: 1500

Ventilimi mekanik:

- A) Nuk zëvendëson ventilimin e kryer nga sistemi respirator i pacientit
- B) Ul gjithnjë debitin kardiak
- C) Ul rrezikun e aspirimit
- D) Rrezikon për barotraumë ose volutraumë pulmonare

Infermieri Pyetje: 1501

Në pacientët që marrin opioide për një kohë të gjatë për trajtimin e dhimbjes:

- A) Zhvillohet apasionimi ose varësia psikologjike
- B) Zhvillohet toleranca
- C) Kanë diarre për një kohë të gjatë
- D) Me rritjen e dozës shfaqet deprimimi i respiracionit

Infermieri Pyetje: 1502

Në pacientët me ventilim mekanik:

- A) Preferohet ushqyerja enterale kundrejt asaj parenterale
- B) Nuk bëhet ushqyerje për sa kohë që pacienti është në ventilim mekanik
- C) Shkurtohet koha e qëndrimit në ventilator mekanik tek pacientët me kequshqyerje
- D) Duhet dhënë një sasi sa më e madhe ushqimesh nga sonda nazo-gastrike për të përmirësuar gjendjen nutricionalë të pacientit

Infermieri Pyetje: 1503

Insuficiencia respiratore:

- A) Nuk zhvillohet gjatë detresit respirator të adultit
- B) Ndikohet nga raporti ventilim/perfuzion
- C) Mund të shoqërohet me hiperoksemi
- D) Trajtohet gjithnjë me ventilim mekanik pavarësisht shkakut të saj

Infermieri Pyetje: 1504

Cili nga pohimet është i vërtetë?

- A) Të gjitha dhimbjet kanë një shkak fiziologjik të identifikueshëm
- B) Nëse raportohet lehtësim i dhimbjes pas një placeboje, kjo do të thotë se dhimbja nuk është reale
- C) Toleranca ndaj dhimbjes është individuale
- D) Meshkujt ndiejnë më pak dhimbje se femrat

Infermieri Pyetje: 1505

Në respiracionin paradoksal, në inspirim :

- A) Ndërkohë që toraksi ngrihet abdomeni ulet
- B) Ngrihet si toraksi dhe abdomeni
- C) Ulet toraksi dhe ngrihet abdomeni
- D) Ulet toraksi dhe ulet dhe abdomeni

Infermieri Pyetje: 1506

Shenja të perfuzionit jo të përshtatshëm të organeve vitale janë:

- A) Presioni sistolik i gjakut mbi 80 mmHg
- B) Presioni arterial mesatar nën 50 mmHg
- C) Prezenca e presionit venoz central të lartë
- D) Lëkura e ngrohtë, rimbushja kapilare e mirë

Infermieri Pyetje: 1507

Në një pacient të terapisë intensive me çrregullim akut të statusit mental:

- A) Monitorohet pulsoksimetria dhe gazanaliza e gjakut
- B) Jepet gjithmonë sedativë
- C) Jepet glukozë i/v vetëm në diabetikët
- D) Vendoset oksigjen suplementar pavarësisht O2Sat normal

Infermieri Pyetje: 1508

Në dhimbjen kronike pacienti:

- A) Paraqitet me shenjat e fluksit të shtuar simpatik
- B) Nuk ka ndryshime në shenjat vitale
- C) Uj dozën e analgjezikeve për qetësimin e dhimbjes
- D) Rrit tolerancën ndaj dhimbjes sepse sa më gjatë të ketë patur dhimbje aq më i pandjeshëm bëhet ndaj saj

Infermieri Pyetje: 1509

Cilën nga gjendjet e mëposhtme shkakton humbja e bikarbonateve nga organizmi?

- A) Acidozë metabolike
- B) Alkalozë metabolike
- C) Alkalozë respiratore
- D) Acidozë respiratore

Infermieri Pyetje: 1510

Shoku hipovolemik:

- A) Shkaktohet nga shtimi i masës qarkulluese të gjakut
- B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës
- C) Shfaqet me hipertension
- D) Ka si karakteristike një PH arterial nën 7,35

Infermieri Pyetje: 1511

Monitorimi hemodinamik bëhet:

- A) për të mbikëqyrur përfuzionin e organeve
- B) për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone
- C) nëpërmjet matjes së presionit të dioksidit të karbonit në rrugët e ajrit
- D) nëpërmjet matjes së PH dhe gazeve të gjakut arterial

Infermieri Pyetje: 1512

Pulsoksimetria bën të mundur monitorimin në vazhdimësi:

- A) Të përqëndrimit të oksihemoglobinës së saturuar të një subjekti
- B) Të niveleve të presionit pjesor të oksigjenit në gjak
- C) Të niveleve të presionit pjesor të dioksidit të karbonit në gjak
- D) Presionit të dioksidit të karbonit në rrugët ajrore

Infermieri Pyetje: 1513

Masazhi i jashtëm kardiak:

- A) Kur zhvillohet në mënyrë efektive mban një presion arterial sistolik nën 80 mmHg
- B) Praktikohet kur pulsuar në arteriet e mëdha është mbi 30 rrahje në minutë
- C) Qëllimi i tij është të rikthejë respiracionin dhe aktivitetin kardiak
- D) Shoqëron dhënien e adrenalinit, defibrilimin dhe respiracionin artificial në

menaxhimin e arrestit kardiak

Infermieri Pyetje: 1514

Shoku anafilaktik:

- A) Shkaktohet si pasojë e reduktimit të masës qarkulluese të gjakut
- B) Shkaktohet nga insuficiencia primare e zemrës
- C) Është pasojë e një vatre infeksioni dhe e bakteremisë
- D) Është pasojë e futjes në organizëm të substancave alergjene

Infermieri Pyetje: 1515

Acidoza metabolike karakterizohet nga:

- A) pH i gjakut nën 7.35
- B) Bikarbonatet në gjak mbi 23.4 mEq/l
- C) Presioni arterial i dioksidit të karbonit mbi 35 mmHg
- D) Mjekohet me oksigjenoterapi

Infermieri Pyetje: 1516

Pacienti duhet intubuar nëq:

- A) Presioni i dioksidit të karbonit në gjak ulet progresivisht
- B) Kur pacienti bëhet jokohshëm nga narkoza me dioksid karboni
- C) Kur ngrihet pH i gjakut nga alkalozja e thellë respiratore
- D) Presioni i oksigjenit arterial rritet progresivisht pavarësisht përdorimit të maskës

faciale

Infermieri Pyetja: 1517

Cilat duhet të kryhen të parat në një pacient të terapisë intensive?

- A) Manovrat diagnostike
- B) Manovrat terapeutike
- C) Anamneza dhe ekzaminimit fizik
- D) Vlerësimi dhe terapia

Infermieri Pyetja: 1518

Kush është rruga e përshtatshme për administrimin e medikamenteve gjatë reanimimit kardiopulmonar në një arrest kardiak kur nuk mund të vendoset rruga venoze?

- A) Rruga intramuskulare
- B) Rruga endotrakeale
- C) Rruga intraoseale në pacientë adultë
- D) Rruga intrakardiake

Infermieri Pyetja: 1519

Efektet anësore më të shpeshta të opioideve janë:

- A) Hiperventilimi
- B) Nauzeja dhe të vjellat
- C) Diarrea
- D) Axhitimi

Infermieri Pyetja: 1520

Sindroma e abstinencës nga opioidet:

- A) Quhet ndryshe varësi psikologjike nga opioidet
- B) Shfaqet kur një pacient ndërpret menjëherë përdorimin e opioidit
- C) Ndodh si pasojë gripit në pacientë që marrin opioide në doza të mëdha
- D) Nuk ndodh kur opioidi ndërpritet menjëherë në një pacient që i ka përdorur për një kohë të gjatë

Infermieri Pyetja: 1521

Në rastet kur ka ndodhur vdekja cerebrale:

- A) Pacienti nuk ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij
- B) Pacienti është në arrest respirator
- C) Pacienti nuk ka nevojë për ventilim mekanik për oksigjenim të mirë të indeve
- D) funksionojnë ende qendrat përgjegjëse për automatizmin kardiorespirator që ndodhen në bazën e kafkës

Infermieri Pyetja: 1522

Plazma e freskët e ngrirë:

- A) Është një likid zëvendësues i mirë për të korrigjuar hipovoleminë
- B) Nuk ka risk për transmetimin e infeksioneve të transmetueshme nëpërmjet transfuzionit
- C) Ka prioritet ndaj përdorimit të likideve zëvendësues kristaloidë në trajtimin e hipovolemisë
- D) Nëse mbahen temperaturat e duhura mund të ruhet për të paktën një vit, ose më shumë

Infermieri Pyetja: 1523

Ngritja e shtratit me kënd 45 gradë në pacientët në ventilim mekanik:

- A) Rrit rrishtun për aspirim të përmbajtjes gastrike
- B) Ul rrishtun për pneumoni nozokomiale
- C) Përmirëson hipotensionin
- D) Ndikon në përmirësimin e gjumit.

Infermieri Pyetja: 1524

Cilat nga pohimet e mëposhtme janë të vërteta:

- A) Sedacioni dhe paraliza përdoren në çdo pacient që është në ventilim mekanik
- B) Për parandalimin e pneumonisë të lidhur me ventilimin mekanik koka e shtratit duhet të ulet sa më shumë
- C) Për ta shkëputur pacientin nga respiratori duhet që ai të ketë reflekse intakte të rrugëve ajrore
- D) Në pacientët që marrin opioide zhvillohet varësia psikologjike nëse ato ndërpriten menjëherë

Infermieri Pyetja: 1525

Acidoza respiratore:

- A) Zhvillohet gjatë diarreve masive
- B) Zhvillohet në insuficiencën renale
- C) Korrigjohet me dhënien e bikarbonateve
- D) Është tregues i nevojës së ventilimit mekanik në insuficiencën respiratore

Infermieri Pyetja: 1526

Shoku septik:

- A) Shkaktohet si pasojë e reduktimit të masës qarkulluese të gjakut
- B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës
- C) Është pasojë e një vatre infeksioni dhe e bakteremisë
- D) Është pasojë e futjes në organizëm të substancave alergene

Infermieri Pyetja: 1527

Reaksionet hemolitike të transfuzionit vijnë si pasojë e:

- A) Transfuzionit jokompatibël sipas grupit
- B) Antitropave kundër leukociteve, ose proteinave plazmatike të dhuruesit
- C) Kalimit të një sasive të konsiderueshme të ajrit në vena
- D) Transfuzionit të shpejtë të gjakut të ftohtë

Infermieri Pyetje: 1528

Një pacient mund të vetëinfektohet si pasojë e:

- A) Transportit të agjentëve infektues nga një pacient tek tjetri
- B) Mikroorganizmave të pranishëm në florën e tij
- C) Mosndryshimit të barrierave individuale
- D) Përdorimit të antibiotikëve

Infermieri Pyetje: 1529

Transfuzioni i gjakut:

- A) Bëhet me gjak të saponxjerrë nga frigoriferi
- B) Bëhet me gjak të ngrohur më parë në 37 gradë celsius
- C) Duhet të zgjasë më shumë se 4 orë
- D) Bëhet me gjak që ka mbi 6 orë i nxjerrë nga frigoriferi dhe i ngrohur

Infermieri Pyetje: 1530

Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë :

- A) Anestezia spinale dhe epidurale jep hipertension arterial
- B) Anestezia spinale dhe epidurale jep takikardi
- C) Anestezia spinale dhe epidurale jep të përziera dhe të vjella
- D) Anestezia epidurale jep më shpesh se anestezia spinale dhimbje koke nga shpimi postdural

Infermieri Pyetje: 1531

Nga moseleminimi i plotë i anestezisë gjenerale dhe/ose bllokut neuromuskular ndodh:

- A) Çrregullime të elektrolitëve
- B) Obstruksioni i rrugëve të sipërme ajrore nga rënia e gjuhës
- C) Zgjim i shpejtë
- D) Çrregullime të temperaturës

Infermieri Pyetje: 1532

PaO₂ (presioni arterial i oksigjenit):

- A) Ndryshon në varësi të presionit pjesor të oksigjenit në ajrin e inspiruar
- B) Nuk ndryshon në sëmundjet pulmonare
- C) Matet nëpërmjet pulsoksimetrit
- D) Nuk ndryshon nga presioni venoz i oksigjenit

Infermieri Pyetje: 1533

Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë:

- A) Të gjitha medikamentet që përdor pacienti duhet të ndërpriten para kirurgjisë
- B) Duhanin mund ta pijë deri para operacionit
- C) Gjatë operacionit nuk ka rëndësi nëse stomaku është plot, ose jo
- D) Të korrigjohet hipovolemia dhe hipokalemia e mundshme para operacionit nëse koha e lejon

Infermieri Pyetje: 1534

Hipoventilimi postoperator çon në:

- A) Hipokapni
- B) Acidozë respiratore akute
- C) Hiperoksemi
- D) Në një ventilim të rritur në minutë

Infermieri Pyetje: 1535

Komplikacionet e analgjezisë epidurale janë:

- A) Hipertensioni
- B) Retensioni urinar
- C) Takikardia
- D) Sedacioni

Infermieri Pyetje: 1536

Efektet e mbisedacionit në një pacient të terapisë intensive janë:

- A) Diskomfort
- B) Dhimbje
- C) Hipertension
- D) Vështirësi në komunikim

Infermieri Pyetje: 1537

Shoku hipovolemik:

- A) Shkaktohet nga humbja e më pak se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut
- B) E ka klinikën të ngjashme me shokun septik
- C) Presionin venoz central e ka të njëjtë me shokun kardiogjen
- D) Shoqërohet me rritje të kohës së mbushjes kapilare

Infermieri Pyetje: 1538

Anestezia spinale jep:

- A) Blllok motor dhe blllok sensor
- B) Blllok sensor pa blllok motor
- C) Analgjezi për një kohë të gjatë
- D) Anestezi të një ekstremiteti

Infermieri Pyetje: 1539

Anestezia regjionale endovenoze jep:

- A) Anestezi të një ekstremiteti
- B) Jep gjumë të thellë
- C) Jep relaksim neuromuskular
- D) Hipotension dhe bradikardi

Infermieri Pyetje: 1540

Presioni i rritur intrakranial ulet nëpërmjet:

- A) Oksigjenimit të pacientit
- B) Hipoventilimit
- C) Përdorimit të agjentëve osmotikë
- D) Përdorimit të diuretikëve

Infermieri Pyetje: 1541

Infeksionet që hasen më shpesh në terapi intensive janë:

- A) infeksionet e lëkurës
- B) infeksionet e traktit gastrointestinal
- C) septicemia
- D) infeksionet e sistemit nervor qendror

Infermieri Pyetje: 1542

Transfuzioni i shpejtë i gjakut të ftohtë:

- A) Mund të shkaktojë reaksione anafilaktike
- B) Çon në mbingarkesë cirkulatore
- C) Mund të shkaktojë aritmi, ose arrest kardiak
- D) Rrit mundësinë për formimin e mikroagregatëve

Infermieri Pyetje: 1543

Gjaku gjatë ruajtjes së tij pëson këto ndryshime:

- A) E ruan viabilitetin dhe funksionin e eritrociteve
- B) Bëhet me acid
- C) Ulet përqëndrimi i kaliumit në plazëm
- D) Faktori i VIII i koagulimit është relativisht i stabilizuar

Infermieri Pyetje: 1544

Në organizmin që ka marrë gjak, pas transfuzionit të gjakut:

- A) Mund të ndodhin ndryshime të kalemisë
- B) Mund të rritet niveli i kalciumit të jonizuar
- C) PH i gjakut bëhet acid për shkak se gjaku i konservuar është acidotik
- D) Ngarkesa acidotike tek pacienti është minimale

Infermieri Pyetje: 1545

Mjekimi i shokut anafilaktik bëhet me dhënien e:

- A) Antibiotikëve
- B) Adrenalinës
- C) Kardiotonikëve
- D) Analgjezikëve

Infermieri Pyetje: 1546

Alergjenët më të shpeshtë që çojnë në shok anafilaktik janë:

- A) Antibiotikët
- B) Rrezatimi që përdoret në imazherinë diagnostikuese
- C) Pickimi nga gjarpri
- D) Helmimet me fosfororganikë

Infermieri Pyetje: 1547

Anestezia inhalatore:

- A) Përdoret si anestezi mbajtëse
- B) Nuk përdoret për induksion anestezi
- C) Futet në rrugë venoze
- D) Nuk varet nga funksioni respirator

Infermieri Pyetje: 1548

Anestezia endovenoze:

- A) Futet nëpërmjet rrugës venoze
- B) Nuk përdoret si anestezia mbajtëse
- C) Shfrytëzon potencialin shkëmbyes të sistemit respirator
- D) Nuk mund të realizohet pa vendosur më parë tubin endotrakeal

Infermieri Pyetje: 1549

Cila nga brinjët e mëposhtme nuk është atipike?

- A) E parë
- B) E dytë
- C) E tretë
- D) E dymbëdhjetë

Infermieri Pyetje: 1550

Brinjët e vërteta janë:

- A) Nga 1-7
- B) Nga 1-10
- C) Nga 1-12
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetje: 1551

Angulus sternum formohet nëpërmjet:

- A) Manubrium sternum dhe corpus sterni
- B) Manubrium sternum dhe incisura costale
- C) Manubrium sternum dhe brinjës
- D) Asnjëra prej tyre

Infermieri Pyetje: 1552

Shtylla kurrizore paraqitet e lëvizshme me përjashtim të regjionit:

- A) Cervical
- B) Thoracal
- C) Lumbar
- D) Sacro-cocsigal

Infermieri Pyetje: 1553

Mbledhja e muskujve quhet:

- A) Adduksion
- B) Abduksion
- C) Flexion
- D) Extension

Infermieri Pyetje: 1554

Pelvisi formohet nga kockat e mëposhtme me përjashtim të:

- A) Oss coxae
- B) Oss sacrum
- C) Oss coccygeum
- D) Vertebra lumbare e pestë

Infermieri Pyetje: 1555

Skapula nuk ka Fose:

- A) glenoidale
- B) subskapulare
- C) supraspinatë
- D) infraspinate

Infermieri Pyetje: 1556

Humerusi nuk ka Fose:

- A) olekrani
- B) kapitis
- C) radiale
- D) koroide

Infermieri Pyetje: 1557

Procesi spinos i vertebrave torakale është:

- A) Në formë katrore
- B) Spina bifida
- C) Në formë tjegullave të catisë
- D) Në formë pesëkëndore

Infermieri Pyetje: 1558

Nuk i takon kafkës elementi:

- A) Calvaria
- B) Promontorium
- C) Glabella
- D) Clivus

Infermieri Pyetje: 1559

Procesi zigomatik mungon tek:

- A) Kocka frontale
- B) Kocka zigomatike
- C) Kocka temporal
- D) Maxilla

Infermieri Pyetje: 1560

Atlasi nuk ka:

- A) procese artikulare
- B) Foramen transversal
- C) Fovea dentis
- D) dy tuberkulume

Infermieri Pyetje: 1561

Proces i skeletit torakal është:

- A) stiloideus
- B) xifoideus
- C) mamillaris
- D) zygomatikus

Infermieri Pyetje: 1562

Tek sacrum nuk gjejmë:

- A) Facies articularis
- B) Linea transversal
- C) Cornua sacralia
- D) Spina sacralis

Infermieri Pyetje: 1563

Cili nga muskujt e mëposhtëm nuk fillon me dy koka?

- A) Rectus femoris
- B) Digastrikus
- C) Pronator teres
- D) Gastrocnemius

Infermieri Pyetja: 1564

Artikulacioni temporomandibular është i tipit:

- A) Cilindrik
- B) Sferik
- C) Elipsoid
- D) Enarthrozis

Infermieri Pyetja: 1565

Muskujt pektoralë i takojnë:

- A) Abdomenit
- B) Pelvisit
- C) Shpinës
- D) Toraksit

Infermieri Pyetja: 1566

Muskujt e mimikës:

- A) Lëvizin manibulën
- B) Inervohen nga n. Facial
- C) Kanë inervime të ndryshme nga njëra -tjetra
- D) Kanë dy pika fiksimi në kocka

Infermieri Pyetja: 1567

M.deltoideus fiksohet në:

- A) Oss scapula
- B) Oss Clavikula
- C) Oss humerusi
- D) Vertebren e tretë

Infermieri Pyetje: 1568

Artikulationi i gjenit realizohet ndërmjet:

- A) Femurit, tibies, fibules
- B) Femurit, tibies, patelles
- C) Femurit dhe tibies
- D) Femurit fibula dhe patella

Infermieri Pyetje: 1569

Në lidhjet e kafkës mbizotërojnë:

- A) Artikulationet
- B) Sutat
- C) Ligamentet
- D) Sinkondrozat

Infermieri Pyetje: 1570

Shtrin parakrahun:

- A) m. ekstensori i karpit radial longus
- B) m. ekstensori i karpit radial brevis
- C) m. ekstensori i karpit ulnar
- D) m. tricepsi brakial

Infermieri Pyetje: 1571

Artikulationi coxo-femoralis është;

- A) Inkongurent
- B) Kongurent
- C) Pjesërisht inkongurent
- D) Asnjëri prej tyre

Infermieri Pyetje: 1572

Cili nga të mëposhtmit është funksion i membranës qelizore?

- A) inicion transduksionin e sinjalit
- B) transporton jone dhe molekula të tjera
- C) formon kanale selective
- D) të gjitha më sipër janë funksione të membranës qelizore

Infermieri Pyetje: 1573

Në cilin prej proceseve, qelizat shpenzojnë rreth 40% të energjisë së tyre ditore?

- A) Në transportin aktiv
- B) Në endocitozë
- C) Në exocitosë
- D) Në difuzion të lehtësuar

Infermieri Pyetje: 1574

Me cilin lloj procesi transportohet glukoza prej proteinës mbartëse nga një zonë me përqendrim më të lartë drejt një zone me përqendrim më të ulët?

- A) Me transportin aktiv
- B) Endocitozën
- C) Difuzionin e lehtësuar
- D) Difuzionin e thjeshtë

Infermieri Pyetje: 1575

Pjesa e sistemit nervor që konsiderohet e pavullnetshme është:

- A) SN somatic
- B) SN autonom
- C) SN sensor
- D) SN motor

Infermieri Pyetje: 1576

Invaginimet e sarkolemës që formojnë zgjatime në formë gishtërinjsh, që depërtojnë në brendësi të fibrës muskulare quhen:

- A) retikulum sarkoplazmik
- B) retikulum endoplazmatik
- C) tubujt T
- D) filamentet e aktines

Infermieri Pyetje: 1577

Segmenti i miofibrilit i quajtur sarkomer, gjendet midis:

- A) dy linjave Z
- B) dy bandave A
- C) dy zonave H
- D) dy aktinave

Infermieri Pyetje: 1578

Në një sinaps neuro-muskular, neuroni e çliron neurotransmetuesin në:

- A) pllakën motore
- B) citoplazmën e qelizës muskulare
- C) cisternat terminale
- D) hapësirën sinaptike

Infermieri Pyetje: 1579

Një njësi motore përbëhet nga:

- A) të gjitha fibrat muskulare brenda një muskuli të caktuar
- B) nga një neuron motor dhe fibrat muskulare që ai kontrakton
- C) të gjitha neuronet që inervojnë një pjesë të caktuar të trupit
- D) një muskul dhe një nerv

Infermieri Pyetje: 1580

Të gjitha më poshtë janë shenja të inflamacionit përveç:

- A) dhimbjes
- B) skuqjes
- C) tempër atures
- D) hypër tensionit arterial

Infermieri Pyetje: 1581

Një nga molekulat e mëposhtme bën të mundur që muskuli të sigurojë energjinë e nevojshme për kontraksion duke gjeneruar ATP prej ADP. Cila është ajo?

- A) Creatinë fosfati
- B) Fosfokinaza
- C) Acetilkolinesteraza
- D) Katalaza

Infermieri Pyetje: 1582

Ku ndryshon fiziologjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lëmuar dhe atij të strijuar?

- A) muskuli i lëmuar kontrahohet më shpejt se ai i strijuar
- B) muskuli i strijuar përdor dy neurotransmetues, ai i lëmuar vetëm një
- C) muskuli i lëmuar shfaq aktivitet spontan dhe mund të modifikohet nga veprimi i HO
- D) muskuli i lëmuar nuk përmban të njëjtët elementë tkurrës si ai i strijuar

Infermieri Pyetje: 1583

Cila nga qelizat e mëposhtme prodhon antikorpe?

- A) limfocitet T
- B) limfocitet B
- C) monocitet
- D) fagocitet

Infermieri Pyetje: 1584

Si qohen degëzimet nervore të cilat përcjellin impulsin drejt trupit të neuronit?

- A) Aksone
- B) Dendritë
- C) Trupa Nissl
- D) Neurofibrile

Infermieri Pyetje: 1585

Sistemi nervor autonom inervon të gjitha më poshtë përveç:

- A) muskulit kardiak
- B) gjendrave egzokrine
- C) muskulit skeletik
- D) traktit tretës

Infermieri Pyetje: 1586

Cila nga qelizat e neuroglisë veshin pleksin korioid dhe ventrikujt e trurit?

- A) astroцитet
- B) oligodendrocitet
- C) mikroglia
- D) qelizat ependimale

Infermieri Pyetje: 1587

Zgjidhni thënien e pasaktë ndër të mëposhtmet lidhur me përçimin e impulsit nervor:

- A) Përçimi i impulsit nervor bëhet sipas ligjit gjithcka ose asgjë
- B) Një stimulim me intensitet më të lartë shkakton impulse më të fuqishme
- C) Përçimi i impulsit në fibrat e mielinizuara bëhet me kërcim nga një nyje Ranvier në tjetrën
- D) Arritja e potencialit të veprimit rrit përshkueshmërinë e membranës aksonale

Infermieri Pyetja: 1588

Neurotransmetuesit të cilët rrisin për meabilitetin e membranës post sinaptike për jonet Na, dhe potencojnë impulsin nervor quhen neurotransmetues:

- A) inhibitorë
- B) eksitues
- C) aktive
- D) neutral

Infermieri Pyetja: 1589

Pjesa fillestare e harkut reflektor është:

- A) interneuroni
- B) fijet efektore
- C) receptoëet ndijësor
- D) neuroni motor

Infermieri Pyetja: 1590

Aktiviteti elektrik i muskulit vlerësohet me:

- A) EEG
- B) EMG
- C) ECG
- D) MRI

Infermieri Pyetja: 1591

Cili është rajoni i retinës që përgjigjet për mprehtësinë e pamjes?

- A) Sclera
- B) Lëngu qelqor
- C) Fovea centralis
- D) Disku optic

Infermieri Pyetje: 1592

Kontrolli i çlirimit hormonal bëhet nga organizmi me të gjitha rrugët e mëposhtme përveç:

- A) feedback negative
- B) stimulim nervor
- C) çlirim i HO kontrolluese
- D) auto destruksion i gjendrës endocrine

Infermieri Pyetje: 1593

Hormonet e mëposhtme çlirohen nga antehipofiza, përveç:

- A) FSH
- B) TSH
- C) ACTH
- D) HAD

Infermieri Pyetje: 1594

Hormoni i prodhuar në korteksin e gjendrës mbiveshkore që vepron në veshkë duke mbajtur Na e duke eliminuar K, dhe që indirekt ndikon në ruajtjen e presionit arterial është:

- A) Aldosteroni
- B) Epinefrina
- C) Kortizoli
- D) Adrenalina

Infermieri Pyetje: 1595

Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç:

- A) rënie në peshë
- B) rritje të metabolizmit bazal
- C) rritje të debitit kardiak
- D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve

Infermieri Pyetje: 1596

Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja?

- A) Globina
- B) I gjithë eritrociti
- C) Biliverdina
- D) Hekuri

Infermieri Pyetje: 1597

Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe acid folik

Infermieri Pyetje: 1598

Zgjidhni alternativën e cila përshkruan në mënyrë të saktë fazat e hemostazës:

- A) kogulim i gjakut, formim i trombit, spazme e enës së gjakut
- B) formim i trombit, koagulim i gjakut, spazmë e enës së gjakut
- C) spazmë e enës së gjakut, formim i tapës trombocitare, formim i koagulit
- D) spazmë e enës së gjakut, koagulim i enës së gjakut, formim i trombit

Infermieri Pyetje: 1599

Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç:

- A) rënie në peshë
- B) rritje të metabolizmit bazal
- C) rritje të debitit kardiak
- D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve

Infermieri Pyetja: 1600

Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja?

- A) Globina
- B) gjithë eritrociti
- C) Biliverdina
- D) Hekuri

Infermieri Pyetja: 1601

Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe acid Folik

Infermieri Pyetja: 1602

Cila pjesë e zemrës funksionon si pacemaker duke dërguar impulse?

- A) nyja sino-atriale
- B) nyja atrio-ventrikulare
- C) fijet Purkinje
- D) tufa e Hiss

Infermieri Pyetja: 1603

Kompleksi QRS në ECG tregon:

- A) depolarizim të atriumeve
- B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit
- C) repolarizim të ventrikujve
- D) zemren në qetësi

Infermieri Pyetje: 1604

Çfarë e inicion refleksin e gëlltitjes?

- A) Frika nga gëlltitja
- B) Gjuha që vërtitet në gojë
- C) Receptorët sensorë që ndiejnë ushqimin në farings
- D) Receptorët e shijes

Infermieri Pyetje: 1605

Receptorët e dëgjimit vendosen në:

- A) kanalet semicirkulare
- B) koklea
- C) sakula
- D) vestibule

Infermieri Pyetje: 1606

Cilat qeliza të stomakut sekretojnë faktorin intrinsek?

- A) Të mukozës
- B) Parietale
- C) Peptike
- D) G

Infermieri Pyetje: 1607

Cila nga të mëposhtmet nuk është përbërje e lëngut pankreatik?

- A) Kimotripsina
- B) Amilaza
- C) Bikarbonatet
- D) Acidi klorhidrik

Infermieri Pyetje: 1608

Lipoproteina që ul tensionin sipërfaqësor të alveolave dhe i bën ato të mos kolabohen quhet:

- A) Fosfolipid
- B) Lipoproteinë alveolare
- C) Surfactant
- D) Tensinogjen

Infermieri Pyetje: 1609

Sasia maksimale e ajrit që një përson mund të expirojë pas frymëmarrjes më të thellë të mundshme është:

- A) kapaciteti pulmonar total
- B) vëllimi expirator rezervë
- C) vëllimi residual
- D) vëllimi rezervë inspirator

Infermieri Pyetje: 1610

Imuniteti qelizor sigurohet nga:

- A) A .makrofagët
- B) Bazofilet
- C) Qelizat T
- D) Qelizat B

Infermieri Pyetje: 1611

Oksigjeni transportohet në gjak kryesisht si:

- A) O₂ i tretur në plazëm
- B) deoksihemoglobinë
- C) oksihemoglobinë
- D) karbaminëhemoglobinë

Infermieri Pyetja: 1612

Nyja sinoatriale:

- A) prodhon impulse me frekuence normale
- B) është udheheqesja e ritmit të zemres
- C) vendoset ne pjesen e pasme të atriumit të djathte
- D) asnjë nga të mesipër met

Infermieri Pyetja: 1613

Nuk ben pjese ne sistemin konduktor të zemres:

- A) tufa e Hisit
- B) nyja nderatriale
- C) nyja atrio-ventrikulare
- D) pema Purkinje

Infermieri Pyetja: 1614

Cila pjese e zemres funksionon si pacemaker duke derguar impulse?

- A) nyja sino atriale
- B) nyja atrio ventrikulare
- C) fijet Purkinje
- D) tufa Hissit

Infermieri Pyetja: 1615

Ne derivacionin e tretë të Elektrokardiogrames shprehet lidhja e:

- A) dora e majtë me kemben e majte
- B) dora e djathtë me kemben e majte
- C) komba e djathtë me doren e djathte
- D) komba e djathtë me doren e majte

Infermieri Pyetja: 1616

Nyja atrio-ventrikulare:

- A) prodhon impulse me frekuence normale
- B) është udheheqesja e ritmit të zemres
- C) vendoset në pjesën e pasme të septumit nderventrikular
- D) asnjë nga të mesipërmet

Infermieri Pyetja: 1617

Hematokriti është:

- A) vëll. eritrocitar / vëll. leukocitar, i shprehur në për qindje
- B) numri absolut i eritrociteve në gjak
- C) vëll. eritrocitar / vëll. e për gjith
- D) Vëll. Leukocitar/ vëll. Eritrocitar.

Infermieri Pyetja: 1618

Individet me grupin e gjakut AB kanë:

- A) vetëm antigenin B
- B) vetëm antigenin A
- C) antigenet A dhe B
- D) asnjërin prej tyre

Infermieri Pyetja: 1619

Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve?

- A) Ca
- B) Na
- C) proteinat
- D) vitamina B12 dhe ac. folik

Infermieri Pyetje: 1620

Volumi Tidal quhet:

- A) kapaciteti vital
- B) Volumi inspirator rezerve
- C) ajri respirator
- D) të gjitha të mesipër met

Infermieri Pyetje: 1621

Cili nga të mëposhtmit është funksion i membranës qelizore:

- A) .inicion transduksionin e sinjalit
- B) transporton jone dhe molekula të tjera
- C) formon kanale selektive
- D) të gjitha me sipër janë funksione të membranës qelizore

Infermieri Pyetje: 1622

Vala P në ECG tregon :

- A) .depolarizim të atriumeve
- B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit
- C) repolarizim të ventrikujve
- D) zemra në qetësi

Infermieri Pyetje: 1623

Cila nga të mëposhtmet nuk luan rol mbrojtës në traktin respirator:

- A) hunda
- B) goja
- C) epiteli respirator
- D) leukocitet

Infermieri Pyetje: 1624

Me cilin lloj procesi transportohet glukozja prej proteinës mbartëse nga një zonë me për qendrim më të lartë drejt një zone me për qendrim më të ulët:

- A) transport aktiv
- B) endocitozë
- C) difuzion i lehtësuar
- D) difuzion i thjeshtë

Infermieri Pyetje: 1625

Dhembja T shfaqet:

- A) gjatë depolarizimit të atriumit të majtë
- B) gjatë depolarizimit të ventrikulit të djathtë
- C) në fillim të sistoles atriale
- D) gjatë repolarizimit të zemrës

Infermieri Pyetje: 1626

Ajri rezidual i mushkerive :

- A) matet me spirometër
- B) varion nga 2000-3000 ml
- C) quhet sasia e ajrit që mbetet në mushkeri pas një frymënxjerrje të sforcuar
- D) quhet sasia e ajrit që del gjatë një frymënxjerrje normale

Infermieri Pyetje: 1627

Toni i dytë i zemrës ka vecoritë e mëposhtme, për vec njëra:

- A) është ton diastolik
- B) është ton i fortë
- C) është ton sistolik
- C) D) është ton i shkurtër

Infermieri Pyetja: 1628

Të gjitha me poshtë janë shenja të inflamacionit përveç;

- A) dhimbje
- B) skuqje
- C) ethe
- D) enjtje

Infermieri Pyetja: 1629

Hormoni I prodhuar ne kortexin e gjendres mbiveshkore qe vepron ne veshke duke mbajtur Na e duke eliminuar K,dhe qe indirect ndikon ne ruajtjen e për sionit arterial është:

- A) aldosteroni
- B) epinefrina
- C) kortizol
- D) adrenalina

Infermieri Pyetja: 1630

Qelizat shpenzojne rreth 40% të energjise se tyre ditore ne cilin prej proceseve;

- A) transport aktiv
- B) endocitoze
- C) exocytose
- D) difuzion të lehtesuar

Infermieri Pyetja: 1631

Segmentimi ne traktin tretes është karakteristike për :

- A) muskulaturen rrethore
- B) muskulaturen gjatesore
- C) asnjeren prej tyre
- D) muskulaturen e traktit tretes ne për gjithesi.

Infermieri Pyetja: 1632

Ku ndryshon fizilogjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lemuar dhe atij të strijuar:

- A) muskuli i lemuar kontraktohet me shpejt se ai i strijuar
- B) muskuli i strijuar përdordy neurotransmetues, ai i lemuar vetëm nje
- C) muskuli I lemuar Mund të shfaqe aktivitet spontan dhe Mund tëmodifikohet nga veprimi i HO
- D) muskulin kardiak

Infermieri Pyetja: 1633

Zgjidhni thenien e pasaktë nder të meposhtmet, lidhur me përcimin e impulsit nevor:

- A) për cimi i impulsit nervor behet sipas ligjit gjithcka ose asgje
- B) nje stimulim me intensitet me të lartë shkakton impulse me të fuqishme
- C) për cimi I impulsit ne fibrat e mielinizuara behet me kercim nga nje nyje Ranvier ne tjetren
- D) arritja e potencialit të veprimit rrit për shkueshmerine e membranesh aksonale

Infermieri Pyetja: 1634

Zgjidhni alternativën e cila për shkruan ne menyre të saktë fazat e hemostazes

- A) Active
- B) endocitoze
- C) difuzion i lehtesuar
- D) difuzion I thjeshtë

Infermieri Pyetja: 1635

Hormonet qe rregullojne metabolizmin e Ca^{++} ne gjak janë;

- A) insulina+ glukagoni
- B) glukagoni + PTH
- C) PTH+ kalcitonina
- D) estrogen + progesterone

Infermieri Pyetja: 1636

Hipofiza e pasme sekreton:

- A) FSH
- B) Oksitocine
- C) HAD
- D) asnjë

Infermieri Pyetja: 1637

Pjesa e sistemit nervor qe konsiderohet e pavullnetshme është;

- A) SN somatik
- B) SN autonom
- C) SN sensor
- D) SN motor

Infermieri Pyetja: 1638

Shendeti sipas teorise Bio-Mjekesore eshte:

- A) Mireqenie Shpirterore
- B) Mireqenie Fizike
- C) Mungese e semundjes
- D) Mireqenie mendore

Infermieri Pyetja: 1639

Shendeti sipas OBSH eshte:

- A) Gjendja e mireqenies se plote
- B) Mireqenie fizike dhe shpirterore
- C) Mireqenie mendore dhe shoqerore
- D) Mireqenie fizike, mendore dhe shoqerore

Infermieri Pyetje: 1640

Shëndeti Publik e ka fokusin:

- A) Në popullatë
- B) Në individë
- C) Në institucionet shëndetësore
- D) Në politikat shëndetësore.

Infermieri Pyetje: 1641

Shëndeti Publik e ka fokusin:

- A) Në parandalimin e sëmundjeve
- B) Në shërbimet shëndetësore
- C) Të dyja
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 1642

Shëndeti publik e ka fokusin në:

- A) Diagnostikimin e sëmundjeve
- B) Në trajtimin e sëmundjeve
- C) Në diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 1643

Parimet etike të shëndetit publik të "ri" janë:

- A) Barazia dhe solidariteti
- B) Vlerat morale
- C) Mospjesëmarrja
- D) Pjesëmarrja



Infermieri Pyetje: 1644

Karakteristika unike e shëndetit publik:

- A) Aplikimi i një disipline
- B) Aplikimi i trajtimit
- C) Aplikimi i parandalimit
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetje: 1645

Karakteristika unike e shëndetit publik:

- A) Aplikimi i njëkohshëm i shumë disiplinave
- B) Aplikimi i diagnostikimit
- C) Për dorim i burimeve financiare pa efikasitet
- D) Asnjëra



Infermieri Pyetje: 1646

Funksionet e shëndetit publik të "ri":

- A) Forcimi i infrastrukurës
- B) Udhëheqja e punës kërkimore-shkencore
- C) Adaptimi i një për qasje komunitare
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetje: 1647

Sfidat e shëndetit publik të ri:

- A) Obeziteti
- B) Asbestoza
- C) Kanceri i endometrit
- D) Bronkopneumonitë





Infermieri Pyetje: 1648

Epidemiologjia studion:

- A) Statistiken
- B) Higjenen
- C) Shpëshhtësine e semundjeve
- D) Metodatat

Infermieri Pyetje: 1649

Stili dhe menyrat e jetesës kanë të bëjnë me:

- A) duhanpirja
- B) Sjelljet seksuale
- C) Faktorët dietetike
- D) Të gjitha



Infermieri Pyetje: 1650

Qëllimi i një kërkimi epidemiologjik është:

- A) Ndricimi i faktorëve etiologjikë
- B) Studimet eksperimentale
- C) Studimet transversale
- D) Ndricimi i faktorëve dietetikë

Infermieri Pyetje: 1651

Randomizimi ndodh në:

- A) Studimet transversale
- B) Studimet rast-kontroll
- C) Studimet kohorte
- D) Asnjëra



Infermieri Pyetje: 1652

Pandemia i referohet:

- A) Rritjes incidences
- B) Rritjes së rrishtit relativ
- C) Rritjes së prevalencës
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 1653

Kurba epidemike përfaqëson :

- A) Incidencën
- B) Imunitetin e grupit
- C) Shpër ndarjen e periudhës të inkubacionit
- D) Prevalencën

Infermieri Pyetje: 1654

Fluoroza është një:

- A) Pandemi
- B) Endemi
- C) Epidemi
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 1655

Survejanca epidemiologjike është:

- A) Pasive
- B) Sentinele
- C) Aktive
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetje: 1656

Incidenca është:

- A) Numri i rasteve të reja
- B) Prevalence
- C) Studim rasti
- D) Numri total i rasteve

Infermieri Pyetje: 1657

Prevalenca është:

- A) Incidence
- B) Epidemi
- C) Risk relative
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 1658

Studimet deskriptive janë:

- A) Analitike
- B) Vezhuese
- C) Ekspërimentale
- D) Asnjëra

Infermieri Pyetje: 1659

Studimet analitike:

- A) Zbulojnë lidhje
- B) Provojnë hipotezë
- C) Rrezojnë hipotezë
- D) Të gjitha

Infermieri Pyetje: 1660

Per ribozomet nuk është e vërtetë që:

- A) në të kryhet sinteza e proteinave
- B) përmbajnë ARN
- C) përbehen nga subuniteti i madh dhe i vogël
- D) nuk përmbajnë proteina strukturore

Infermieri Pyetje: 1661

Nuk është e vërtetë që bërthama:

- A) ka përmasa të ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) ka formë të ndryshme në qeliza të ndryshme
- C) përmban material gjenetik në trajtën e ADN
- D) vendoset gjithmonë në qendër të qelizës

Infermieri Pyetje: 1662

ADN:

- A) Gëndet vetëm në bërthamë
- B) Shoqërohen nga proteinat histone
- C) Organizohet në kromozome
- D) Organizohet në kromatinë

Infermieri Pyetje: 1663

Formimi i njëkohshëm i eritrocitit, trombocitit dhe granulocitëve realizohet në:

- A) Një limfatikë
- B) Lien
- C) Palcën e kuqe të kockave
- D) Hepar

Infermieri Pyetje: 1664

Për neuronin është e gabuar që:

- A) është njësia morfologjike dhe funksionale e indit nervor
- B) nuk kanë aftësi të shumohen
- C) aksonet e tij për mbajnë lende tigroide
- D) dendritet janë më të shkurtër se aksoni

Infermieri Pyetje: 1665

Në veshkë sintetizohen substancat e mëposhtme, përveç:

- A) Reninës
- B) Eritropoetinës
- C) Aldosteronit
- D) Angiotensinogjenit

Infermieri Pyetje: 1666

Epiteli i kavitetit oral është:

- A) më i keratinizuar i trupit të njeriut
- B) pseudo-shumështresor prizmatik
- C) i mbuluar në sipërfaqe nga indi muskolor
- D) shumështresor i sheshtë

Infermieri Pyetje: 1667

Cili është pohim i gabuar për kompleksin Golxhi?

- A) Vendoset përballë bërthamës
- B) Është më i shprehur në qelizat sekretore
- C) Në to kryhet trafiku më i madh i makromolekulave
- D) Ndërmjet tij dhe rep-it ka komunikim direkt

Infermieri Pyetje: 1668

Gjeni pohimin e gabuar në lidhje me bërthamën:

- A) Madhësia e saj është e ndryshme në qeliza të ndryshme
- B) Qelizat kanë gjithmonë vetëm një bërthamë
- C) Ajo mund të gjendet në dy gjendje fizike
- D) Kromatina është përbërja kryesore e bërthamës

Infermieri Pyetje: 1669

Cila nga qelizat e mëposhtme nuk është autoktone në indin lidhor?

- A) Fibroblastet
- B) Eozinofilet
- C) Qelizat mezenkimale
- D) Mastocitet

Infermieri Pyetje: 1670

Për eritrocitet është e gabuar që:

- A) kanë bërthamë
- B) përmbajnë proteinën hemoglobinë
- C) kanë formën e diskut bikonkav
- D) kanë funksion transportin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit

Infermieri Pyetje: 1671

Për eozinofilet nuk është e vërtetë që:

- A) bëjnë pjesë në seritë granulocitare
- B) kanë granula specifike me nuancë portokalli
- C) kanë bërthamë të rumbullakët
- D) rritja e numrit të tyre quhet eozinofili



Infermieri Pyetje: 1672

Cili funksion nuk i përket neurologjisë?

- A) Mbështetës
- B) Ushqyes
- C) Përcjellës
- D) Kufizues

Infermieri Pyetje: 1673

Cilat qeliza nuk përbëjnë mukozën e kavitetit nazal?

- A) Olfaktore
- B) Parietale
- C) Mbështetëse
- D) Kaliciforme



Infermieri Pyetje: 1674

Në lëkurën e hollë mungon shtresa:

- A) bazale
- B) e shndritshme
- C) kokrrizore
- D) e brirëzuar

Infermieri Pyetje: 1675

Gjeni pohimin e gabuar mbi uterusin:

- A) Përbëhet nga tre shtresa
- B) Është vendi i implantimit të vezës së fekunduar
- C) Epiteli i tij përbëhet nga dy shtresa
- D) Shtresa muskulore është më e holla



Infermieri Pyetje: 1676

Fibrocitet kanë tipar karakteristike:

- A) Praninë e zgjatimeve të shumta citoplazmatike
- B) Organelet citoplazmatike të zhvilluara
- C) Formën boshtore të bërthamës
- D) Bërthamën eukromatinike

Infermieri Pyetje: 1677

Eritrocitet kanë tipar karakteristike:

- A) gjatësinë 60-80 milimetër
- B) ngjyrën blu të bërthamës
- C) diametrin 7-8 mikrometër
- D) formën bikonvekse

Infermieri Pyetje: 1678

Shëndeti Publik e ka fokusin në:

- A) Popullatë
- B) Individë
- C) Institucione shëndetësore
- D) Politika shëndetësore

Infermieri Pyetje: 1679

Palca e kockave nuk ka funksion:

- A) Hematoklazik
- B) Lokomotor
- C) Retikulo-endotelial
- D) Hemopoetik

Infermieri Pyetje: 1680

Fijet muskulare të skeletit në prerje tërthore janë:

- A) me formë poligonale
- B) me pamje të vijëzuar
- C) pa bërthamë
- D) me bërthamë në qendër të qelizës

Infermieri Pyetje: 1681

Qelizat e mikroglisë në sistemin nervor qendror janë:

- A) me funksion përcjellës
- B) me origjinë nga indi muskular
- C) me funksion fagocitar
- D) përbërëse të mielinit

Infermieri Pyetje: 1682

Mukoza olfaktore në kavitetin nazal mbulon:

- A) gjithë sipërfaqen
- B) pjesën sipër iore
- C) pjesën më të madhe
- D) pjesën inferiore

Infermieri Pyetje: 1683

Gjendrat sublinguale:

- A) prodhojnë sekrecion të përzier
- B) prodhojnë sekrecion vetëm seroz
- C) nuk kanë gjysmehënëza të xhianucit
- D) kanë qeliza centrocinare



Infermieri Pyetje: 1684

Në përbërje të acinusit pankreatik marrin pjesë edhe:

- A) ishujt e Langerhansit
- B) qelizat Sertoli
- C) qelizat Centroacinare
- D) qelizat Beta

Infermieri Pyetje: 1685

Në glomerula:

- A) Përqëndrohet urina
- B) Ka qeliza mezangiale
- C) Nuk ka podocitë
- D) Sintetizohet eritropoetina dhe renina

Infermieri Pyetje: 1686

Në terrenet qelizore nuk nevojiten:

- A) Kushtet aseptike
- B) Antinflatimet
- C) Bujonet organike
- D) Antibiotikët

Infermieri Pyetje: 1687

Në gjendjen vegjetative, vendimi për zgjatjen e jetës nëpërmjet ushqyerjes artificiale:

- A) bazohet në parimin e drejtësisë për shkak të burimeve të kufizuara shëndetësore
- B) promovon të mirën më të madhe, për një numër më të madh të popullsisë
- C) bazohet në të drejtën e patjetërsueshme për jetën e pacientit
- D) bazohet në ruajtjen e mirëqënies dhe i shërben interesave më të mira të pacientit



Infermieri Pyetje: 1688

Kujdesi mjekësor paliativ:

- A) i mundëson pacientit terminal një cilësi më të mirë jetese
- B) konsiston në zgjatjen e jetës së pacientit
- C) vepron mbi shkakun e një sëmundjeje
- D) përfshin vetëm terapinë që lehtëson dhimbjen fizike të pacientit

Infermieri Pyetje: 1689

Eutanazia pasive:

- A) është në përputhje me Betimin e Hipokratit
- B) kryhet me pjesëmarrjen aktive të pacientit
- C) zbatohet në sëmundje të pashërueshme, pavarësisht stadi të sëmundjes
- D) refuzon terapinë intensive që zgjat jetën e një të sëmuri terminal

Infermieri Pyetje: 1690

Në teoritë e jo pasojave veprimi është cilësuar i drejtë :

- A) nëse bazohet në virtetet e moralit
- B) nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore
- C) për aq kohë sa pasojat janë të mira
- D) nëse nga ky përfiton vetë personi

Infermieri Pyetje: 1691

Plotësimi i detyrës së parandalimit të sëmundjeve ka çuar në konflikt me:

- A) detyrën e shtetit për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien publike
- B) parimin e ruajtjes së sekretit mjekësor
- C) detyrën profesionale për të mbrojtur shëndetin e pacientit
- D) interesat e shoqërisë

Infermieri Pyetje: 1692

Në teoritë e jo pasojave veprimi është:

- A) i drejtë nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore
- B) korrekt nëse funksionon dhe nëse është mëse i domosdoshëm
- C) i mirë për aq kohë sa efektet janë të mira
- D) i mirë nëse nga ky përfiton vetë për soni

Infermieri Pyetje: 1693

Cila nga karakteristikat e mëposhtme nuk i përket jatrogjenisë:

- A) ndodh më shpesh tek personat që kanë ndjeshmëri dhe predispozicion për sëmundje psikike
- B) njihen si sëmundje sugjestionuese në mjekësi
- C) kryhet me dashje nga profesionistët e shëndetësisë, zakonisht nga shpërdorimi i detyrës
- D) shkaktohen nga fjalët, gjestet apo mimika e njeriut të shëndetësisë

Infermieri Pyetje: 1694

Lëvizja "Hospice" u ofron ndihmë:

- A) personave me aftësi të kufizuara
- B) pacientëve të moshuar të braktisur nga familjarët
- C) pacientëve me sëmundje kronike
- D) të sëmurëve të pashpresë për jetën

Infermieri Pyetje: 1695

Testamenti i jetës:

- A) shoqërohet me kërkesën për të drejtën e vdekjes me dinjitet
- B) shkruhet nga personat e afërm të pacientit, në stadin terminal të sëmundjes
- C) hyn në fuqi pas vdekjes së pacientit
- D) mund të rritë nevojën për eutanazi të pavullnetshme

Infermieri Pyetja: 1696

Bazuar në argumentet kundër eutanazisë aktive, legalizimi i saj:

- A) rrit mundësinë për kujdes paliativ
- B) motivon respektin e shoqërisë për shenjtërinë e jetës
- C) ekspozon njerëzit e rrezikuar ndaj presionit për t'i dhënë fund jetës së tyre
- D) inkurajon kërkime për mjekime të reja për të sëmurët terminalë

Infermieri Pyetja: 1697

Në dhimbjen kronike, pacienti:

- A) adaptohet me dhimbjen
- B) flet shumicën e kohës për dhimbjen
- C) ka ankth të shtuar
- D) shfaq reagime fiziologjike të ngjashme me dhimbjen akute

Infermieri Pyetja: 1698

Të trajtosh pacientin si një të tërë do të thotë:

- A) t'i lejonsh pacientit të bëhet një marrës pasiv i kujdesit ndaj tij
- B) të fokusohesh vetëm tek sëmundja e tij
- C) të pajtohesh me nocionin e paternalizmit
- D) t'i lejonsh të ushtrojë autonominë morale

Infermieri Pyetja: 1699

Qëllimi i utilitarizmit, si një teori etike perëndimore është:

- A) të sigurojë kënaqësi për një numër të kufizuar individësh
- B) të respektojë ligjet dhe rregulloren, pavarësisht nëse veprimi ka pasoja të mira ose jo
- C) të arrijë rezultate sa më mira, për një numër sa më të madh personash
- D) të frenojë kultivimin e një shoqërie imorale

Infermieri Pyetje: 1700

Koncepti i paternalizmit në etikën mjekësore tradicionale nuk inkurajon:

- A) parimin e të bërit mirë
- B) respektimin e autonomisë së pacientit
- C) parimin e të mos dëmtuarit të pacientit
- D) marrjen e vendimeve nga ana e mjekut, në emër të pacientit, bazuar në interesin më të mirë të tij

Infermieri Pyetje: 1701

Një dilemë etike:

- A) rezulton në një zgjedhje të drejtë apo të gabuar
- B) është një çështje pa një përfundim të kënaqshëm
- C) nuk paraqet vështirësi në marrjen e vendimit, nëse bazohemi në parimet etike
- D) krijon një konflikt vlerash, por që nuk çënon interesat e pacientit

Infermieri Pyetje: 1702

Cilat nga pohimet për konsentin është i gabuar:

- A) është në kundërshtim me të trajtuarit e njerëzve në mënyrë holistike
- B) është shprehje e parimit të autonomisë së pacientit
- C) bazohet në një komunikim të mirë profesionist shëndetësor-pacient
- D) nënkupton miratimin ose refuzimin e mjekimit nga ana e pacientit

Infermieri Pyetje: 1703

Deklarata e të Drejtave të Pacientit quhet ndryshe:

- A) deklarata e Lisbonës
- B) deklarata e Gjenevës
- C) kodi i Nurenbergut
- D) deklarata e Helsinkit

Infermieri Pyetje: 1704

Një infermier që vuan nga sindroma e konsumimit profesional:

- A) ka mjaft lodhje fizike, por ndihet i motivuar për punën e tij
- B) është mjaft produktiv si në karrierën profesionale dhe atë personale
- C) mban distancë ndaj të sëmurit
- D) ka frymë bashkëpunimi dhe ndarje idesh me kolegët e tij

Infermieri Pyetje: 1705

Në vlerësimin e dhimbjes tek pacienti, infermieri duhet të bazohet:

- A) vetëm në komunikimin verbal
- B) në reagimet e pacientëve ndaj dhimbjes, pavarësisht fazës së saj
- C) komunikimin verbal dhe joverbal
- D) vetëm në shkaqet e dhimbjes

Infermieri Pyetje: 1706

Misioni i mbështetjes shpirtërore ndaj të sëmurit terminal nuk përmbushet si duhet, nëse:

- A) profesionisti shëndetësor ka arritur të krijojë një raport të qartë me vdekjen
- B) kompetenca profesionale shihet si kusht i mjaftueshëm për të kryer këtë mision
- C) profesionisti ka trajnimin e duhur për të punuar në situata me ngarkesë të fortë emocionale
- D) profesionisti integron vdekjen brenda kuadrit të jetës duke i dhënë kuptim asaj

Infermieri Pyetje: 1707

Thënia e së vërtetës për një sëmundje terminale, sipas modelit participativ:

- A) profesionisti shëndetësor ka arritur të krijojë një raport të qartë me vdekjen
- B) nuk i tregohet pacientit duke e mbajtur me shpresë deri në fund të jetës së tij
- C) bazohet në gjykimin dhe vendimin e mjekut për të mirën e pacientit
- D) bazohet në dialog të hapur midis mjekut dhe të sëmurit duke i treguar pa asnjë

ngurim

Infermieri Pyetje: 1708

Detyrimi që kanë profesionistët e shëndetit ndaj kolegëve, pacientëve dhe të afërmeve të tyre lidhet me:

- A) përgjegjësinë personale
- B) përgjegjësinë profesionale
- C) përgjegjësinë tutoriale
- D) përgjegjësinë publike

Infermieri Pyetje: 1709

Cila nga deklaratat e mëposhtme njihet si variant i rinovuar i Betimit të Hipokratit:

- A) deklarata e Manilës
- B) deklarata e Helsinkit
- C) kodi i Nurenbergut
- D) deklarata e Gjenevës

Infermieri Pyetje: 1710

Hipersensitiviteti imediat zakonisht për fshin:

- A) Mastocitet
- B) IgG
- C) Trombocitet
- D) Makrofaget

Infermieri Pyetje: 1711

Një fëmijë ngacmon një fole grerëzash, thumbohet në mënyrë të përsëritur, dhe pëson shok brenda disa minutash, duke manifestuar insuficiencë respiratore dhe kolaps kardiovaskular. Kjo ka më tepër të ngjarë të ketë ndodhur nëpërmjet:

- A) Një reaksion Arthus
- B) Anafilaksisë sistematike
- C) Hipersensibilizimit citotoksik
- D) Sëmundjes së serumit

Infermieri Pyetje: 1712

Cila prej të mëposhtmeve nuk është sëmundje hipersensitiviteti?

- A) Angioedema e trashëguar
- B) Sindroma Goodpasture
- C) Etnet e barit
- D) Dermatiti i kontaktit

Infermieri Pyetje: 1713

Antitruapat IgG kundrejt proteinave të veta:

- A) Janë gjetur vetëm në pacientë me tumore
- B) Janë të prodhuara vetëm në shpirtke
- C) Mund të kalojnë placentën
- D) Janë më të zakonshme në meshkuj

Infermieri Pyetje: 1714

Cila nga sëmundjet e mëposhtme është sëmundje autoimmune?

- A) Hipërtesioni arterial
- B) Astma Bronkiale
- C) Diabeti i Sheqerit I-re
- D) Tetanozi

Infermieri Pyetje: 1715

Cila nga sëmundjet e mëposhtme nuk është autoimmune?

- A) Lupusi eritematoz
- B) Tonsiliti Akut
- C) Artriti Reumatizmal
- D) Sindroma Sjorgen

Infermieri Pyetje: 1716

Survejanca imune tumorale mund të ndermjetësohet nga:

- A) Mastocitet
- B) Neutrofilet
- C) Qelizat Langerhans
- D) Qelizat NK

Infermieri Pyetje: 1717

Transplantet ndermjet individëve gjenetikiisht identike (psh binjakeve identike):

- A) Nuk flaken, edhe në mungesë të terapise imuno-supresive
- B) Janë të flakur ngadale, si pasojë e antigeneve minore të histokompatibilitetit
- C) Janë subjektë të flakjes supër akute
- D) Nuk kemi flakje në rast transplantit veshke, por kemi flakje në rast transplantit lekure

Infermieri Pyetje: 1718

Përparësia kryesore e imunizimit pasiv mbi atë aktiv është që:

- A) Mund të administrohet nga goja
- B) Siguron antikorpe në mënyrë më të shpejtë
- C) Antikorpi qëndron për një kohë më të gjatë
- D) Për mban fillimisht IgM

Infermieri Pyetje: 1719

Imunizimi është:

- A) Një antigjen
- B) Një antikorp
- C) Një proces që prodhon imunitet
- D) Trajtim që përdor antikorpe

Infermieri Pyetja: 1720

Imunosupresioni është:

- A) Frenim i përgjigjes imune
- B) Nje proces qe prodhon imunitet
- C) Nje antikorp
- D) Trajtim qe përdorantikorpe

Infermieri Pyetja: 1721

Nje komplikim i rende i për dorimit të medikamenteve imunofrenuese është:

- A) Rritje e rrezikut për semundje autoimune
- B) Rritja e rrezikut për infeksione oportunistë
- C) Renia e flokeve
- D) Renia e për qendrimit të komplementit

Infermieri Pyetja: 1722

Cili nga organet e meposhtme nuk futet tek organet limfoide primare?

- A) Melcia
- B) Shpretka
- C) Palca e kockave
- D) Timusi

Infermieri Pyetja: 1723

Cila nga qelizat e meposhtme është mikrofaq?

- A) Eritrociti
- B) Neutrofili
- C) Trombociti
- D) Asnjëra nga të sipër për mendurat

Infermieri Pyetje: 1724

Cila nga rrugët e mëposhtme nuk ka të bëjë me aktivizimin e komplementit?

- A) Rruga alterne
- B) Rruga e ciklit të Krebsit
- C) Rruga e lecitinës
- D) Rruga klasike

Infermieri Pyetje: 1725

Cila nga shprehjet e mëposhtme nuk është e saktë?

- A) Imunogjeni është një substancë që stimulon një përgjigje imune
- B) Antigjeni është një substancë që reagon me produktet (elementet) e përgjigjes imune specifike
- C) Hapteni është një substancë që nuk është imunogjenike por që mund të reagojë me produktet e përgjigjes imune specifike
- D) Epitopi është pjesa e antitropit që lidhet me antigjenin

Infermieri Pyetje: 1726

Cila nga shprehjet e mëposhtme është e vertetë?

- A) Alergjen quhet çdo antigjen
- B) Alergjenet janë imunologjikisht të demshëm
- C) Alergjenet quhen ndryshe tolerogjene
- D) Asnjëra nga shprehjet e mësipërme nuk është e vertetë

Infermieri Pyetje: 1727

Cila nga vetitë e mëposhtme nuk është e vertetë për adjuvantet?

- A) Rekrutojnë qeliza që reagojnë ndaj antigjeneve
- B) Nxisin diferencimin dhe shumfishimin e qelizave imunokompetente
- C) Frenojnë prodhimin e antitropave
- D) Stimulojnë imunitetin qelizor.

Infermieri Pyetje: 1728

Cila nga thëniet e mëposhtme nuk është e vërtetë për IgG?

- A) Kalon placentën
- B) Depërton me vështirësi në inde
- C) Aktivizon komplementin
- D) Ka rol opsonizues

Infermieri Pyetje: 1729

Cila nga imunoglobulinat e mëposhtme është në bazë të sëmundjeve atopike?

- A) IgE
- B) IgA
- C) IgD
- D) IgG

Infermieri Pyetje: 1730

Cila nga qelizat nuk është pjesë e imunitetit qelizor specifik?

- A) Limfocitet B
- B) Limfocitet T
- C) Plazmocitet
- D) Qelizat e Kupferit

Infermieri Pyetje: 1731

Identifikimi I proteinave nëpër mjet ndarjes elektroforetike e më tej të testit serologjik të imunofluoreshencës është quajtur:

- A) Teknika ELISA
- B) Imunodifuzion
- C) Imunoelektroforeze
- D) Imunofluorescence

Infermieri Pyetja: 1732

Reaksionet e aglutinimit janë:

- A) Nderveprimi antigjeneve të tretshem me antikorpe IgG apo IgM
- B) Nderveprimi antigjeneve të partikulizuar me antikorpe IgM
- C) Test serologjik i bazuar ne shterimin e nje sasje të caktuar të komplementit ne prani të nje reaksioni antigjen-antikorp
- D) Test serologjik qe përdorantikorpe të shenuar me ngjyra floreshente

Infermieri Pyetja: 1733

Individet me grup gjaku të tipit AB:

- A) Janë Rh(D)-negativ
- B) Janë "marres universale" të transfuzioneve
- C) Kanëne qarkullim antikorpe anti-A dhe anti-B
- D) Kanetë njejin haplotip

Infermieri Pyetja: 1734

Sëmundja hemolitike e të sapolindurit nga papajtueshmeria e grupit të gjakut Rh kerkon qe antikorpet maternale të hyjne ne rrymen e gjakut. Kesisoj, mediatori i kesaj semundjeje është:

- A) Antikorp IgE
- B) Antikorp IgG
- C) Antikorp IgM
- D) Antikorp IgA

Infermieri Pyetja: 1735

Nje reaksion madhor transfuzioni Mund tëshfaqet nese marresi:

- A) Ka antikorpe ndaj qelizave të transfuzuara
- B) Ka qeliza T reaktive ndaj antigjeneve të grupeve të gjakut
- C) Është kompatibel për RhD
- D) Është AB pozitiv

Infermieri Pyetje: 1736

Cili nga reaksionet e mëposhtme është më i rrezikshëm për jetën?

- A) Hemolitik jashtëvazal
- B) Hemolitik brendavazal i shpejtë
- C) Hemolitik brendavazal i vonuar
- D) Febril joheolitik

Infermieri Pyetje: 1737

Ku nuk janë të rëndësishme grupet e gjakut?

- A) Transfuzione
- B) Shtatzani
- C) Psikologji
- D) Kriminalistike

Infermieri Pyetje: 1738

Cili nga grupet është dhurues universal?

- A) A
- B) AB
- C) B
- D) O

Infermieri Pyetje: 1739

Kur mund të kemi semundje hemolitike të porsalindurit?

- A) Nena RhD-, fetusi RhD-
- B) Nena RhD+, fetusi RhD-
- C) Nena Rh D+, fetusi RhD+
- D) Nena RhD-, fetusi RhD+

Infermieri Pyetje: 1740

Cili nga të mëposhtmit nuk mund të jetë reaksion imun nga transfuzioni?

- A) Purpura post-Transfuzionale
- B) Sëmundja e grafit ndaj pritësit
- C) Infektimi me HIV
- D) Anafilaksia me IgE anti-IgA

Infermieri Pyetje: 1741

Cili nga të mëposhtmit nuk është grup i sistemit ABO?

- A) A
- B) B
- C) D
- D) AB

Infermieri Pyetje: 1742

Nese kemi dy prind me grupe gjaku për katësisht: babai AB, Rh- dhe nena B, RhD-, cili nga fëmijët e mëposhtëm nuk mund të jetë i tyre?

- A) A, RhD-
- B) O, RhD-
- C) B, RhD-
- D) AB, RhD-

Infermieri Pyetje: 1743

Imuniteti aktiv i fituar natyrisht është:

- A) Një rezistenca individuale ndaj disa sëmundjeve të paracaktuara gjenetikisht
- B) aftësia e trupit për të kundërvënë specifikisht organizmat apo substancat e huaja
- C) Imunitet si pasojë e infeksionit
- D) Imunitet si pasojë e vaksinimit

Infermieri Pyetja: 1744

Imuniteti pasiv i fituar natyralisht  sht :

- A) Antitrupa t  transferuar pasivisht nga nje nene t  fetusi apo i sapolindur
- B) Antitrupa t  transferuar nga nje njeri i shendetshem i imunizuar tek nje tjetere
- C) Imunitet si pasoj  e infeksionit
- D) Imunitet i fituar si pasoj  e transplantit t  palces se kuqe t  kockave.

Infermieri Pyetja: 1745

T  sapolindurit:

- A) Marrin antitrupa IgM nga n na n p rmjet placent s
- B) Kan  virtualisht nje kompleks t  plot  t  antitropave maternale IgG
- C) Kan s hum  pak limfocit  n  qarkullimin e tyre
- D) Marrin qeliza B maternale

Infermieri Pyetja: 1746

Funksioni kryesor i neutrofileve  sht :

- A) Transporti i O₂ dhe CO₂
- B) Koagulimi i gjakut
- C) Fagocitoza
- D) Prodhimi i proteinave toksike kunder parazitave t  caktuar

Infermieri Pyetja: 1747

Aplikimi i vaksines DPT ne cilin nga tipet e meposhtme t  imunitetit do t  kontribuonte?

- A) Imunitetin aktiv natyral
- B) Imunitetin pasiv natyral
- C) Imunitetin aktiv artificial
- D) Imunitetin pasiv artificial

Infermieri Pyetja: 1748

Të gjitha qelizat e meposhtme për mbajne granula qe shërbejnë ne citotoksicitet dhe ne shkatërrimin e qelizave të huaja për veç:

- A) Neutrofil
- B) Qelizes vrasese natyrale
- C) Makrofagut
- D) Plazmocitit

Infermieri Pyetja: 1749

Funksioni kryesor i monociteve është:

- A) Prodhimi i antitropave
- B) Fagocitoza (kur ata maturohen ne makrofage)
- C) Citotoksiciteti jashtëqelizor
- D) Koagulimi i gjakut

Infermieri Pyetja: 1750

Cili është organ paresor i sistemit imun?

- A) Timusi
- B) Zemra
- C) Nyjet limfatike
- D) Shpretka

Infermieri Pyetja: 1751

Cili është organ qendror i sistemit imun?

- A) Veshka
- B) Nyjet limfatike
- C) Shpretka
- D) Palca kockore

Infermieri Pyetje: 1752

Si mastocitet edhe bazofilet:

- A) Janë fagocitues
- B) Çlirojnë histaminë
- C) Qarkullojnë në rrymen e gjakut
- D) Kanë receptore për antikorpe IgM

Infermieri Pyetje: 1753

Të gjitha pohimet në lidhje me antigenin janë të sakta, përveç njërit:

- A) Është një substancë kimike që mund të nxisë prodhimin e antittrupave apo qelizave T specifike
- B) Ai është, si rregull, substancë e huaj
- C) Ato janë substanca komplekse organike
- D) Ato janë substanca me peshë të vogël molekulare që kombinohet me një antitrup por që nuk mund të shkaktojnë prodhimin e tyre

Infermieri Pyetje: 1754

Roli i makrofageve gjatë një përgjigjeje me antitrupa është të:

- A) Gëlltisë antitrupa
- B) Sintetizojë antikorpe
- C) Trefte qeliza shenje të infektuara nga viruset
- D) Procesojë dhe prezantojë antigenin

Infermieri Pyetje: 1755

Zgjidh një stad korrekt të hapave të fagocitozës:

- A) Kemotaksis, aderence, digjestion, ekzocitoze
- B) Digjestion, kemotaksis, aderence, ekzocitoze
- C) Aderence, ekzocitoze, digjestion, kemotaksis
- D) Ekzocitoze, digjestion, kemotaksis, adherence

Infermieri Pyetje: 1756

Procesi me anë të cilit fagocitet janë tërhequr drejt mikroorganizmave quhet:

- A) Aderence
- B) Kemotaksis
- C) Digjestion
- D) Opsonizim

Infermieri Pyetje: 1757

Procesi me anë të cilit fagocitet i janë atashuar mikroorganizmave apo materialeve të tjera të huaja quhet:

- A) Aderence
- B) Kemotaksis
- C) Digjestion
- D) Opsonizim

Infermieri Pyetje: 1758

Procesi me anë të cilit mikroorganizmat e fagocituar janë vrarë nga enzimët lizozomale dhe agjentët oksidues quhet:

- A) Aderence
- B) Kemotaksis
- C) Digjestion
- D) Opsonizim

Infermieri Pyetje: 1759

Rruga klasike e aktivizimit të komplementit nis nga ndërveprimi i C1 me:

- A) Antigenin
- B) Faktorin B
- C) Komplekset antigen-IgG
- D) Lipopolisaharidet bakteriale

Infermieri Pyetje: 1760

Pacientet me ulje të rënde të nivelit të C3 përcihen të kënaqura:

- A) Numër i lartë infeksionesh virale të rënda
- B) Numër i lartë infeksionesh të rënda bakteriale
- C) Nivel i ulët i gama-globulinave
- D) Episoda të shpeshta të anemisë hemolitike

Infermieri Pyetje: 1761

IgA dimerike:

- A) Është e pranishme në qumësht
- B) Është e përhapur në ethe dhe barit
- C) Aktivizon komplementin me rrugën klasike
- D) Kalon placenten

Infermieri Pyetje: 1762

IgM humane:

- A) Kalon placenten
- B) Mbron sipërfaqet mukozale
- C) Është e kufizuar brenda vazave të gjakut
- D) Është antitrop i prodhuar nga qelizat plazmatike me afinitet të larta

Infermieri Pyetje: 1763

Klasa immunoglobulinike me për qëndrim më të lartë në gjakun e të porsalindurit është:

- A) IgE
- B) IgM
- C) IgA
- D) IgG

Infermieri Pyetje: 1764

Cili prej pohimeve të mëposhtme në lidhje me allotipat imunoglobulinike është i vertetë?

- A) Allotipat gjenden vetëm në zinxhret e rende
- B) Allotipet janë të përcaktuar nga gjene të klases 1 të KMPi
- C) Allotipet kufizojnë regjionet variabël
- D) Allotipet janë si pasojë e polimorfizmit gjenetik brenda specieve

Infermieri Pyetje: 1765

Cila nga klasat imunoglobulinike është pentamer?

- A) IgG
- B) IgA
- C) IgE
- D) IgM

Infermieri Pyetje: 1766

Antitrupi i shfaqur fillimisht në përgjigje të një infeksioni për herë të parë është:

- A) IgG
- B) IgM
- C) IgA
- D) IgD

Infermieri Pyetje: 1767

Antitrupi që kalon placentën është:

- A) IgG
- B) IgA
- C) IgD
- D) IgE

Infermieri Pyetje: 1768

Toleranca qendrore e limfociteve T ndodh në:

- A) Limfonodula
- B) Timus
- C) Shpretke
- D) Melçi

Infermieri Pyetje: 1769

Funksioni kryesor i limfociteve është:

- A) Për gjegjesia për imunitetin specifik
- B) Fagocitoza
- C) Prodhimi i heparinës apo histaminës
- D) Prodhimi i proteinave toksike kundër parazitëve të caktuar

Infermieri Pyetje: 1770

Prania në 70% të limfociteve CD3 pozitive tek një pacient tregon se ai e ka normal:

- A) Imunitetin humoral
- B) Imunitetin celular
- C) Numrin e limfociteve B
- D) Numrin e limfociteve T

Infermieri Pyetje: 1771

Një përgjigje imune primare në njënjëri të rritur sa kohë kërkon afërsisht të prodhojnë nivele të zbulueshme antikorpale në gjak?

- A) 12 orë
- B) 3 ditë
- C) 1 javë
- D) 3 javë

Infermieri Pyetje: 1772

Qeliza B e aktivizuar mund:

- A) Të prodhojë një klon plazmocitësh
- B) Të prodhojë direkt imunoglobulina
- C) Të prodhojë T-supresore
- D) Të prodhojë makrofage

Infermieri Pyetje: 1773

Kujtesa imunologjike është karakteristike e:

- A) Limfociteve T dhe Qelizave Vrasëse Natyrore
- B) Limfociteve B dhe qelizave dendritike
- C) Limfociteve T dhe B
- D) Makrofageve dhe Limfociteve B

Infermieri Pyetje: 1774

Normalisht nuk përmban mikroorganizma:

- A) Trakti i sipërme respirator
- B) Mushkeria
- C) Vagina
- D) Zorret e trasha

Infermieri Pyetje: 1775

Aftësia e një patogjeni për të shkaktuar një sëmundje duke kaluar mbrojtjet e mbartësit është quajtur:

- A) Patogjenicitet
- B) Virulencë
- C) Toksigjenicitet
- D) Invazion

Infermieri Pyetja: 1776

Leukocidinat janë:

- A) Të prodhuara nga disa bakterie që mund të shkatërrojnë neutrofilet
- B) Enzima të prodhuara nga bakterie që mund të shkaktojnë lizë të eritrociteve
- C) Enzima bakteriale që koagulojnë fibrinogjenin në gjak
- D) Grup enzimesh katabolizuese të fibrinës që shpërbëjnë koagulën e formuar nga trupi për izolimin e infeksionit

Infermieri Pyetja: 1777

Një fëmijë që nuk ka qelizat T apo B të detektueshme është probabilitet me defekt në:

- A) Timus
- B) Qeliat fagocitare
- C) Ndërveprimin qelizë T qelizë B
- D) Qelizat burimore me origjinë nga palca e kockave

Infermieri Pyetja: 1778

Qelizat T në limfonodula:

- A) Mungojnë në sindromen Di-George
- B) Shfaqen kryesisht në regjionin medular
- C) Janë të vetmet të tipit citotoksik
- D) Janë fagocituese

Infermieri Pyetja: 1779

Hypogamaglobulinemia e Bruton demonstron nga mungesa e

- A) Limfociteve B
- B) Makrofageve
- C) Limfociteve T
- D) Neutrofileve

Infermieri Pyetje: 1780

Ligji hyn në fuqi :

- A) që në momentin që miratohet në Parlament,
- B) 15 ditë pas publikimit në Fletoren Zyrtare,
- C) menjëherë pasi dekretohet nga Presidenti,
- D) asnjëra nga alternativat.

Infermieri Pyetje: 1781

Organë drejtuese të spitaleve janë :

- A) keshilli administrativ ,
- B) keshilli i ministrave,
- C) drejtorja,
- D) Keshilli administrativ dhe Drejtorja.

Infermieri Pyetje: 1782

Një infermier me shtetësi të huaj :

- A) Nuk mund të punojë në Shqipëri,
- B) mundet të punojë vetëm nëse është i anëtarësuar në një urdher në vendin e tij,
- C) Mund të punësohet në çdo rast,
- D) asnjë nga alternativat.

Infermieri Pyetje: 1783

Me detyrim për anëtarësi (sipas ligjit për urdhrin e infermierit) kuptojmë :

- A) asnjë individ nuk mund të ushtrojë profesionin e infermierit, mamisë apo fizioterapeutit pa qenë anëtar i Urdhrit të Infermierit,
- B) asnjë individ nuk mund të ushtrojë profesionin e infermierit, mamisë apo fizioterapeutit pa qenë anëtar i Urdhrit të Mjekut,
- C) Për të ushtruar profesionin nuk është i nevojshëm anëtarësimi në një Urdher Profesional
- D) asnjë nga alternativat.

Infermieri Pyetje: 1784

Ligji për Urdhrin e infermierit vepron:

- A) vetëm për infermieret , mamitë dhe fizioterapeutet në Tiranë,
- B) për infermieret , mamitë dhe fizioterapeutet në të gjithë Shqipëri,
- C) ndaj çdo infermieri në botë
- D) asnjëra nga alternativat.

Infermieri Pyetje: 1785

Urdhri i infermierit është i organizuar në :

- A) nivel bashkie/ kombëtar ,
- B) nivel rajonal/ kombëtar ,
- C) nivel institucione shëndetësore
- D) asnjë nga alternativat.

Infermieri Pyetje: 1786

Cila prej alternativave është faze e nxjerrjes së një ligji?

- A) Iniciativa ligjore,
- B) Miratimi,
- C) Shpallja,
- D) Të gjitha me sipër .

Infermieri Pyetje: 1787

Ligji i një shteti vepron :

- A) Në të gjithë territorin e atij shteti,
- B) Në atë shtet dhe në shtetë afër tij,
- C) vetëm në sipërfaqen tokësore të shtetit,
- D) vetëm në hapësirën ajrore.

Infermieri Pyetja: 1788

Urdhri i Infermierit :

- A) Subvencionohet vetëm nga shteti,
- B) Financohet vetëm nga kuotat e anetaresimit,
- C) Subvencionohet nga Shteti dhe financohet nga kuotat e anetaresimit
- D) Asnjëra me sipër .

Infermieri Pyetja: 1789

Cili prej këtyre kushteve nevojitet për të përfituar nga skema e sigurimeve shoqërore:

- A) Arritja e moshës së caktuar,
- B) vitet e punës ,
- C) pagesa e kontributit,
- D) të gjitha alternativat e mësipërme

Infermieri Pyetja: 1790

Sigurimet shoqërore janë :

- A) pagese për sonale ,
- B) detyrim administrativ,
- C) I paguajnë vetëm pensionistet,
- D) I paguajnë vetëm të punësuarit në ndërmarrjeprivate.

Infermieri Pyetja: 1791

Kontributi mund të jetë:

- A) I detyrueshëm,
- B) Vullnetar ,
- C) Penal,
- D) I detyrueshëm ose vullnetar.

Infermieri Pyetje: 1792

Sëmundja kromozomike që karakterizohet nga labiopalatoskiza, prapambetje mendore dhe fizike është:

- A) sindroma Down
- B) sindroma Turner
- C) sindroma Patau
- D) sindroma Klinefelter

Infermieri Pyetje: 1793

Një gjenotip XO shfaqet në:

- A) sindromën Patau
- B) trizominë 21
- C) sindromën Klinefelter
- D) sindromën Turner

Infermieri Pyetje: 1794

Cilat nga sindromat e mëposhtme është sindromë gjenetike që rrjedh nga delecionet?

- A) S. down
- B) S. chri-du-cat
- C) S. Patau
- D) S. Edwards

Infermieri Pyetje: 1795

Cila nga sëmundjet e mëposhtme tejçohet në mënyrë recesive të lidhur me X?

- A) Akondroplazia
- B) Albinizmi Okular
- C) Hemofilia B
- D) Rakitizmi rezistent ndaj vitaminës D

Infermieri Pyetje: 1796

Një pacient/e paraqet pilozitet të pakësuar, hipogonadizm, inteligjencë normale, gjinekomasti. Dyshojmë për Sindromën:

- A) Klinefelter
- B) Edwards
- C) Down
- D) Turner

Infermieri Pyetje: 1797

Në një qelizë me një numër $2n+1$ kromozomesh, kemi të bëjmë me:

- A) aneuploidi
- B) monozomi
- C) triploidi
- D) trizomi

Infermieri Pyetje: 1798

Sindroma Down ka:

- A) Deficiencë imunitare
- B) mekanizmi gjenetik në mbi 90% të rasteve është mosshkëputja e kromozomeve në mejozë
- C) facies lunata
- D) të gjitha

Infermieri Pyetje: 1799

Në qoftë se një çift ka një fëmijë me sëmundjen e Fibrozës Cistike, shansi për të pasur një fëmijë tjetër të prekur nga kjo sëmundje është:

- A) 10%
- B) 25%
- C) 50%
- D) 75%

Infermieri Pyetje: 1800

Në mitozë, qelizat me 16 kromozome prodhojnë qeliza bija ku secila ka:

- A) 32 kromozome
- B) 8 kromozome
- C) 16 kromozome
- D) 16 çifte kromozomesh.

Infermieri Pyetje: 1801

Në mejozë, qelizat me 32 kromozome prodhojnë qeliza bija ku secila ka:

- A) 32 kromozome
- B) 8 kromozome
- C) 16 kromozome
- D) 4 çifte kromozomesh.

Infermieri Pyetje: 1802

Është një çrregullim i rëndë i metabolizmit të purinave që shoqërohet me efektet klinike të prapambetjes mendore dhe tendencës për vetëshkatrim:

- A) Tay-sachs
- B) Galaktozemia
- C) Lesch-Nyhan
- D) Alkaptonuria

Infermieri Pyetje: 1803

Ne cilën sëmundje autozomike recesive, Fenilalaninë hidroksilaza është defektoze?

- A) Alkaptonuria
- B) Homosistinuria
- C) Albinizmi
- D) Fenilketonuria

Infermieri Pyetje: 1804

Cila nga hipotezat e mëposhtme është më e sakta për sa i përket produktit të një gjeni?

- A) Një gjen-një proteine
- B) Një gjen-një sheqer
- C) Një gjen-një ADN
- D) Një gjen-një tipar

Infermieri Pyetje: 1805

Mejoza:

- A) Ndodh në të gjitha qelizat që përbejnë organizmin
- B) Është e përberë nga një ndarje e vetme
- C) Ndodh vetëm në qelizat e linjës seksuale
- D) Prodhon 4 gametë haploide si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat

Infermieri Pyetje: 1806

Nga sa kopje kromozomesh përbëhet kariotipi human normal?

- A) 23
- B) 24
- C) 22
- D) 20

Infermieri Pyetje: 1807

ADN-ja nuk mund të analizohet nga:

- A) Eritrocitet
- B) Nga sistemi nervor
- C) Spër matozoidet
- D) Floket

Infermieri Pyetje: 1808

Cili prej klasifikimeve të mëposhtme është më i lartë se klasifikimi i klasës?

- A) familja
- B) Brendi
- C) tipi
- D) lloji

Infermieri Pyetje: 1809

Proteinet formohen nga bashkimi në varg i:

- A) ribozomeve
- B) nukleotideve
- C) aminoacideve
- D) karboneve

Infermieri Pyetje: 1810

Cili prej sheqernave të mëposhtme gjëndet tek ADN?

- A) riboza
- B) hekzoza
- C) fruktoza
- D) dezoksiriboza

Infermieri Pyetje: 1811

Cili prej sheqernave të mëposhtme gjëndet tek ARN?

- A) riboza
- B) hekzoza
- C) fruktoza
- D) dezoksiriboza

Infermieri Pyetje: 1812

Karbohidratet në trupin e njeriut kanë funksion:

- A) energjistik
- B) levizës
- C) riprodhues
- D) mitotik

Infermieri Pyetje: 1813

Cili prej organeve nuk gjëndet në qelizën shtazore?

- A) ribozomet
- B) mitokondritë
- C) kloroplastet
- D) REP

Infermieri Pyetje: 1814

Shtresën lipidike të membranës qelizore e përshkruajnë plotësisht :

- A) kokat polare
- B) nukleotidet
- C) bishtat polarë
- D) proteinat

Infermieri Pyetje: 1815

Acidet nukleike gjenden në :

- A) bërthamë
- B) mikondri
- C) REP
- D) Ap.Golxhit

Infermieri Pyetje: 1816

Tek molekula e ADN, sasia e Guaninës është e barabartë me sasinë e:

- A) Adeninës
- B) Citozinës
- C) Timinës
- D) Uracil

Infermieri Pyetje: 1817

Tek molekula e ADN, sasia e Citozinës është e barabartë me sasinë e:

- A) Adeninës
- B) Guaninës
- C) Timinës
- D) Uracil

Infermieri Pyetje: 1818

Tek molekula e ADN, sasia e Adeninës është e barabartë me sasinë e:

- A) Guaninës
- B) Citozinës
- C) Timinës
- D) Uracil

Infermieri Pyetje: 1819

Tek molekula e ADN, sasia e Timinës është e barabartë me sasinë e:

- A) Adeninës
- B) Citozinës
- C) Guaninës
- D) Uracil

Infermieri Pyetje: 1820

Procesi i kundërt me ekzocitozën është :

- A) fagocitoza
- B) osmoza
- C) transport pasiv
- D) difuzioni

Infermieri Pyetje: 1821

Procesi qelizor gjatë të cilit lëndet kalojnë përmes një membranë nga përqëndrimi më i madh drejt përqëndrimit më të vogël:

- A) osomozë
- B) transport aktiv
- C) difuzion
- D) endocitozë

Infermieri Pyetje: 1822

Membrana qelizore është e përbërë nga një shtresë e dyfishtë e :

- A) proteinave
- B) enzimave
- C) karbohidrateve
- D) lipideve

Infermieri Pyetje: 1823

Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë epiteliale tek njeriu është:

- A) 22
- B) 44
- C) 23
- D) 46

Infermieri Pyetje: 1824

Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë vezë tek njeriu është:

- A) 22
- B) 44
- C) 23
- D) 46

Infermieri Pyetje: 1825

Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë epiteliale tek njeriu është:

- A) 1
- B) 23
- C) 2
- D) 46

Infermieri Pyetje: 1826

Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë vezë tek njeriu është:

- A) 1
- B) 22
- C) 2
- D) 46

Infermieri Pyetje: 1827

Kromozomet gjenden të bashkuara me anë të :

- A) centromerit
- B) nukleotidit
- C) bërthamzës
- D) centriolit

Infermieri Pyetje: 1828

Në qelizën vezë të njeriut sa është numri i kromozomeve Y :

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 23

Infermieri Pyetje: 1829

Në qelizën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve X:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 46

Infermieri Pyetje: 1830

Në qelizën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve Y:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 46

Infermieri Pyetje: 1831

Në qelizën trupore të një femre sa është numri i kromozomeve Y:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 46

Infermieri Pyetje: 1832

Cikli Krebsit zhvillohet në:

- A) matriksin mitokondrial
- B) krështën mitokondriale
- C) hapësirën ndërmembranore
- D) citoplazmë

Infermieri Pyetje: 1833

Etapa e glikolizës së frymëmarrjes qelizore zhvillohet në:

- A) matriksin mitokondrial
- B) krështën mitokondriale
- C) hapësirën ndërmembranore
- D) citoplazmë

Infermieri Pyetje: 1834

Cili acid formohet në fund të glikolizës?

- A) acidi laktik
- B) acidi piruvik
- C) acidi oksalacetik
- D) acidi citrik

Infermieri Pyetje: 1835

Sa ATP fitohen në fund të etapës së glikolizës?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Infermieri Pyetje: 1836

Cili është acidi që ripërtëritet gjatë Ciklit të Krebsit?

- A) acidi laktik
- B) acidi piruvik
- C) acidi oksalacetik
- D) acidi citrik

Infermieri Pyetje: 1837

Cila molekulë ka si funksion transportin e elektroneve gjatë frymëmarrjes qelizore?

- A) ATP
- B) O₂
- C) NADH₂
- D) Acetil-Co

Infermieri Pyetje: 1838

Ne cilin prej organeleve të mëposhtme kryhet tretja qelizore:

- A) Ap. Golxhi
- B) bërthamë
- C) REP
- D) lizozome

Infermieri Pyetje: 1839

Në cilin organel formohet ATP qelizore:

- A) Ap. Golxhi
- B) bërthamë
- C) REP
- D) mitokondri

Infermieri Pyetja: 1840

Molekula e ADN-polimerazës përfqëson një:

- A) acid
- B) ADN
- C) nukleotid-ADN
- D) enzimë

Infermieri Pyetja: 1841

Në fund të frymemarjes qelizore sa molekula ATP fitohen :

- A) 2
- B) 32
- C) 36
- D) 4

Infermieri Pyetja: 1842

Sa NADH₂ formohen gjatë Ciklit të Krebsit?

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8

Infermieri Pyetja: 1843

Sinteza e ARNm nga ADN kryhet në:

- A) REP
- B) mitokondri
- C) bërthamë
- D) Ap.Golxhi

Infermieri Pyetja: 1844

Kryqëzohen dy prindër me sy të zinj. Ata kanë një fëmijë me sy blu. Sa është probabiliteti të kenë një fëmijë më sy të zinj?

- A) 1/2
- B) 3/4
- C) 1/4
- D) 2/3

Infermieri Pyetja: 1845

Një njeri me grupin e gjakut O, si e ka gjenotipin:

- A) IAIA
- B) IAIO
- C) IOIA
- D) IOIO

Infermieri Pyetja: 1846

Nëse një grua me grup gjaku A martohet me një burrë me grupin e gjakut B, dhe kanë një vajzë me grup gjaku O, si do të jetë gjenotipi i gruas?

- A) IAIB
- B) IBIA
- C) IAIO
- D) IAIA

Infermieri Pyetja: 1847

Mënyra e osifikimit ku prej disa pikash fillestare në indin embrional osifikimi përhapet në formë rrezore, quhet osifikim:

- A) endokondrial
- B) për ikondrial
- C) për iostal
- D) endesmal

Infermieri Pyetja: 1848

Mënyra e osifikimit kur indi kockor depozitohet në sipërfaqen e jashtëme dhe zë vëndin e indit kërcor quhet :

- A) endokondrial
- B) për ikondrial
- C) për iostal
- D) endesmal

Infermieri Pyetja: 1849

Në qarkullimin e gjakut proteina hemoglobin lidhet me :

- A) CO₂
- B) H₂O
- C) H₂
- D) O₂

Infermieri Pyetja: 1850

Në fund të ovogjenëzës, sa qeliza vezë formohen:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Infermieri Pyetja: 1851

Tabletat janë:

- A) ekstraktë alkolike
- B) pluhura të komprimuara ne makineri të posaçme
- C) forma farmaceutike të buta që përdoren për lyerjen e lëkurës
- D) tretësira ujore që përdoren me anë të aparateve të posaçme

Infermieri Pyetja: 1852

A është e vërtetë se rruga natyrale e marrjes së barit është :

- A) Subkutane
- B) Intramuskulare
- C) Intravenoze
- D) Inhalatore

Infermieri Pyetja: 1853

A është e vërtetë se gjatë administrimit të barit me rrugë intravenoze;

- A) efekti i barit është i ngadaltë
- B) efekti i barit është i kontrollueshem
- C) nuk Mund tëjapim sasi të madhe bari
- D) reaksionet anafilaktike janë me të lehta

Infermieri Pyetja: 1854

A është e vërtetë se gjatë administrimit të barit me rrugë intramuskulare vendi më i shpësthtë i aplikimit të injeksionit në fëmijët e vegjël është muskuli?

- A) deltoid
- B) ventrogluteal
- C) dorsogluteal
- D) vastus lateralis

Infermieri Pyetja: 1855

Efekti anesor kryesor i alfa-adrenoblokuesve është :

- A) Hypotensioni i theksuar postural
- B) Retensioni urinar
- C) Diareja
- D) Dhimbje artikulare



Infermieri Pyetja: 1856

Beta-blokuesit për doren për mjekimin e:

- A) Podagres
- B) Diabetit
- C) Takiaritmive
- D) Bronkitit kronik

Infermieri Pyetja: 1857

Beta-blokuesit kunderindikohen ne:

- A) Insuficiencen kardiake
- B) Hypër tension
- C) Takikardi
- D) Ne semundjen migrenoze



Infermieri Pyetja: 1858

Kolinomimetiket shkaktojne:

- A) Midriaze
- B) Ulin djersitjen
- C) Bradikardi
- D) Bronkodilatacion

Infermieri Pyetja: 1859

Kolinomimetiket përdoren për mjekimin e:

- A) Glaukomes
- B) Astmes bronkiale
- C) Bradikardive
- D) Diareve acute



Infermieri Pyetja: 1860

Kolinomimetiket kunderindikohen ne;

- A) Bradikardi
- B) Retensionin urinar
- C) Hipër tireoze
- D) Artritin rheumatoid

Infermieri Pyetja: 1861

M-kolinoblokuesit shkaktojne:

- A) Mioze
- B) Shtim të sekrecioneve bronkiale
- C) Bronkodilatacion
- D) Bradikardi

Infermieri Pyetja: 1862

Efekti anesor kryesor qe vihet re gjatë për dorimit të miorelaksanteve është;

- A) Apnea
- B) Hipër tensioni
- C) Hipër natremia
- D) Hipotermia

Infermieri Pyetja: 1863

Aspirina për doret për mjekimin e;

- A) Ethes reumatizmale
- B) Për uljen e tempër atures ne moshat pediatrike
- C) Insuficiences renale
- D) Parkinsonit

Infermieri Pyetja: 1864

Cili nga keto barna anestezik jep rritje të tensionit arterial:

- A) Tiopentali
- B) Midazolami
- C) Ketamina
- D) Fentanyl

Infermieri Pyetja: 1865

Benzodiazepinat shfaqin efekt:

- A) Eksitues
- B) Hipër tensiv
- C) Myorelaksant
- D) Anksioz

Infermieri Pyetja: 1866

Barbituratet kunderindikohen ne:

- A) Epilepsi
- B) Porfiri
- C) Hypër tension
- D) Takikardi

Infermieri Pyetja: 1867

Bari i zgjedhur për mjekimin e statusit epileptik është:

- A) Acidi Valproik
- B) Karbamazepina
- C) Diazepam
- D) Trimetadioni

Infermieri Pyetja: 1868

A është e vërtetë se antipsikotiket kunderindikohen ne;

- A) Parkinson
- B) Alzheimer
- C) Skizofreni
- D) Ne pacientet me të vjella

Infermieri Pyetja: 1869

Kripërat e litiumit për doren për mjekimin e ;

- A) Epilepsise
- B) Parkinsonit
- C) Gjendjes maniakale
- D) Miastenise grave

Infermieri Pyetja: 1870

Kofeina për doret për mjekimin e;

- A) Insuficiences akutë cirkulatore
- B) Hipër tensionit
- C) Takikardise
- D) Hipër tireoze

Infermieri Pyetja: 1871

Glukozidet kardiake kunderindikohen ne:

- A) Flaterin atrial
- B) Fibrilacionin atrial
- C) Infarktin e miokardit
- D) Takikardine paroksizmale supraventrikulare

Infermieri Pyetja: 1872

Kinidina për doret për mjekimin e :

- A) Aritmive atriale
- B) Astmes bronkiale
- C) Parkinsonit
- D) Epilepsise

Infermieri Pyetja: 1873

Bari i preferuar nw aritmitë e shkaktuara nga helmimi me digitalike wshtë:

- A) Verapamili
- B) Amidaroni
- C) Difedani
- D) Lidokaina

Infermieri Pyetja: 1874

Bari qe preferohet ne mjekimin e krizes anginoze është;

- A) Propanololi
- B) Kinidina
- C) Digoksina
- D) Trinitrina

Infermieri Pyetja: 1875

Cili nga barnat kalciblokues mund të përdoret edhe si antiaritmik?

- A) Nifedipina
- B) Verapamili
- C) Amlodipina
- D) Nikardipina



Infermieri Pyetja: 1876

Diuretiket osmotike përdoren për mjekimin e:

- A) Hipertensionit
- B) Edemave cerebrale
- C) Sindromin nefrotik
- D) Asnjëra nga keto thenie nuk është e vërtetë

Infermieri Pyetja: 1877

Diuretiket tiazidike kunderindikohen ne:

- A) Hipertoni
- B) Insuficiencen renale
- C) Edemen kardiake
- D) Edemen hepatike



Infermieri Pyetja: 1878

A.C.E. inhibitorët kundërindikohen në:

- A) Hipertension
- B) Diabet
- C) Hiperkalemi
- D) Insuficiencë kardiake

Infermieri Pyetja: 1879

BMI është raporti i :

- A) LDL/HDL kolesterol
- B) gjatësi/peshë trupore
- C) perimetër abdominal/perimetër gluteal
- D) asnjë nga të mësipërmet





Infermieri Pyetja: 1880

Kalciumi rekomandohet si suplement në:

- A) urolitiazë
- B) kolelitiazë
- C) diabet mellitus
- D) menopauzë

Infermieri Pyetja: 1881

Jodi rekomandohet si suplement në:

- A) Kancerin e tiroides
- B) Hipertireozë
- C) 3 mujorin e parë të shtatzanisë
- D) Të gjitha të mesipërmet



Infermieri Pyetja: 1882

Hekuri perthithet më mirë nëse shoqërohet me:

- A) vitaminë D
- B) acid folik
- C) vitaminë C
- D) magnez

Infermieri Pyetja: 1883

Proteinat duhet të zënë përqindjen e mëposhtme në kalorazhin ditor:

- A) 30-35%
- B) 50%
- C) 15-20%
- D) 40%





Infermieri Pyetja: 1884

Hekuri është i nevojshëm në të gjitha gjendjet e mëposhtme përveç:

- A) anemi
- B) sëmundjet e veshkave
- C) shtatzani
- D) osteoporozë

Infermieri Pyetja: 1885

Në konstitucionin android:

- A) perimetri abdominal = perimetri gluteal
- B) perimetri abdominal > perimetri gluteal
- C) perimetri torakal > perimetri gluteal
- D) perimetri gluteal > perimetri abdominal



Infermieri Pyetja: 1886

Defiçiti i vitaminës D tek fëmijët çon në:

- A) Malabsorbim
- B) Rakitizëm
- C) Diabet Melitus
- D) Diabet insipid

Infermieri Pyetja: 1887

Obeziteti është pjesë e:

- A) Sindromit metabolik
- B) Sindromit nefrotik
- C) Sindromit koronar akut
- D) Sindromit radikular





Infermieri Pyetja: 1888

Veza përmban më tepër :

- A) Yndyrna
- B) Fibra
- C) Proteina
- D) Karbohidrate

Infermieri Pyetja: 1889

Yndyrnat shtazore janë të pasura me:

- A) acide yndyrore të ngopura
- B) acide yndyrore të pangopura
- C) të dyja se bashku
- D) asnjë nga të mesipër met



Infermieri Pyetja: 1890

Kalorazhi ditor i nevojshëm për një mashkull me peshë ideale është:

- A) 2500 kcal/ditë
- B) 2000 kcal/ditë
- C) 3000 kcal/ditë
- D) 1500 kcal/ditë

Infermieri Pyetja: 1891

Lipidet duhet të zënë:

- A) 60-70% të kalorazhit ditor
- B) 20-30% të kalorazhit ditor
- C) 30-35% të kalorazhit ditor
- D) 10-15% të kalorazhit ditor



Infermieri Pyetja: 1892

Mungesa e hekurit mund të jetëpasojë e:

- A) anoreksise
- B) hemorragjise
- C) diarrese
- D) të gjitha të mesipër met

Infermieri Pyetja: 1893

Cili nga produktet e mëposhtme përmban më shumë magnez:

- A) farat e kungullit
- B) çokollata e zezë
- C) spinaqi
- D) bajamet

Infermieri Pyetja: 1894

BMI = 23 shpreh:

- A) mbipeshe
- B) obezitet
- C) peshe ideale
- D) nenpeshe

Infermieri Pyetja: 1895

Jodi gjendet më pak tek:

- A) molla
- B) hurma
- C) gështenja
- D) karkalecat



Infermieri Pyetja: 1896

Obeziteti morbid i korrespondon:

- A) BMI = 30
- B) BMI = 25
- C) BMI > 40
- D) BMI > 35

Infermieri Pyetja: 1897

Një grua shtatzanë me preeklampsi duhet të kufizojë:

- A) karbohidratet
- B) kripën
- C) frutat
- D) të gjitha të mësipërmet



Infermieri Pyetja: 1898

Vitamina C gjendet me tepër tek:

- A) domatja
- B) speci
- C) portokalli
- D) qitro

Infermieri Pyetja: 1899

Gratë shtatzana nenpeshe duhet të respektojne kalorazhin ditor:

- A) të njejtë me shtatzanat me peshe normale
- B) dyfishin e kalorazhit normal
- C) ne varesi të BMI
- D) ne varesi të gjatesise trupore





Infermieri Pyetje: 1900

Acidi folik është i domosdoshëm në:

- A) 3 muhujt e parë të shtatzanisë
- B) pubertet
- C) menopauzë
- D) periudhën pas lindjes

Infermieri Pyetje: 1901

Karbohidratet duhet të zene në kalorazhin ditor:

- A) 50%
- B) 30%
- C) 20%
- D) 10%



Infermieri Pyetje: 1902

Vegjetarianet preken më shpesh nga:

- A) sëmundjet kardio-vaskulare
- B) anemia
- C) obeziteti
- D) diabeti mellitus

Infermieri Pyetje: 1903

Diarreja mund të jetë pasojë e :

- A) marrjes së tepërt të yndyrave
- B) hiperfunksionit të gjendrës tiroide
- C) marrjes së mangët të fibrave
- D) A dhe B së bashku



Infermieri Pyetja: 1904

Në konstitucionin genoid :

- A) perimetri abdominal < perimetri gluteal
- B) perimetri abdominal = perimetri gluteal
- C) perimetri torakal > perimetri gluteal
- D) perimetri gluteal < perimetri abdominal

Infermieri Pyetja: 1905

Ngrenia e tepër t e karbohidrateve Mund tëshkaktoje:

- A) diabet të sheqerit
- B) mbipeshe
- C) të vjella
- D) diarre

Infermieri Pyetja: 1906

Kalorazh me të madh për njesi grammi kane:

- A) yndyrnat
- B) kripër at minerale
- C) karbohidratet
- D) proteinat

Infermieri Pyetja: 1907

Yndyrnat bimore janë të pasura me:

- A) acide yndyrore të pangopura
- B) kolesterol
- C) trigliceride
- D) acide yndyrore të ngopura



Infermieri Pyetja: 1908

Kalorazhi ditor i grave shtatzana është:

- A) i njejtë me gratë normale
- B) me i vogel se gratë normale
- C) me i madh se gratë normale
- D) varet nga BMI e gruas ne fillim të shtatzanise

Infermieri Pyetja: 1909

Vitamina C ne organizem është e nevojshme për :

- A) thithjen e yndyrnave
- B) thithjen e hekurit
- C) thithjen e kalciumit
- D) asnjë nga të mesipër met



Infermieri Pyetja: 1910

Për të parandaluar shfaqjen e diabetit gestacional, kufizimi i karbohidrateve rekomandohet në tremujorin:

- A) e parë të shtatzanisë
- B) e dytë të shtatzanisë
- C) e tretë të shtatzanisë
- D) e dytë dhe të tretë të shtatzanisë

Infermieri Pyetja: 1911

Konsumimi i peshkut duhet të kufizohet gjatë:

- A) shtatzanisë
- B) pubertetit
- C) menopauzës
- D) laktacionit



Infermieri Pyetja: 1912

Vitamina E rekomandohet ne:

- A) dhimbjet e kokes
- B) renien e flokeve
- C) anemi
- D) osteoporoze

Infermieri Pyetja: 1913

Trajtimi afatgjatë me Metforminë mund të shkaktojë pakësim të:

- A) vitaminës D
- B) acidit folik
- C) vitaminës E
- D) asnjërës prej tyre

Infermieri Pyetja: 1914

Studimet deskriptive:

- A) Bejne vetëm për shkrimin e gjerave,
- B) Nuk për doren për studimin e ekspozimeve,
- C) Nuk për doren për studimin e efekteve,
- D) Për doren vetëm për ekspozimet,

Infermieri Pyetja: 1915

Indikatorët për monitorimin e riskut;

- A) Nuk ka vlere besueshmeria,
- B) Nuk është e rëndësishme lehtësia e matjes,
- C) Nuk duhet të jene të lidhur ngushtë me risqet,
- D) Duhet të shfaqen shpejt pas ekspozimit

Infermieri Pyetja: 1916

Dioksidi i squfurit si lëndë ndotëse në ajër:

- A) Ka efekt kryesor-dëmtimin e trurit
- B) Nuk ka lidhje me reshjet acide
- C) Është ndotësi kryesor me përmbajtje squfuri
- D) Është bërë problem vetëm dekadat e fundit

Infermieri Pyetja: 1917

Fluoruret:

- A) Futen ne organizem kryesisht me anë të ushqimeve,
- B) Merren ma anë të ujit të pishem,
- C) Mungesa e tyre ne uje ul incidencen e kariesit,
- D) Flurore me pakice-shfaqeje e flurozes,

Infermieri Pyetja: 1918

Efektet shendetesore të pesticideve:

- A) Nuk prekin sistemin imun të organizmit,
- B) Nuk prekin organet e riprodhimit,
- C) Nuk demtojne lekuren,
- D) Kanëefektë teratogjenike,

Infermieri Pyetja: 1919

Efektet ekstraauditive të zhurmave:

- A) Nuk lidhen me presionin arterial,
- B) Nuk ka crregullime të gjumit,
- C) Ndikon mbi sistemin imun,
- D) Rritja e irritabilitetit SNQ,

Infermieri Pyetja: 1920

Programi i nje qyteti të shëndetshem:

- A) Zgjedhjet janë multisektoriale,
- B) Rritje e pjesemarrjes ne vendimmarrje,
- C) Roli i publikut i papër fillshem,
- D) Nje akt dhe jo proces ne vazhdimesi,

Infermieri Pyetja: 1921

Shëndeti mjedisor:

- A) Nuk lidhet me kualitetin e jetes,
- B) Nuk ndikohet nga faktoret sociale,
- C) Ka lidhje me agjentet biologjike,
- D) Nuk lidhet me shëndetin e gjeneratave pasardhese,

Infermieri Pyetja: 1922

Ekspozimi:

- A) Nuk merr ne konsideratë llojin e ndotesit,
- B) Ndikohet nga elementi kohe,
- C) Nuk ka lidhje me sasine e ndotesit,
- D) Nuk merr parasysh futjen e ndotesit,

Infermieri Pyetja: 1923

Tranzicioni demografik:

- A) Lidhet me numrin e vdekjeve,
- B) Nuk ndikohet nga numri i lindjeve,
- C) Ndikon mbi numrin e popullates,
- D) Nuk ka lidhje me shëndetin,



Infermieri Pyetja: 1924

Problemet e shendetit mjedisor:

- A) Lidhen me migrimin, lindjet, etj,
- B) Nuk ndikohen nga varferia,
- C) Nuk lidhen me konsumin,
- D) Nuk ndikohen nga politikat makroekonomike,

Infermieri Pyetja: 1925

Risku:

- A) Nuk është nje propabilitet
- B) Shfaqet kur ka patur nje ekspozim
- C) Është faktor qe Mund tëshkaktoje efektë shendetesor
- D) Asnjëra nga përgjigjet



Infermieri Pyetja: 1926

Fusha elektromanjetike:

- A) Është nje rezatim i llojit jonizues
- B) Nuk haset rreth linjave elektrike
- C) Shkakton kataraktin e syrit
- D) Mund tëshkaktoje kancerin

Infermieri Pyetja: 1927

Vleresimi i ekspozimit human:

- A) Doza është e veshtire të matet
- B) Me mire matja e për qendrimit
- C) Doza e marre nuk varet nga vecoritë e individit
- D) Doza nuk është ne funksion të kohes





Infermieri Pyetje: 1928

Zhiva (Merkuri):

- A) Nxirret në mjedis nga automjetet
- B) Për doret si antiseptik/antifungal
- C) Nuk për doret në prodhimin e pasqyrave
- D) Nuk për doret në punimet e veshjes me ar

Infermieri Pyetje: 1929

Akumulimi i lendeve ndotëse në ajër:

- A) Nuk lidhet me relievin e tokës
- B) Nuk lidhet me levizjet e ajrit
- C) Lidhet me rezatimin diellor
- D) Nuk lidhet me inversionet tempërore



Infermieri Pyetje: 1930

Efektet e drejtpërdrejta të oksidit të azotit janë:

- A) Nuk ka efekt në aparatën respirator
- B) Ka efekt në shpërndarjen e gjakut në mushkëri
- C) Është ndotës dytësor
- D) Asnjëra nga përgjigjet

Infermieri Pyetje: 1931

Vendbanimet humanë si ekosisteme:

- A) Nuk lidhen me furnizimin me ujë
- B) Nuk ndikohen nga ujërat e hapura
- C) Nuk lidhen me kushtet për jetën e eger
- D) Lidhen me qeverisjen lokale





Infermieri Pyetja: 1932

Zhvillimi i qendrueshem:

- A) Nuk lidhet me ekonomine
- B) Lidhet me brezat e ardhshem
- C) Nuk lidhet me mjedisin
- D) Asnjëra nga përgjigjet

Infermieri Pyetja: 1933

Tranzicioni demografik nenkupton:

- A) Nr. I vdekjeve është I ulet
- B) Nr. I lindjeve është I ulet
- C) Për ben nje për iudhe
- D) Për ben nje moment



Infermieri Pyetja: 1934

Rreziqet fizike janë:

- A) nga mjetet motorrike
- B) nga sportet
- C) nga rrezatimet
- D) Demtimet ne vendin e punës

Infermieri Pyetja: 1935

Studimet e toksicitetit akut:

- A) Përdoren për matjen e toksicitetit të lëndëve
- B) Janë mjaftueshem të karakterizuara nga kimikatet
- C) Përdoren për kancerogenet
- D) Nuk përfshijnë DL50 dhe PL 50





Infermieri Pyetja: 1936

Treguesi i viteve potenciale të humbura të jetes (VPHJ):

- A) Tenton të gjykoje humbjen e jetes humane
- B) Nuk lidhet me nr e viteve produktive të jetes qe humbasin
- C) Për doret për të për shkruar humbjen e kontributeve
- D) Demtimet shpjegojnë njëvegel të VPHJ

Infermieri Pyetja: 1937

Gjykimi mbi riskun:

- A) Nuk lidhet me vendimmarrjet
- B) I domosdoshem krahasimi me standartet
- C) Nuk lidhet me publikun
- D) Asnjëra nga përgjigjet



Infermieri Pyetja: 1938

Indikatorët në shendetin mjedisor:

- A) Janë të domosdoshem në monitorimin e riskut
- B) Nuk lidhen me jetegjatesine e pritshme
- C) Nuk për fshijne peshen në lindje
- D) Nuk për fshijne vdekjet e parakohshme

Infermieri Pyetja: 1939

Lendet organike të avullueshme:

- A) Shkaktojnë irritimin e aparatit respirator
- B) Nuk janë problem për ajerin e brendshem
- C) Nuk ndikojne në krijimin e ozonit
- D) Asnjëra nga përgjigjet



Infermieri Pyetja: 1940

Kontrolli i cilesise se ajrit t  jashtem:

- A) Lidhet me vendet e ndertimit
- B) Lidhet me kontrollin e emisioneve
- C) Nuk lidhet me transportin
- D) Nuk lidhet me energjine

Infermieri Pyetja: 1941

Kualiteti i ujit t  pijshem:

- A)  sht  i lidhur ngusht  me sasine e ujit
- B) Nuk varet nga veprimtaria humane
- C) Nuk varet nga aktivitetet agrobujqesore
- D) Asnj ra nga p rgjigjet

Infermieri Pyetja: 1942

Zgjedhja e ushqimeve:

- A) Nuk lidhet me ndikimet kulturore
- B) Nuk varet nga mundesia e sigurimit t  ushqimeve
- C) Nuk varet nga shija,era, paraqitja
- D) Varet nga kostoja dhe p r shtatshmeria

Infermieri Pyetja: 1943

Encefalopatia spongiforme:

- A) Shkaktohet nga nje bakter
- B) Shkaktohet nga nje ameba
- C) Ka si vektor kepushat
- D) P r hapet me ushqimin e gjedhit

Infermieri Pyetja: 1944

Forma dhe rigiditeti i qelizës bakteriale janë si pasojë e :

- A) Membranes celulare
- B) Shtreses se peptidoglikanit
- C) Lipopolisaharideve
- D) Acideve teikoike

Infermieri Pyetja: 1945

Ne qelizat eukariotë nuk hyjne:

- A) Bakteret
- B) Bimet;
- C) Protozoaret;
- D) Kerpudhat;

Infermieri Pyetja: 1946

Cila nga keto substanca është prezentë ne spor por jo ne qelizen bakteriale vegetative:

- A) Peptidoglikani
- B) Fosfolipidet
- C) Acidi ribonukleik
- D) Acidi dipicolinik

Infermieri Pyetja: 1947

Cila nga cilesitë e meposhtme është tipike për sporin bakterial:

- A) Fagocitoza
- B) Levizshmeria
- C) Termorezistenca
- D) Prodhimi i antibiotikeve

Infermieri Pyetja: 1948

Fimbriet ose Pilet:

- A) Janë gjithmone me natyre proteinike
- B) Disa janë faktore virulence
- C) Disa bejne të mundur levizjen
- D) Janë të gjitha të verteta

Infermieri Pyetja: 1949

Humbja e kapsules i ben bakteret :

- A) Të pa aftë për tu rritur
- B) Të pa aftë për ti rezistuar fagocitozes
- C) Me të ndjeshem ndaj antibiotikeve
- D) Me të lehtë për tu kultivuar

Infermieri Pyetja: 1950

Muri i gram pozitiveve është i për bere nga:

- A) Nje shtrese e vetme peptidogliani
- B) Nje shtrese e peptidoglianit dhe membrana e jashtme
- C) Peptidogliani, acidi teicoic dhe acidi lipoteikoik
- D) Membrana fosfolipidike e acidi teikoik

Infermieri Pyetja: 1951

Ne cfare temperature vriten sporet bakteriale?

- A) 121oC
- B) 30o C
- C) 37oC
- D) 80oC

Infermieri Pyetja: 1952

Ne ngjyrimin me Gram, rezultojne me ngjyre të kuqe:

- A) Bakteret Gram-pozitiv
- B) Bakteret Gram-negativ
- C) Bakteret sporogjene
- D) Bakteret anaerobe

Infermieri Pyetja: 1953

Cili është momenti më i përshtatshëm për marrjen e hemokulturës?

- A) Kur temperatura ka rënë
- B) Kur fillojnë frisonet
- C) Në çdo moment të fazës febrile
- D) Mbas etheve, kur temperatura po rritet

Infermieri Pyetja: 1954

Cili nga mikroorganizmat e mëposhtëm për fshihet ne patogjenezen e kariesit dentar?

- A) Streptococcus pneumoniae
- B) Streptococcus mutans
- C) Treponema pallidum
- D) Echerichia coli

Infermieri Pyetja: 1955

Cili është bakteri kryesor me i shpështë ne infeksionet urinare?

- A) Salmonella typhi
- B) Escherichia coli
- C) Pseudomonas aeruginosa
- D) Chlamydia trachomatis

Infermieri Pyetje: 1956

Shfaqet në vazhdimësi në një komunitet duke përfaqësuar zakonisht vetëm një popullatë të paket:

- A) Epidemia
- B) Pandemia
- C) Endemia
- D) Sëmundja sporadike

Infermieri Pyetje: 1957

Është e vertetë se gripi :

- A) Shfaqet me të dridhura (frissons)
- B) Është infeksion viral
- C) Shoqërohet edhe me vdekje
- D) Mjekohet me tetracikline

Infermieri Pyetje: 1958

Cila nga pohimet nuk është e vertetë për Giardia-n:

- A) Është bakter gram negative
- B) Infeksion i zorrës holle
- C) Transmetohet me rrugë fekal -orale
- D) Trajtohet me flagyl

Infermieri Pyetje: 1959

Cilat nga format nuk i përkojnë klasifikimit të baktereve:

- A) Sferike ose koke
- B) Cilindrike
- C) Spirale
- D) Hekzagonale

Infermieri Pyetja: 1960

Cila nga strukturat e meposhtme nuk  sht  kurre n  n qelize prokariote?

- A) Membrana qelizore
- B) Ribozomet
- C) Berthama
- D) Flagjelet

Infermieri Pyetja: 1961

Prokariotet, eukariotet dhe viruset Kan t  p r bashket karakteristiken:

- A) P r mbajne material gjenetik t  p r bere nga acid nukleik
- B) P r mbajne gjenome t  p r bere nga adn
- C) P r mbajne membran  plazmatike
- D) P r mbajne berthame

Infermieri Pyetja: 1962

Ne baktere levizshmeria i dedikohet:

- A) Ciljeve (pili)
- B) Glikokaliksit
- C) Pseudopodeve
- D) Flagjelit

Infermieri Pyetja: 1963

Cila nga shprehjet  sht  e sakt  p r transduksionin:

- A)  sht  proces i transferimit gjenetik i mundsuar nga bakterofagu
- B)  sht  nje mekanizem n p r mjet t  cilit qelizat transferojne meterialin gjenetik me kontakt fizik
- C)  sht  nje mekanizem ku qeliza p r fiton nje ADN prezent  ne ambjent
- D)  sht  i mundsuar nga plamidi i pranishem ne qelizen dhuruese.

Infermieri Pyetja: 1964

Mikroorganizmat oportunistë :

- A) Janë agjent të toksikoinfeksioneve alimentare
- B) Janë për gjegjes për infeksionet ne për sonat me imunitet të rene
- C) Janë gjithnje sensibel ndaj antibiotikeve
- D) Janë të pranishem ne indet njerzore të infektuara

Infermieri Pyetja: 1965

Ne ngjyrimin e Gramit rezultojne me ngjyre violet:

- A) Bakteret Gram -negativ
- B) Bakteret anarobe
- C) Vetëm bakteret G + aerob
- D) Bakteret Gram +

Infermieri Pyetja: 1966

Flora bakteriale e traktit gastrointestinal për behet nga:

- A) Baktere anaerob
- B) Baktere aerob
- C) Ne mase të barabartë nga baktere dhe viruse
- D) Për gjithsisht baktere anaerob por edhe aerob

Infermieri Pyetja: 1967

Cila është simptoma me karakteristike ne Bakteremi:

- A) Kolle e forte
- B) Tempër ature
- C) Diarre
- D) Të vjella

Infermieri Pyetje: 1968

Është e vertetë që Interferonët INF

- A) Bejnë pjesë në linjën e parë të mbrojtjes
- B) Bejnë pjesë në vijën e dytë të mbrojtjes
- C) Janë grup proteinash
- D) Frenojnë sintezën e viruseve

Infermieri Pyetje: 1969

Cili prej tyre është infeksion respirator

- A) Tërbimi
- B) Ethja tifoide
- C) Trikomoniaza
- D) Pertusi

Infermieri Pyetje: 1970

Cila nga të mëposhtmet nuk është e saktë për Toksoplazma Gondii ?

- A) Është protozoar i detyruar brendaqelizor
- B) Është infeksion transplacentar
- C) Transmetohet nga qente
- D) Prek gjendrat limfatike

Infermieri Pyetje: 1971

Karbohidratet kanë funksion:

- A) Enzimatik
- B) Energji-prodhues
- C) Struktural
- D) Kalorik

Infermieri Pyetja: 1972

Është karbohidrat:

- A) Glicina
- B) Glukoza
- C) Bakri
- D) Vitamina C

Infermieri Pyetja: 1973

Proteinat e thjeshta:

- A) Kanë grup prostetik
- B) Kanë vetëm amino acide
- C) Kanëgrup prostetik dhe amino acide
- D) Nuk Kanëaminoacide.

Infermieri Pyetja: 1974

Vlera të ulura albuminemisë shkaktojnë:

- A) Ulje të presionit onkotik
- B) Rritje të presionit hidrostatik
- C) Rritje të presionit onkotik
- D) Asnjë nga efektet e sipër përmendura

Infermieri Pyetja: 1975

Acidi Aspartik është:

- A) Vitaminë
- B) Aminoacid
- C) Karbohidrat
- D) Lipid

Infermieri Pyetje: 1976

Trigliceridët janë

- A) Lipide të thjeshta
- B) Lipide të përbëra
- C) Karbohidrate
- D) Proteina

Infermieri Pyetje: 1977

Acidi hialuronik është:

- A) Monosaharid
- B) Homopolisaharid
- C) Heteropolisaharid
- D) Asnjëra